VARICELA



Es una enfermedad contagiosa, que comienza con fiebre, produce erupción cutánea de tipo maculopapular de corta duración y vesículas que duran entre tres y cuatro días, dejando costras en el cuerpo.
Las lesiones aparecen en forma consecutiva; La erupción es frecuente en zonas cubiertas, comprometiendo cuero cabelludo y mucosas.
El herpes zoster es la manifestación de la infección; en la zona cutánea del trayecto de nervio sensitivo, con lesiones que evolucionan, produciendo dolor intenso, se pueden presentar complicaciones como sobreinfección bacteriana, trombocitopenia, artritis, hepatitis, encefalitis o meningitis y glomerulonefritis.


Modo de transmisión

se transmite por contacto directo o transmisión de secreciones nasofaríngeas y por líquido de las vesículas en caso del herpes zoster; el pertenecer a población de comunidades cerradas son los principales factores de riesgo para la propagación de la varicela.



Periodo de transmisibilidad

Uno o dos días antes y poco después del comienzo del exantema; sin embargo, el contagio puede durar hasta el quinto día del inicio de las lesiones.
En los pacientes inmunocomprometidos con varicela progresiva, probablemente el periodo de transmisibilidad sea durante todo el tiempo de erupción de nuevas lesiones.



YERALDINE PAOLA YEPES ARAGON