OCT 12/18

MIEL: (Gata amarilla) Presenta lesión en región de molar derecho superior, que ocasionó fístula externa por absceso. Se realiza limpieza, se retira costras, se desinfecta con yodo y clorhexidina. Se inicia amoxisol 0,3 ml SC/48h/3 aplicaciones y ketoprofeno 0,06 ml SC/24h/3-4 aplicaciones. Limpiezas 2 veces al día durante 2 semanas con solución salina.

GATA BLIN: Baja condición corporal, decaída, pelo hirsuto; al ingreso al albergue era muy gorda. Se recomienda realizar exámenes (hemograma y creatinina).

PEDRO: Castración y sutura en herida que presentó en el pene. Heridas cicatrizaron bien. Se retiran puntos de castración. Herida del pene se encuentra muy bien. Sutura de Vicryl, la cual se reabsorbe sola.

TRABAJADORA: Presentó otohematoma. Se encuentra con sutura en oreja derecha, se encuentra bien el tejido, cicatrizando bien, sin contenido. Se retiran puntos. Continuar con limpiezas diarias hasta cicatrizar completamente. Se recomienda dar APETIL 20 gotas (1cc) diario por 7 días.

CAN: Presentó otohematoma hace varias semanas, se realizó procedimiento y aún no se retiran los puntos. A la evaluación se encuentra en oreja derecha, inflamación, molestia a la manipulación, herida

Scanned by CamScanner

cicatrizada. Se intenta retirar suturas pero debido a la inflamación que presenta, los puntos se encuentran adheridos. Se retiran puntos, se hace limpieza de ambos oídos; el izquierdo presenta abundante secreción. Se aplica gentax ótico en este oído.
Se inicia Meloxic 2% = 0,3 ml hoy y 2 días más 0,15 ml cada día. Debe realizar limpieza de oídos diario.

CLARA: Revisión de oídos, se encuentran con secreción en cantidad leve. Se realiza limpieza. Continúa con masa a nivel del carpo de MAD. Se encuentra de tamaño considerable. Considerar extracción.

CIELO: Presenta oído derecho enrojecido, muy inflamado, con secreción moderada. Oído izquierdo bien. Presenta lesiones en la cara, hocico y región nasal, circunscritas, algunas elevadas, otras con costras.
Se realiza limpieza de oídos y de lesiones. Se aplica Gentax ótico, debe continuar con limpieza + Gentax diario.
En lesiones se aplica cotamycon, se debe continuar diario. Si continúa con inflamación en oído, aplicar floxavet x 3 días.

CONCHA: Continúa con masa en el lomo de consistencia blanda. (Lipoma?), se recomienda extracción.

Scanned by CamScanner

MAMA SEGOVIA: Tiene lesiones dérmicas en el cuello, le aplicaron dectomax y cefalexina (3 días). Presenta lesión en región ventral del cuello, alopecica, con algunas ronchas. Se recomienda continuar con cefalexina y realizar limpieza con clorhexin.

NEGRA: La semana pasada le apareció una bola sobre el lomo, le aplicaron floxavet 3 días y lleva 5 días con cefalexina. Presenta lesión nodular subcutánea sobre lomo a nivel lumbar. Molestia a la palpación, no se observan heridas. Continuar con cefalexina y adicionar Traumeel en gel.

Se retiran puntos de:
Josefa
Horacio
Mamá e hija nuevas
Susy.
Chingui.

SOMBRA: Presento signos de conjuntivitis en ojo izquierdo. No se encuentran lesiones. Le aplicaron oftaproc y evolucionó bien.

Vacunación: Amarillo cuarentena y Triple felina
Amarillo gatera

Sabia en 20 días.

Scanned by CamScanner

AMARILLO POSITIVO: Se aplicó revolotión, Lesiones secas, algunas costras. Realizar limpieza de las costras hasta que cicatrice por completo.

WUFER: Presenta secreción ocular en ojo derecho, verdosa, estornudos, no presenta secreción.
Recomiendo limpieza de la secreción y aplicación de gotas oculares. (Wassetrol o oftaprocil) diario.