


FORMACION VIRTUAL PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA TIERRA SANTA MUNICIPIO BUENAVISTA







10:08
SER T. SANTA
Ana, Deibis, Enilda, Faber,...
Lenis Vente Santa
Si mejor después del medio dia
12:23 p. m.
Miriam Santa
okey
12:33 p. m.
Como faber no hace el almuerzo por eso las cita a las 9
1:04 p. m.
Faber Santa
Tú
Como faber no hace el almuerzo por eso las cita a las 9
1:35 p. m.
Lastenia Navarro Santa
Mensaje


10:15
SER T. SANTA
Ana, Deibis, Enilda, Faber,...
Y los talleres también el del documento que eran dos hojas de los cuales habían sacar las copias
12:01 p. m.
Por otra parte lo del galpón ya empezaron a organizarlo?
12:02 p. m.
YouTube
PRONAVÍCOLA Lev...
www.youtube.com
https://youtu.be/FJk8BozAnTc
12:12 p. m.
Mensaje


10:10
SER T. SANTA
Ana, Deibis, Enilda, Faber,...
Deibis Martínez Santa
Hola buenos días hoy nos vamos ha reunir
1:36 p. m.
Faber Santa
Si 1:36 p. m.
Miriam Santa
Evidencia realizando actividad
4:00 p. m.
Miriam Santa
Mensaje


10:10
SER T. SANTA
Ana, Deibis, Enilda, Faber,...
Faber Santa
0:24 4:50 p. m.
Buenas tardes esos son ejemplos para que se guien en la actividad que van a realizar, recuerden que solo van a colocar lo que hay en suregion no tiene que ser lo que está en las fotos
4:50 p. m.
MANETA RICA
Mensaje


10:13
SER T. SANTA
Ana, Deibis, Enilda, Faber,...
0:12 3:32 p. m.
GUIA TECNICA PARA EL MANEJO DE GALLINAS PONEDORAS
PDF 2. GUIA TECNIC...
5 páginas • 743 kB • PDF
0:13 3:34 p. m.
Norma Caliz Santa
Mi celu no abre eso
6:17 p. m.
Mensaje





4. Proveer a las aves 17 horas luz (natural + artificial).
5. El programa debe comenzar a las 18 semanas de edad, se debe aumentar media hora de luz artificial por semana hasta completar las 17 horas de luz.

VI- ALIMENTACIÓN

Las gallinas ponedoras deben recibir alimentos para producción con 17% de proteína. Cambiar a este tipo de alimento a las 18 semanas de edad. A las 29 semanas de edad, las aves deben de estar consumiendo 26 libras por cada 100 aves por día

En forma práctica suministrar a un ave blanca entre 105 y 109 gramos ave día y a un ave roja entre 111-115 gramos ave día.

Agua: Tener presente que el agua es igual de importante que el alimento, por lo que se debe disponer en agua dos veces y medio de lo que come.

Desinfectar agua:

Puede utilizar:

Sulfato de Aluminio.....4grs por 100 litros de agua

Cloro.....2grs por 100 litros de agua

Yodo.....½ centímetro por litro de agua

VII- PROGRAMA DE VACUNACIÓN

Antes de los 7 días despique temprano.

Un día antes y durante tres días, vitamina K en el agua.

Cuadro 4. Programa básico de vacunación.

Edad	Vacuna	Vía de administración
1 día	Marek	Subcutánea (incubación)
	Bronquitis	Oral, Nasal, Aspersión
4 días	New Castle- NC (B1)	Ocular u oral
7 semanas	Gumboro	En el agua
4 semanas	Viruela aviar	En el ala
6 semanas	N.C (La Sota) Gumboro	Oral
8 semanas	Bronquitis	Oral, Nasal, Aspersión
14 semanas	Viruela aviar	En el ala
16 semanas	Gumboro	En el agua
18 semanas	Bronquitis	Oral, Nasal, Aspersión
20 semanas	N.C. (La Sota)	Oral


Al siguiente día de cada vacuna y durante dos días, antibiótico más vitaminas con electrolitos.

-Semana 8. redespique

-Antes del traslado a la galera de producción, desparasitación interna.

VIII- COMERCIALIZACION

Antes de iniciarse en el negocio del huevo, es necesario hacer un estudio sobre el mercado de éste en la zona en que se piensa operar; éste le indicará la preferencia por el huevo de cáscara blanca o marrón, las cantidades



Densidad: Aves rojas alojar 6 pollas por metro cuadrado, mida el ancho de su galpón y multiplique por el largo, esta área la multiplica por 6 y obtiene la capacidad del galpón.


Equipos:

Comederos: Un comedero para 25 aves y su altura debe estar a nivel del buche del ave, en comederos lineales es de 8 cm por ave.

Bebederos: Un bebedero de campana para 60 aves y su altura debe estar a la altura del ala del ave, si se usa bebedero de niple instalar un niple por cada 10 aves.

Nidos: Normalmente, las pollonas deben de ser trasladas a las galeras de postura antes de las 18 semanas de edad, ya que es cuando inician postura. Para evitar que las aves duerman dentro de los nidos, estos se cierran colocando un tablón de madera sobre la entrada a lo largo de toda la fila se deben instalar a las 16 semanas de edad de las aves, en el centro del galpón para que ellas se acostumbren a utilizarlos desde el inicio del ciclo de postura. La densidad es un nido por cada 4 o 5 pollas, dimensiones 30 cm ancho x 30 cm alto x 40 cm profundidad con una

Los nidos se utilizan uno para cada cinco gallinas, con las siguientes dimensiones: 20 cm (mínimo) de frente, 30 cm de alto y 30 cm de fondo; manteniéndolos siempre limpios y con suficientes virutas de madera, se colocan a 30 cm de altura.


10:09
SER T. SANTA
Ana, Deibis, Enilda, Faber,...
Zunilda Perez Santa
Se eliminó este mensaje
2:08 p. m.
Zunilda Perez Santa
0:09 2:08 p. m.
Deibis Martínez Santa
Ok
2:45 p. m.
Alas 2.esta bien 2:45 p. m.
Norma Caliz Santa
Bamos para los toros el sabado en las aguaditas
2:47 p. m.
Lenis Vente Santa
Alas 2 esta bien
2:49 p. m.
Mensaje