INFORME INDICADORES PARA MEDIR LA RESTAURACION DEL PREDIO RESERVA SANTA BARBARA, VEREDA PANTANO REDONDO MUNICIPIO ZIPAQUIRA

El día 29 de Octubre se realiza medición de la restauración, donde se toma como referencia transecto instalado por la contratista Francy Jiménez.

Este transecto tiene las siguientes características: la medida total es de 50 mt de largo x 2 mt de ancho, se dividió en 5 cuadros con la siguiente medida 10 mt de largo x 2 mt de ancho, por lo tanto este se utilizara como método de muestreo de la vegetación presente tanto nativa como introducida en el predio, donde se obtendrá una información global de la flora presente de la zona.

Transecto, hallazgos	Registro fotografico
1)TRANSECTO: Se identifica en alta cantidad la presencia de especies forrajeras como carretón blanco, trébol rojo, alta presencia de pasto kikuyo, romasa y especie nativa aceda de culebra -Trebol rojo: 259 -Carreton blanco :121 -Romasa: 51 -Acedad de culebra: 43 Kikuyo se identifica en un 60 por ciento de este transecto	













	

	
2) TRANSECTO Se identifica alta presencia de especies forrajeras kikuyo, trébol rojo y carretón blanco, sin embargo hay presencia de especies nativas, se observa pequeños brotes en mediana cantidad en este transecto de la especie arrayan, como también amarguero. -Amarguero: 8 -Arrayan: 6 -Guargueron: 3	 Amarguero

	 Amarguero

	 Guargueron

	 Arrayan

	 Guargueron

3) TRANSECTO: Se identifica alta presencia de especie forrajera kikuyo, carretón blanco, diente de león, trébol rojo. Sin embargo se identifica especies de árboles nativos como el duraznillo con pequeños brotes florales y un arrayan -Duraznillo: 4 -Arrayan: 1 Especies forrajeras Kikuyo en un 60 por ciento Diente de león: 1 Carreton blanco Trébol rojo	

	

	 Duraznillo

	 Duraznillo

	 Duraznillo
4) TRANSECTO: Se identifica alta presencia de kikuyo como capa vegetativa, como también carreton blanco, trébol blanco. Sin embargo se identifica como especie nativa arbórea el arrayan -Arrayan: 6 -Helecho macho: 3 -Guaba: 2 -Garroche: 1	

	

	 Arrayan

	 Garroche

	 Helecho macho

	 Helecho macho

	 Arrayan

	 Arrayan

	 Guaba

5)TRANSECTO: Se identifica alta cantidad de kikuyo como capa vegetativa predominante, trébol rojo, carreton blanco, helecho macho, guaba, poa guargueron Como especie nativa se identifica aliso y duraznillo. -Aliso:1 -Duraznillo: 4	 Aliso

	 Helecho macho

	 Duraznillo

	 Duraznillo