Vacuna Segura

Pos-Test

*Obligatorio

1. Dirección de correo electrónico *

2. Nombre completo: *

3. N° de Documento de identidad: *

4. 1. Durante la realización de un monitoreo rápido por la notificación de un caso sospechoso de sarampión en un barrio de Villavicencio, se encontró a los niños Javier y Marcos García que tienen 3 y 6 años de edad, fueron identificados como susceptibles para sarampión y rubéola, ya que no tiene ninguna dosis de SRP registrada en sus carnés de vacunación y llevan 3 meses residenciados en esta capital. La auxiliar que acompaña el monitoreo decide vacunar según las directrices nacionales a los niños y brinda a la madre la siguiente recomendación: * 20 puntos

Marca solo un óvalo.

- a) Le Aplica la vacuna de SRP a los dos hermanos y los cita para la segunda dosis en un año.
- b) Le Aplica la vacuna de SRP a los dos hermanos y cita a los niños en un mes para la segunda dosis de SRP
- c) Al niño de 6 años le aplica la vacuna de SRP y lo cita en un mes para la segunda dosis, al niño de 3 años no le aplica ninguna vacuna, ya que en 2 años lo puede vacunar.
- d) Al niño de 3 años le aplica la vacuna de SRP y lo cita al año para la segunda dosis de SRP, al niño de 5 años no le aplica ninguna vacuna, ya que considera que esta fuera de peligro para contraer sarampión.
- e) Al niño de 6 años le aplica la vacuna de SRP y lo cita en un mes para la segunda dosis (SRP) y al niño de 3 años le aplica la vacuna de SRP y lo cita a los 5 años para la segunda dosis de SRP

5. 2. Camilo Tovar de 7 años de edad es procedente de Venezuela e ingreso por el Catatumbo al país en compañía de su madre que tiene 19 años. La madre lleva a Camilo, al centro de salud de Sardinata por tener fiebre y rash, el médico le diagnosticó sarampión, posteriormente le pide a la mamá que le comente con quien vive, ella refiere que vive con su tía que es una señora de 49 años y sus hijos de 3 años y 8 meses. Usted es el coordinador del PAI de Sardinata, y envía a un grupo vacunador para realizar el bloqueo de vacunación. Cuando ellos llegan a la casa de Camilo, se comunican telefónicamente y refieren que los niños tienen esquema completo para la edad y que no recuerdan cómo deben vacunar al vínculo familiar ¿Cuál es la instrucción que le proporcionará a su grupo de vacunación? * 20 puntos

Marca solo un óvalo.

- a) Aplicar la vacuna de SRP a la señora de 49 años y a sus dos hijos
- b) Aplicar la vacuna de SR a la señora de 49 años y a sus dos hijos
- c) Aplicar la vacuna de SRP a la señora de 49 años y al bebé de 8 meses, al niño de 3 años aplicarle SR
- d) No aplicar ninguna dosis de SRP, ya que este niño es venezolano y no tiene derecho a la vacunación.

6. 3. En el municipio “El Remanso” el 25 de diciembre la ESE captó a un niño de 2 años de edad como caso probable de PFA. siguiendo el Protocolo nacional, le tomaron la muestra de materia fecal y fue enviada al INS. El 8 de enero el reporte del INS del laboratorio de virología refiere: aislamiento en materia fecal: virus Salvaje Tipo 2. Tras la detección del virus polio virus del serotipo 2, ¿Cuáles son las principales medidas que debió tomar para el control de brote el municipio? Seleccione la respuesta correcta: * 20 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. Debe iniciar con la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa comunitaria, ya que tiene un tiempo aproximado para realizarlo de 48 horas posterior a la entrega del resultado del INS.
- b. A más tardar el 27 de diciembre, debió realizar la vigilancia epidemiológica intensificada, investigación rápida y evaluación de riesgos sobre el terreno, búsqueda de los susceptibles de polio, así como la vacunación, ahora debe solicitar de manera inmediata las recomendaciones de la Secretaria departamental para proceder ya que se encuentra en brote.
- c. No se afane, no hay riesgo alguno.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

7. 4. El 24 de diciembre del 2017, en el municipio La Paz – Cesar, se recibe la llamada del Epidemiólogo departamental solicitando a la persona de vigilancia epidemiológica /o PAI, el envió de los siguientes soportes de un caso sospechoso de sarampión: ficha notificación de sarampión - rubéola, historia clínica completa del paciente, ya que no se encontraba contratado por parte de la Secretaría departamental y quiere colocar al día con el seguimiento de estos casos. Además, encontró en un cajón en su oficina, el resultado del INS que refería IgM(+). ¿Cuáles son los documentos que le falta pedir al epidemiólogo del departamento? * 20 puntos

Marca solo un óvalo.

- a) Búsqueda activa institucional y búsqueda activa comunitaria.
- b) Búsqueda activa institucional y búsqueda activa comunitaria, seguimiento a casos secundarios por 30 días.
- c) MRCV e informe de las acciones de vacunación, así como número de personas vacunadas por edad, de los contactos estrechos y los contactos por vía de desplazamiento.
- d) Infórmele que se encuentra en fiestas decembrinas e inician las actividades el 6 de enero.
- e) b y c

8. 5. Llega un niño colombiano de 4 días de vida, nació en una finca cercana a la frontera de Panamá, el padre atendió el parto, refiere que corto el cordón umbilical con una cuchilla de afeitar, pero el bebé a los dos días de vida presento: espasmos musculares, incapacidad para succionar, y tiene un llanto excesivo. Se indaga por el antecedente de vacunación de la madre contra el tétanos, y manifiesta que no tiene ninguna vacuna, ya que vive tan lejos que ningún vacunador llega a esas fincas. El equipo de epidemiología, va a realizar la intervención epidemiológica y le dicen al coordinador del PAI del municipio, que no vale la pena que envíe un grupo vacunador con ellos, porque apenas es un tétanos neonatal, ¿Cuál cree que debe ser la decisión del coordinador? * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- a) Acepta no enviar un equipo de vacunación.
- b) Envía suficientes equipos de vacunación y da la directriz de evaluar los carnés de vacunación de las mujeres en edad fértil y mujeres en gestación y vacunar a aquellas que no presenten el carné de vacunación con Toxoide tetánico y diftérico del adulto (Td), TdaP (Tétanos - Difteria - Tos ferina Acelular) según el esquema que corresponda.
- c) Envía al equipo vacunador con suficiente dosis de vacuna para un buen número de niños menores de 6 años, por si luego de evaluar los carnés encuentran susceptibles para alguna vacuna que ofrece el PAI Nacional
- d) c y b son la directriz acertada.

9. 6. Llega un niño de 15 meses a la ESE del municipio, con débiles signos vitales, se reanima, pero no responde. Cuando el médico le pregunta que le ocurrió al niño, el padre refiere que ayer lo vacuno un grupo extramural en la vereda, y que luego de la vacunación él enfermo y hoy amaneció tan mal que murió. Al realizar la valoración física del niño encontró un hematoma occipital izquierdo ¿El médico le pregunta a la coordinadora de consulta externa ¿Cuáles son los pasos a seguir con este caso? ¿Cuál debe ser la asesoría para el médico de la ESE frente a ESAVIS? * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. Realicé la notificación de Esavi, solicite la autopsia médico legal o realice la autopsia clínica, diligencie en la epicrisis y refiera que es un evento supuestamente atribuible vacunación, tome las muestras que dice el Protocolo nacional para enviar al INS, e informe a los padres que hará lo acorde a la investigación en salud pública, e informe que la vacunación es altamente segura.
- b. Solicite las historias clínicas del bebé y de los familiares cercanos (madre, padre, etc,.) en la ESE, para cuando llegue la vigilancia del municipio entregárselas.
- c. Reporte al coordinador de vigilancia y al coordinador del PAI del municipio, de manera inmediata para que aseguren las acciones de documentación del caso.
- d. Todas son correctas

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios