COMUNIDAD DE APRENDICES EN PERICO

EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE POLLO EN PIE

FICHA:2395964

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

SOCIALIZACION DE CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON MANEJO SANITARIO DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE AFECTAN LOS POLLOS DE ENGORDE

OCTUBRE 12/2021



LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN LOS POLLOS DE ENGORDE

Las **enfermedades en aves de corral** son difíciles de encontrar en un criadero, en especial si vacunas adecuadamente a tus aves. A pesar de ello, es bueno estar al tanto de ellas en caso te preguntes si tu **pollo de engorde** está enfermo. Las enfermedades pueden esparcirse fácilmente, por eso cada vez que realices una revisión ten en cuenta alguno de los síntomas que mencionaremos a continuación.

VIRUELA AVIAR:



Enfermedad viral; que se contrae a través de mosquitos u otros pollos con viruela y superficies contaminadas.
Los Síntomas incluyen: Manchas blancas, membrana blanca o úlceras en la boca o tráquea, deja de poner huevos, heridas o llagas en la cresta. Todas las edades se pueden ver afectadas.
Para el tratamiento se debe considerar: Comida blanda, cuidado de apoyo, cuartos a temperatura ambiente; muchas aves con un buen cuidado sobrevivirán.
¿Hay Vacuna disponible?: Sí; los pollos de engorde o aves que se recuperan son inmunes y no transportan la enfermedad.

BOTULISMO:



El botulismo es una enfermedad rara, pero grave, causada por una toxina que ataca los nervios del cuerpo. Puede causar dificultad para respirar, parálisis muscular y hasta la muerte. Con mayor frecuencia la toxina es producida por la bacteria Clostridium botulinum.

Como se contrae: Causada por un subproducto bacteriano, comer o beber alimentos y agua infectada por botulismo
Síntomas: Los temblores rápidamente progresan a una parálisis corporal, incluyendo la respiración; las plumas se quitan sin mayor esfuerzo, muerte a las pocas horas.
Tratamiento: Antitoxina disponible a través de un veterinario, pero puede ser muy costosa. Si es detectada temprano trata con una cucharita de sales Epsom disueltas.
Cura disponible: Ninguna, encontrar y remover origen, usualmente restos en descomposición, carne cerca al agua, o insectos que se alimentan de la carne o el agua con los restos dentro.

CÓLERA EN AVES:



Como se contrae: Muerte bacterial, aves salvajes, mapaches, ratas, zarigüeyas, pueden tenerla. También es transmitida de ave a ave, en suelo contaminado, equipamiento, zapatos, ropa, alimento y agua contaminada.
Síntomas: Usualmente aves por debajo de los cuatro meses, diarrea amarilla verdosa, dificultad para respirar, articulaciones inflamadas, cabeza y vellos oscurecidos, usualmente muerte rápida. No infecta a humanos.
Tratamiento: Ninguno. Destruye a todas las aves infectadas si se recuperan el ave será un portador.
Vacuna disponible: Si, pero solo es administrada por especialistas.

BROQUITIS ENFECCIOSA:



La Bronquitis Infeccios ue afecta a las aves (pollos y gallinas) de todas las stribuida mundialmente. El virus de la Bronquitis In to respiratorio sino también el tracto uro-genital. El n aves infectadas y también pérdidas de producció n puede aparecer daño a los riñones. Los daños re ersas cepas del virus de la Bronquitis Infecciosa f ollos de engorda; además se puede observar lesiones en diferentes partes del oviducto, lo cual posteriormente afectará la producción de huevo, dicha producción se manifestará mermando su producción y la calidad del huevo (con la presentación de huevos en fárfara, huevos deformes, y huevos en forma de banda).

Síntomas: tos, estornudo, agua cayendo de nariz y ojos, las gallinas dejan de poner huevo.
Como se contrae: Enfermedad altamente contagiosa, se esparce por el aire, contacto o superficies contaminadas.
Tratamiento: Cuidado constante, el 50% de mortalidad en aves menores de 6 semanas.
Vacuna disponible: Si, deles a las gallinas antes de las 15 semanas de edad por que la vacuna causará que deje de poner huevo.

CORIZA INFECCIOSO:



La Coriza Infecciosa es una enfermedad bacteriana muy contagiosa que afecta el tracto respiratorio superior de pollos y gallinas; Aunque la enfermedad es muy conocida en gallinas, muchas veces su presencia pasa desapercibida en pollos de engorde infectados subclínicamente.
Síntomas: Cabezas, crestas y cuello hinchados, ojos cerrados e inflamados, secreción pegajosa de la nariz y ojos, zona húmeda debajo de las alas, la puesta de huevos se detendrá.

Como se contrae: Enfermedad bacterial, transmitida a través de aves portadoras, superficies contaminadas o beber agua infectada.
Tratamiento: Los pollos de engorde deben ser eliminadas ya que son portadores toda la vida.
Vacuna disponible: Ninguna.

ENFERMEDAD DE MAREK:



Síntomas: Las aves con menos de 29 semanas son afectadas, causa tumores externos e internos, parálisis, sus ojos se ponen grises y no reaccionan a la luz. Se puede apreciar parálisis flácida de alas y/o patas y puede ser unilateral o bilateral. Esto ocurre ya que las células tumorales invaden el sistema nervioso, con una afinidad específica por el nervio ciático. También se observa una parálisis flácida del cuello de las aves, que la mayoría de las veces es transitoria. Este cuadro está asociado a las cepas más virulentas de la enfermedad.
Como se contrae: Enfermedad viral, muy contagiosa, contraída al inhalar el polvo de las plumas de otras aves infectadas.
Tratamiento: Ninguno, alta tasa de muertes y ninguno de los sobrevivientes conserva la enfermedad.

NEW CASTLE:



La enfermedad de Newcastle es una enfermedad de aves altamente contagiosa que afecta tanto animales domésticos como silvestres. Afecta más notoriamente a las aves de corral debido a su alta susceptibilidad y los graves impactos que una epidemia puede causar en la industria avícola. Ésta es una condición de tipo respiratorio con diseminación rápida, disnea y lesiones en el sistema respiratorio, incluyendo los sacos aéreos.

Forma viscerotrópica: Se observa conjuntivitis, disnea, inflamación alrededor de los ojos, diarrea, depresión severa y muerte. Es posible observar signos nerviosos en los estadios finales de la enfermedad.

Forma neurotrópica: Se observan temblores nerviosos de la cabeza, tortícolis, parálisis de las alas o de las patas, en ocasiones se puede observar conjuntivitis y disnea. Las aves mueren debido a su incapacidad de alcanzar el agua y el alimento.
La mortalidad en las aves jóvenes puede alcanzar el 100%.

ENFERMEDAD INFECCIOSA DE LA BURSA (GUMBORO): La enfermedad infecciosa de la bolsa (IBD, Gumboro) es una infección viral altamente contagiosa aguda en pollos, manifestada por inflamación y posterior atrofia de la Bolsa de Fabricio, varios grados de nefritis-nefrosis e inmunosupresión. Clínicamente la enfermedad se observa solo en pollos de más de tres semanas de edad. Las plumas alrededor de la cloaca están usualmente erizadas con heces conteniendo gran cantidad de uratos.

El periodo donde aparecen la mayoría de signos clínicos y la tasa más alta de muerte es a la edad de 3-6 semanas. La IBD puede ser observada a menudo durante el periodo que las aves mantienen una bolsa funcional (más de 16 semanas de edad). En pollos menores a 16 semanas de edad la IBD pude ser sub clínica pero las lesiones en la bolsa producen inmunosupresión. También puede presentarse diarrea, anorexia, depresión, plumas erizadas especialmente en la región de la cabeza y el cuello.

