Sena Regional Cauca

DOCENTE

EDUARD IVAN PIEDRAHITA VELASCO

REGENTE DE FARMACIA

ANTIHIPERTENSIVOS



QUE SON LOS ANTIHIPERTENSIVOS

LOS ANTIHIPERTENSIVOS SON UN GRUPO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA NORMALIZAR UNA TENSIO ARTERIAL ANORMALMENTE ALTA.

ENTRE LOS ANTIHIPERTENSIVOS ENCONTRAMOS LOS DIURETICOS. QUE SON PILDORAS DE AGUA QUE AYUDAN A LOS RIÑONES A ELIMINAR ALGO DE SAL DEL CUERPO COMO RESULTADO LOS VASOS SANGUINEOS NO TIENEN QUE CONTENER TANTO LIQUIDO Y SU PRESION ARTERIAL BAJA

INDICACIONES

* SE UTILIZAN VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR LA HIPERTENSION ARTERIAL, EL MEDICO DECIDIRA QUE TIPO DE MEDICAMENTO ES APROPIADO PARA CADA PACIENTE, POSIBLEMENTE HAY QUE TOMAR MAS DE UN MEDICAMENTO PARA CONTROLAR LA TENSION ARTERIAL Y SOLO SE CONSUME BAJO FORMULA MEDICA.

EFECTOS SECUNDARIOS

LA MAYORIA DE MEDICAMENTOS PARA LA TENSION ARTERIAL SON FACILES DE TOMAR, PERO TODOS LOS MEDICAMENTOS TIENEN EFECTOS SECUNDARIOS, LA MAYORIA SON LEVES Y PUEDEN DESAPARECER CON EL TIEMPO.

TOS

DIARREA O ESTREÑIMIENTO

VERTIGO O MAREO LEVE

PROBLEMAS DE ERECCION

SENTIRSE NERVIOSO

EFECTOS SECUNDARIOS

* SENTIRSE CANSADO,DEBIL,SOÑOLIENTO,O CON FALTA DE ENERGIA
* DOLOR DE CABEZA
* NAUSEAS O VOMITOS
* ERUPCION CUTANEA
* PERDIDA O AUMENTO DE PESO SIN PROPONERSELO
* SI PRESENTA ALGUNOS DE ESTOS CAMBIOS ES MEJOR CONSULTAR AL MEDICO PARA QUE LE CAMBIEN LAS DOSIS Y REDUCIR LOS EFECTOS SECUNDARIOS

MEDICAMENTOS

* ENALAPRIL X 20MG Y 5MG DE MARCA RENITEC
* CAPTOPRIL X 25MG Y 50MG DE MARCA CAPOTEN
* LOSARTAN X 50MG X 100MG X 25MG DE MARCA SATOREN
* AMLODIPINO DE 5MG Y 10MG DE MARCA NORVAS Y AMLOSYN
* BETOPLOLOL X 50MG X 25MG X 100MG DE MARCA BETALOC

MEDICAMENTOS

* FUROSEMIDA DE 40MG DE MARCA LASIX HIDROCLOROTIAZIDA X 25MG Y 50MG
* ESPIRINOLACTONA X 25MG X 100MG ALDACTONE

GRACIAS


La presión sanguínea puede afectarse si se usan o dejan de usar ciertas drogas o medicamentos
ADAM.

ANTIDEPRESIVOS



QUE SON LOS ANTIDEPRESIVOS

SON MEDICAMENTOS QUE ACTUAN DIRECTAMENTE AUMENTANDO LA DISPONIBILIDAD EN EL CEREBRO. LO QUE BUSCAN ES CORREGIR EL DESEQUILIBRIO QUIMICO PROVOCADO POR LA DEPRESION.



ESTOS VAN ACTUAR SOBRE EL ANIMO MAS QUE EN LAS EMOCIONES DE UN DETERMINADO MOMENTO POR LO QUE LOS RESULTADOS SUELEN NO PODER VERSE DE MANERA INMEDIATA, SI NO QUE REQUIEREN TIEMPO PARA VER RESULTADOS.

INDICACIONES

LOS ANTIDEPRESIVOS SON MEDICAMENTOS QUE SON EXCLUSIVAMENTE PARA PACIENTES QUE SUFREN DE PRESION Y NO SE PUEDEN CONSUMIR SIN FORMULA MEDICA.

EFECTOS SECUNDARIOS

SUEÑO
DOLOR DE CABEZA
DOLOR DE ESTOMAGO
DEBILIDAD
E HIPERACTIVIDAD A MENUDO.

EFECTOS SECUNDARIOS

LA SELECCIÓN DE UN ANTIDEPRESIVO Y DE LA DOSIS ADECUADA PARA UN DETERMINADO CASO Y UNA PERSONA ESPECIFICA ES UN PROCESO LARGO Y COMPLICADO QUE REQUIERE EL CONOCIMIENTO DE UN PROFESIONAL. ALGUNOS ANTIDEPRESIVOS PUEDEN EMPEORAR INICIALMENTE LA DEPRESION INCLUSO CON PENSAMIENTOS DE SUICIDIO HACI COMO INDUCIR ANSIEDAD O CREAR AGRESIVIDAD.

MEDICAMENTOS

SERTRALINA X 50MG ZOLOCFT

FLUOXETINA PROZAC

BUPROPION WELLBETRIN

VELAFAXINA 75MG EFEXOR

DULOXETINA

IMIPRAMINA

GRACIAS




BRONCODILATADORES



QUE SON LOS BRONCODILATADORES

ES UNA SUSTANCIA QUE RELAJA Y DILATA LA MUSCULATURA DE LOS BRONQUIOS ESTO LOGRA UN AUMENTO DE FLUJO HACIA LOS PULMONES, SON IMPORTANTES EN TRATAMIENTO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS COMO EL ASMA O EL EPOC

EPOC



INDICACIONES

SE TOMAN A LARGO PLAZO PARA CONTROLAR O PREVENIR LA BRONCO CONSTRICCION, NO ESTAN PENSADOS PARA LOGRAR UN ALIVIO RAPIDO, SUELEN TENER EFECTO A LOS 20 MINUTOS O INCLUSO MENOS.

EFECTOS SECUNDARIOS

NAUSEAS

VISION BORROSA

DIARREA

DOLOR DE ESTOMAGO

INDIGESTION

ESTREÑIMIENTO

FRECUENCIA CARDIACA RAPIDA

EFECTOS SECUNDARIOS

DOLOR DE PECHO

VOMITO

DOLOR DE CABEZA

NERVIOSISMO

GARGANTA SECA

ARDOR EN LOS OJOS

ACIDEZ LEVE

EFECTOS SECUNDARIOS

AGITACION

ANSIEDAD

TEMBLORES

SUDURACION

ANSIEDAD.

MEDICAMENTOS

SALBUTAMOL (VENTYLAN)
TERBUTALINA (TERBUROT)
BROMURO DE IPRATROPIO (ATROVEN)
BECLOMETASONA
BUDESONIDA (PULMICOR) , (BUDEMAR)
SALMETAROL Y FLUTICASONA (SERETIDE)

GRACIAS

