

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTE GRUPO 1.

ITEM 1 (BRIO ADULTO) ITALCOL



Máximo comportamiento en competencia, trabajo pesado y exposición

BRIO Adultos contiene alto nivel de energía digestible para equinos debido a su concentración de ácidos grasos y la gelatinización de la fracción de almidones por efecto de la extrusión de los cereales.

Alta palatabilidad

La presentación texturizada, el uso de materias primas de alta calidad, estabilidad en la formulación y la inclusión de melaza explican la siempre alta y reconocida palatabilidad del BRIO.

Fortaleza y desarrollo de aplomos y fortaleza del casco

El diseño del BRIO hace énfasis en el nivel y balance de minerales traza y vitaminas, particularmente del complejo B, para garantizar una adecuada estabilidad y estructura de los aplomos y fortaleza de los cascos en equinos de alto rendimiento.

Brillo y suavidad del pelaje

El balance mineral, vitamínico y graso de BRIO ADULTOS garantizan un pelaje brillante y sedoso durante toda la lactancia.

INDICACIONES DE USO

BRIO ADULTOS debe ser ofrecido al 1% del peso de los animales con una frecuencia de dos veces diarias y máximo 2 kilos por cada vez.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

HUMEDAD (Max.)	13%
PROTEINA (Min.)	16%
GRASA (Min.)	9%
FIBRA (Max.)	12%
CENIZAS (Max.)	12%



Brio Adultos se encuentra en presentaciones de : 40 kg.

ICA 6180 AL

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 2. (CAMPEON DORADO) SOLLA



Introducción

Campeón Dorado es un producto texturizado, mezcla de materias primas molidas enmelazadas, materias primas peletizadas, granos de maíz y avena chancados al vapor. De esta manera se combina y optimiza las ventajas del alimento enmelazado, con fuentes de proteína mejoradas mediante la peletización y con ingredientes energéticos precocidos y chancados, para ofrecer la mejor digestibilidad y palatabilidad. Además, utiliza azúcar y aceites vegetales, importantes por su alto valor nutricional y por ser muy apetecibles para los equinos.

Presentaciones

Campeón Dorado se ofrece texturizado x 40 kilogramos, en empaques de polipropileno laminado para preservar mejor el alimento.

Composición Garantizada

Proteína	Mínimo	15%
Grasa	Mínimo	3%
Fibra	Máximo	10%
Cenizas	Máximo	10%
Humedad	Máximo	13%

Registro ICA 3637 AL

Dosificación

Suministre Campeón Dorado a razón de 0.5 a 1.5 kilogramos por cada 100 de peso vivo, mínimo en 3 raciones diarias y no exceda nunca 2 kilogramos en cada una de ellas

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 3. (NUTRECAN ADULTO) SOLLA



Si tu perro tiene un estilo de vida urbano, vive en espacios reducidos y tiene actividad moderada, requiere compuestos nutricionales propios a su estilo de vida, por eso **Nutrecan Adultos razas medianas y grandes** es su alimento ideal, ya que es muy completo y balanceado.

Tiene forma de deliciosas croquetas, cuya fórmula combina una saludable mezcla de nutrientes de alta digestibilidad con un sabor que a tu perro le encantará.

La proteína es de alta calidad y alta digestibilidad, importante para el mejor mantenimiento y funcionamiento de los músculos en los perros adultos de todas las razas.

El arroz, maíz, gluten de maíz, trigo y aceites vegetales, como principales ingredientes, complementan una dieta balanceada que garantiza el mejor sabor, salud y larga vida a las mascotas.

Aceites vegetales y aceite de pescado, fuentes de Omega 6 y 3 , proporcionan una piel sana y garantiza un pelaje brillante, sistema nervioso central activo y buena visión. Ingredientes especiales, como la Yucca Shidigera y los Prebióticos, aumentan la digestibilidad y promueven que las mascotas tengan heces sólidas, en menos cantidad y sin olor.

Composición Garantizada

INGREDIENTES: maíz amarillo, granza de arroz, harina de carne, subproducto de pollo, grasa animal (estabilizada con vitamina E), gluten de maíz, digerido de pollo, fosfato bicálcico, sal, lisina, metionina, cloruro de colina, vitaminas (A, D, E), vitamina (B1, B2, B6, B12, C), prebiótico (manano oligosacáridos), niacina, ácido fólico, biotina, pantotenato de calcio, sulfato de hierro, proteinato de manganeso, proteinato de cobre, proteinato de zinc, cloruro de potasio, colorantes (amarillo No. 6, rojo No. 40).

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

COMPOSICIÓN GARANTIZADA /

GUARANTEED ANALYSIS:

PROTEÍNA

GRASA

FIBRA

CENIZA

CALCIO

FÓSFORO

HUMEDAD

PROTEIN

FAT

FIBER

ASH

CALCIUM

PHOSPHORUS

MOISTURE

MÍNIMO

MÍNIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

MÍNIMO

MÍNIMO

MÁXIMO

MINIMUM

MINIMUM

MAXIMUM

MAXIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MAXIMUM

21.0%

10.0%

5.0%

8.0%

1.0%

0.8%

12.0%

Registro ICA 8687 AL ICA Registration 8687 AL

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 4. (NUTRECAN SENIOR) SOLLA



Cuando tu perro tiene más de 7 años, entra en una nueva etapa de su vida donde sus requerimientos nutricionales cambian también.

Por esto debes darle **NUTRECAN SENIOR**, un alimento 100% completo y balanceado, de alta digestibilidad, que contiene ingredientes naturales que proporcionan una sana y sabrosa nutrición para tu perro, contrarrestando el paso de los años y haciéndolo más fuerte.

Es un alimento completo y balanceado de alta digestibilidad, que contiene ingredientes naturales que proporcionan una sana y sabrosa nutrición para tu perro en la tercera edad.

Composición Garantizada

INGREDIENTES: granza de arroz, maíz amarillo, subproductos de pollo, harina de carne, trigo entero, gluten de maíz, aceite de pollo (estabilizado con vitamina E), cascarilla de avena, digerido de pollo, aceite de pescado (estabilizado con vitamina E), hemoglobina, carbonato de calcio, fosfato bicálcico, sal, cloruro de potasio, lisina, metionina, vitaminas (A, D, E), vitaminas (B1, B2, B6, B12, C), niacina, ácido fólico, biotina, pantotenato de calcio, cloruro de colina, proteinato de selenio, proteinato de zinc, sulfato de hierro, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, prebiótico (manano-oligosacáridos), sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA / GUARANTEED ANALYSIS:				
PROTEÍNA	PROTEIN	MÍNIMO	MINIMUM	26.0%
GRASA	FAT	MÍNIMO	MINIMUM	7.0%
FIBRA	FIBER	MÁXIMO	MAXIMUM	6.0%
CENIZA	ASH	MÁXIMO	MAXIMUM	8.0%
CALCIO	CALCIUM	MÍNIMO	MINIMUM	1.0%
FÓSFORO	PHOSPHORUS	MÍNIMO	MINIMUM	0.7%
HUMEDAD	MOISTURE	MÁXIMO	MAXIMUM	12.0%

Registro ICA 9386 AL ICA Registration 9386 AL

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 5. (DOG CHOW ADULTOS)



Tu perro es único - ya creció y le fascina ser un miembro activo de tu familia. Es por eso que se merece un alimento que nutra todo lo que lo hace tan especial. PURINA® DOG CHOW® Adultos Razas Medianas y Grandes está específicamente formulado con los nutrientes e ingredientes de calidad que lo ayudarán a tener salud y vitalidad por muchos más años.

Beneficios

Proteínas y calcio ayudan a reforzar unos fuertes huesos, músculos y dientes.

- Producto altamente palatable, aporta nutrición completa y balanceada, elaborado especialmente para perros adultos que pesan 10 kilos o más de peso.
- Con Fibras Naturales para mejorar la digestión de tu perro, así estará con más ánimo y ganas de pasear en familia

Cuidados veterinarios

Consulte periódicamente al médico veterinario. Mantenga siempre agua fresca y limpia al alcance de su perro. Mantener fuera del alcance de los niños. Conserve el producto en un lugar fresco y seco, y no lo sirva si cambia de apariencia o color.

- **ANÁLISIS GARANTIZADO**
- **INGREDIENTES**
- Proteína Cruda (min.) 21,0%
- Grasa Cruda (min.) 10,0%
- Fibra Cruda (max.) 4,0%
- Humedad (max.) 12,0%
- Calcio (min. / max.) 1,2% / 1,8%
- Fósforo (min. / max.) 0,8% / 1,4%

PRESENTACION 22.7 KILOS

REGISTRO ICA 8323 AL

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 6. (DOG CHOW EDAD MADURA)



Le brinda la alimentación ideal, para que siga al máximo en su nueva etapa de vida!

Purina® Dog Chow® EDAD MADURA® ayuda a mantener la salud y vitalidad de tu perro, ya que todos quieren disfrutar al máximo momentos con él. Con el consumo regular de PURINA y manteniendo una condición corporal podrá vivir mejor por más tiempo.

- ANÁLISIS GARANTIZADO
- Proteína Cruda (mín.) 25,0%
- Grasa Cruda (mín.) 8,0%
- Fibra Cruda (máx.) 7,0%
- Humedad (máx.) 12,0%
- Cenizas (máx.) 8,5%
- Calcio (mín./máx) 1,1% / 1,7%
- Fósforo (mín./máx) 0,7% / 1,2%

Ahora puedes sentirte bien al ofrecerle un alimento que es bueno para él.



Glucosamina



Croquetas con textura especial



PRESENTACION X 17 KILOS

REGISTRO ICA 8325

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 7. (DOG CHOW ADULTOS CORDERO Y ARROZ)



Texturas y sabores ideales para que alimentes a ese miembro tan especial de la familia.

Beneficios

- MÚSCULOS Y HUESOS FUERTES
- ÓRGANOS SALUDABLES

ANÁLISIS GARANTIZADO

- Proteína : (Mín)9,5 %
- Grasa Cruda : (Mín)3,0 %
- Fibra Cruda : (Máx)1,5 %
- Humedad . (Máx)80,0%
- Cenizas : (Máx)

INGREDIENTES

- Agua suficiente para proceso, Carne de pollo y/o pavo, Hígado de cerdo, Gluten de trigo, Carne de cordero, Visceras de cerdo, Arroz, Harina de soya, Almidón de maíz modificado, Sal, Fosfato de calcio, Cloruro de potasio, Colores (caramelo y óxido hierro), Cloruro de colina, Carbonato de calcio, Sulfato de zinc, Suplemento de vitamina E, Sulfato ferroso, Niacina, Sulfato de cobre, Mononitrato de tiamina, Sulfato de manganeso, Pantotenato de calcio, Hidrocloruro de piridoxina, Pantotenato de calcio, Suplemento de vitamina B-12, Duplemento de riboflavina, Duplemento de vitamina A, Ioduro de potasio, Ácido fólico, Suplemento de vitamina D-3, Biotina, Selenito de sodio

PRESENTACION LATA 374 GR

REGISTRO ICA 6407

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 8. (MELAZA) RIOPAILA LA CATILLA



[Inicio](#)

[Conózcenos](#)

[Nuestros Productos](#)

[Nuestros clientes](#)

[Contáctenos](#)

Producimos productos con altos estándares de calidad y de acuerdo a los requerimientos y **necesidades de nuestros clientes.**



Conoce más sobre
Riopaila Castilla

Portafolio de Productos



Melaza de Caña

Producto de consistencia líquida de alta viscosidad. Con olor y color característicos de la miel de caña. También llamada miel de purga, melaza o miel final.

Composición

Propiedades	Unidades	Especificación
Fisicoquímicas		
Cenizas	%	Máx. 16
Azúcares totales	%	Mín. 48
Grados Brix	° Brix	Mín. 85

Presentaciones

30 kg y Granel.

Opciones de uso

Industria de concentrados para animales y producción de alcohol y bebidas.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 9. (BRIO SALES) ITALCOL

BRIO SALES * 20 Kilogramos (ITALCOL)



DESCRIPCIÓN

Balance mineral adecuado para el metabolismo de los equinos

El metabolismo y requerimiento de macro y micro minerales en equinos se diferencia de manera importante de los rumiantes. Por esta razón es importante el uso de sales mineralizadas diseñadas específicamente para esta especie.

El balance mineral en **BRIO SALES** ha sido diseñado con base en información internacional actualizada, utilizando fuentes con la más alta biodisponibilidad para cada uno de los minerales

INDICACIONES DE USO

BRIO SALES es una sal mineralizada para suministrar como suplemento a equinos en crecimiento, adultos en trabajo moderado y yeguas en lactancia. El consumo estimado en animales de crecimiento es de 60 gr/día y 100 gr/día para animal adulto y hembras en lactancia. **Brio sales** debe ser ofrecida a voluntad en saladeros protegidos del agua lluvia.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cloruro de Sodio	29 % Mínimo
Calcio	18 % Mínimo
Fósforo	8 % Mínimo
Magnesio	1.20% Mínimo
Azufre	5% Mínimo
Cobre	0.24% Mínimo
Cobalto	0.002% Mínimo
Yodo	0.0012% Mínimo
Zinc	0.90% Mínimo
Selenio	0.003% Mínimo
Cromo	0.0004% Mínimo
Flúor	0.06% Máximo
Humedad	5.0 % Máximo

PRESENTACIÓN (Peso neto al empacar en kilogramos)

20kg, 40 kg.

Registro ICA 9509 SL

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 11. (GANASAL EQUINOS) GANASAL

FICHA TÉCNICA GANASAL EQUINOS

BENEFICIOS:

Aporte suficiente de minerales.

Adecuada digestibilidad de los forrajes.

Buen desarrollo del Tejido óseo.

Mejora en la fertilidad de las hembras.

Buena presentación de piel y pelo.

Elevación de la inmunidad.

Protección del casco.

Adecuados valores hemáticos.

GANASAL EQUINOS contiene Cromo, mineral anti estrés que actúa como calmante en pesebreras, evitando conductas de ansiedad- muerdan la pesebrera y rasen o gasten la dentadura-

El cromo interviene también en la movilización de oxígeno a nivel sanguíneo aumentando la resistencia al ejercicio en animales de competencia. Así mismo el uso de este elemento previene el envaramiento.

El Zinc actúa como precursor de la queratina del pelo y del casco, brindando junto con el azufre un pelo lustroso y una baja incidencia de cojeras.

INDICACIONES:

Sal mineralizada diseñada especialmente para equinos, mulares, asnales, reforzada en Calcio, Magnesio y microminerales.

FUNCIONES:

Sal mineral para equinos, mulares o asnales de labor, competencia, equitación ó exposición

COMO SE USA Y DOSIS:

GANASAL EQUINOS se suministra a granel en saladeros cubiertos. También cuenta con la presentación de sal mineralizada en bloque con presentación de 4 kilos, disminuyendo ansiedad en los animales confinados.

PRESENTACIONES:

Bulto por 40 o 50 kilos, mochila de fique de 10 kilos, bloque mineral de 25 y 4 kilogramos.

Sales Mineralizadas



¡RESULTADOS QUE SE VEN!

Calcio	20.00%
Fósforo	5.00%
Cloruro de sodio	30.50%
Humedad	5.00 % Max



REG. ICA 7171 SL



www.ganasal.com

Km 1 Vía Chimitá sector palenque - Girón, Santander
Tel: (7) 6760130 - Celular: 320 306 2812



ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 11. (HENO)

LA GLORIA GANADERÍA LTDA.

BOGOTÁ

HENO DE PASTO PANGOLA



Composición nutricional	Unidad	Cantidad
Materia seca	%	88,00
NDT	%	48,11
Energía digestible	Mcal/kg	x
Energía metabolizable	Mcal/kg	x
Proteína (TCO)	%	9.84
Calcio (TCO)	%	0,47
Fósforo total (TCO)	%	0,32
Grasa (TCO)	%	1,76
Ceniza (TCO)	%	8.51
Fibra (TCO)	%	38.83
Peso	Kg	15

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

MATERIAL QUIRURGICO Y VETERINARIO GRUPO 2.

ITEM 1. (CUTAMYCON) CHALVER



Laboratorio:

Chalver
Laboratorios

LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. SALUD ANIMAL

Carrera 106 15 25 MZ 6 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)7245090

Fax: +(571)7245090

Mail: gciaveterinaria@chalver.com.co

Sitio web: www.chalver.com

Uso terapéutico: CREMA DERMATOLOGICA

Principio Activo: CLOTRIMAZOL, NEOMICINA, BETAMETASONA

Especies:



Descripción:

CUTAMYCON VF es una crema dermatológica

Composición	Contenido
Clotrimazol	1 g
Neomicina (como sulfato)	0.5 g
Betametasona (como 17 valerato)	0.04 g
Excipientes csp	100 g

- **ACCIÓN:** Crema bactericida, antiinflamatoria y antimicótica
- **INDICACIONES:** Acción tópica polivalente: Bactericida, Fungicida y Antiinflamatoria, para afecciones e inflamaciones de la piel de los animales domésticos. Hongos: Trichophyton verrucosum, Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Microsporum gypseum y Candida albicans. Bacterias Gram positivas: Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Bacterias Gram negativas: Proteus spp., Aerobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Shigella spp. En

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

intertrigo, alopecia areata, onicomycosis, otitis externa, y afecciones dérmicas de etiología micótica y bacterianas. Reduce los síntomas de prurito y edemas, evitando escoriaciones y automutilaciones generadas por la acción pruriginosa

- **DOSIS:** Aspersión Aplicación tópica, sobre la piel en la región afectada, distribuyendo la crema uniformemente para garantizar un buen contacto. Prolongar la aplicación durante varios días, después de la resolución de los síntomas, para asegurar el resultado del tratamiento.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Crema dermatológica
- **PRESENTACIÓN:** Tubo colapsible por 35 y 100 g
- **REGISTRO:** 4043 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 2. (MIXILAND) VETERLAND



Laboratorio:



LABORATORIOS VETERLAND LTDA

Cr. 19 B 168 - 16 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)6789851

Fax: +(571)6789830

Mail: contacto@laboratoriosveterland.com

Sitio web: www.laboratoriosveterland.com

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: PENICILINA POTASICA, PENICILINA PROCAINICA, ESTREPTOMICINA

Especies:



Descripción:

MIXILAND FM es una asociación antibiótica bactericida

Composición	Contenido
Penicilina G procaínica	166.667 UI
Penicilina G potásica	166.667 UI
Estreptomicina sulfato	334 mg

- **ACCIÓN:** Antibiótico
- **INDICACIONES:** Mixiland*F.M. está indicado en el tratamiento de las enfermedades infecciosas de los bovinos, equinos, caprinos, porcinos, caninos, ovinos y aves, ocasionados por gérmenes sensibles a la Penicilina y/o Estreptomicina, tales como:

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

*Streptococosis, Estafilococosis, Neumonía, Bronquitis, Mastitis, Leptospirosis, Pasteurellosis ó Septicemia hemorrágica, Actinomicosis, Actinobacilosis Colibacilosis, Carbón bacteridiano, Carbón sintomático, Vibriosis bovina, Disentería vibriónica, Artritis y Poliartritis infecciosa, Hemoglobinuria bacilar, Edema maligno, Tétano, Erisipela, Listeriosis, Adenitis, Pododermatitis infecciosa, Vaginitis, Metritis, Nefritis, Pielonefritis, Cistitis, Abscesos y procesos piógenos por microorganismos, sensibles, Necrobacilosis, Infecciones cutáneas y podales por microorganismos sensibles, Enterotoxemia. Aves: Mixiland*F.M. por su acción bactericida sinérgica, su espectro ampliado y su buena difusión a Tejido pulmonar, se recomienda para el tratamiento de las infecciones respiratorias mixtas de las aves; cólera aviar, moquillo ó coriza infecciosa, hepatitis infecciosa bacteriana, sinusitis de los pavos y especialmente en las enfermedades infecciosas complicadas como la E.R.C. en donde el principal germen de complicación es la Escherichia coli, microorganismo Gram negativo que presenta problemas de resistencia a muchos antimicrobianos, pero muy sensible a la Estreptomycin.*

- **DOSIS:** Mixiland*F.M. debe administrarse únicamente por vía intramuscular profunda (nunca endovenosa ni subcutánea).

En los bovinos y equinos, el sitio de aplicación recomendado es la tabla del cuello, ó en la grupa, en las aves en la pechuga; a las demás especies, en la pierna o en el jamón. Deben usarse jeringas y agujas previamente hervidas, no desinfectar las jeringas con alcohol, ya que puede alterar parcialmente la actividad de la penicilina.

*Las Penicilinas G Potásica y G Procaínica se dosifican entre 10.000 y 22.000 U.I./kg de peso vivo cada 12 y 24 horas respectivamente. La Estreptomycin se dosifica en un rango de 10 a 20 mg/kg de peso vivo. Aplicar Mixiland*F.M. 3 mL por cada 50-100 kg de peso vivo por vía intramuscular. En la práctica se recomienda aplicar diariamente Mixiland*F.M. así:*

ESPECIES MAYORES:

*Animales que pesen entre 200-400 kg: Un frasco de Mixiland*F.M. 4+4*

*Animales que pesen entre 400-800 kg: Un frasco de Mixiland*F.M. 8+8*

ESPECIES MENORES:

Aplicar 1 a 2 mL por cada 15 kg de peso vivo.

*AVES: Reconstituir el contenido del frasco de Mixiland*F.M. 4+4 en 125 mL de agua destilada ó el frasco de Mixiland*F.M. 8+8 en 250 mL y aplicar vía intramuscular 0.5 mL en aves con peso menor de 1 kg ó 1 mL por cada kg de peso vivo. En esta dilución de Mixiland*F.M., cada mL contiene 32.000 U.I. de Penicilina y 32 mg de Estreptomycin. El tratamiento debe repetirse diariamente durante 3 días. En todos los casos, éstas dosis y la frecuencia de aplicación, pueden ser aumentadas a criterio del Médico Veterinario, según la severidad de la infección y la especie tratada.*

- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse hasta 30 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES:** No se use en felinos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del médico veterinario
- **MODO DE APLICACIÓN:** Polvo para reconstituir
- **PRESENTACIÓN:** Mixiland*F.M. se presenta en forma de polvo para reconstituir en frasco ampolla de vidrio siliconado y agrafe; la silicona evita que el polvo se adhiera al vidrio, permitiendo extraer todo el contenido con

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

mayor facilidad.

*Mixiland*F.M. 4+4: Frasco ampolla con 4.000.000 U.I. de Penicilina, 4 g de Estreptomicina y 10 mL de diluyente, que producen 12 mL de suspensión.*

*Mixiland*F.M. 8+8: Frasco ampolla con 8.000.000 U.I. de Penicilina, 8 g de Estreptomicina y 20 mL de diluyente, que producen 24 mL de suspensión.*

*Agregue mediante aguja hipodérmica el diluyente que acompaña el frasco de Mixiland*F.M.; agite el frasco mientras se adiciona el diluyente y antes de extraer su contenido. Introduzca un poco de aire en el frasco para facilitar la extracción de la suspensión. Una vez reconstituido Mixiland*F.M. se conserva estable por una semana bajo refrigeración. El producto después de reconstituido, puede tomar un color amarillo, lo que es normal por el vehículo y los excipientes, sin que sufra pérdida de potencia.*

- **REGISTRO:** 2422 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 3. (MIXILAND) VETERLAND



Laboratorio:



LABORATORIOS VETERLAND LTDA

Cr. 19 B 168 - 16 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)6789851

Fax: +(571)6789830

Mail: contacto@laboratoriosveterland.com

Sitio web: www.laboratoriosveterland.com

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: PENICILINA POTASICA, PENICILINA PROCAINICA, ESTREPTOMICINA

Especies:



Descripción:

MIXILAND FM es una asociación antibiótica bactericida

Composición	Contenido
Penicilina G procaínica	166.667 UI
Penicilina G potásica	166.667 UI
Estreptomicina sulfato	334 mg

- **ACCIÓN:** Antibiótico
- **INDICACIONES:** Mixiland*F.M. está indicado en el tratamiento de las enfermedades infecciosas de los bovinos, equinos, caprinos, porcinos, caninos, ovinos y aves, ocasionados por gérmenes sensibles a la Penicilina y/o Estreptomicina, tales como:

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

*Streptococosis, Estafilococosis, Neumonía, Bronquitis, Mastitis, Leptospirosis, Pasteurellosis ó Septicemia hemorrágica, Actinomicosis, Actinobacilosis Colibacilosis, Carbón bacteridiano, Carbón sintomático, Vibriosis bovina, Disentería vibriónica, Artritis y Poliartritis infecciosa, Hemoglobinuria bacilar, Edema maligno, Tétano, Erisipela, Listeriosis, Adenitis, Pododermatitis infecciosa, Vaginitis, Metritis, Nefritis, Pielonefritis, Cistitis, Abscesos y procesos piógenos por microorganismos, sensibles, Necrobacilosis, Infecciones cutáneas y podales por microorganismos sensibles, Enterotoxemia. Aves: Mixiland*F.M. por su acción bactericida sinérgica, su espectro ampliado y su buena difusión a Tejido pulmonar, se recomienda para el tratamiento de las infecciones respiratorias mixtas de las aves; cólera aviar, moquillo ó coriza infecciosa, hepatitis infecciosa bacteriana, sinusitis de los pavos y especialmente en las enfermedades infecciosas complicadas como la E.R.C. en donde el principal germen de complicación es la Escherichia coli, microorganismo Gram negativo que presenta problemas de resistencia a muchos antimicrobianos, pero muy sensible a la Estreptomicina.*

- **DOSIS:** Mixiland*F.M. debe administrarse únicamente por vía intramuscular profunda (nunca endovenosa ni subcutánea).

En los bovinos y equinos, el sitio de aplicación recomendado es la tabla del cuello, ó en la grupa, en las aves en la pechuga; a las demás especies, en la pierna o en el jamón. Deben usarse jeringas y agujas previamente hervidas, no desinfectar las jeringas con alcohol, ya que puede alterar parcialmente la actividad de la penicilina.

*Las Penicilinas G Potásica y G Procaínica se dosifican entre 10.000 y 22.000 U.I./kg de peso vivo cada 12 y 24 horas respectivamente. La Estreptomicina se dosifica en un rango de 10 a 20 mg/kg de peso vivo. Aplicar Mixiland*F.M. 3 mL por cada 50-100 kg de peso vivo por vía intramuscular. En la práctica se recomienda aplicar diariamente Mixiland*F.M. así:*

ESPECIES MAYORES:

*Animales que pesen entre 200-400 kg: Un frasco de Mixiland*F.M. 4+4*

*Animales que pesen entre 400-800 kg: Un frasco de Mixiland*F.M. 8+8*

ESPECIES MENORES:

Aplicar 1 a 2 mL por cada 15 kg de peso vivo.

*AVES: Reconstituir el contenido del frasco de Mixiland*F.M. 4+4 en 125 mL de agua destilada ó el frasco de Mixiland*F.M. 8+8 en 250 mL y aplicar vía intramuscular 0.5 mL en aves con peso menor de 1 kg ó 1 mL por cada kg de peso vivo. En esta dilución de Mixiland*F.M., cada mL contiene 32.000 U.I. de Penicilina y 32 mg de Estreptomicina. El tratamiento debe repetirse diariamente durante 3 días. En todos los casos, éstas dosis y la frecuencia de aplicación, pueden ser aumentadas a criterio del Médico Veterinario, según la severidad de la infección y la especie tratada.*

- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse hasta 30 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES:** No se use en felinos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del médico veterinario
- **MODO DE APLICACIÓN:** Polvo para reconstituir
- **PRESENTACIÓN:** Mixiland*F.M. se presenta en forma de polvo para reconstituir en frasco ampolla de vidrio siliconado y agrafe; la silicona evita que el polvo se adhiera al vidrio, permitiendo extraer todo el contenido con

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

mayor facilidad.

*Mixiland*F.M. 4+4: Frasco ampolla con 4.000.000 U.I. de Penicilina, 4 g de Estreptomicina y 10 mL de diluyente, que producen 12 mL de suspensión.*

*Mixiland*F.M. 8+8: Frasco ampolla con 8.000.000 U.I. de Penicilina, 8 g de Estreptomicina y 20 mL de diluyente, que producen 24 mL de suspensión.*

*Agregue mediante aguja hipodérmica el diluyente que acompaña el frasco de Mixiland*F.M.; agite el frasco mientras se adiciona el diluyente y antes de extraer su contenido. Introduzca un poco de aire en el frasco para facilitar la extracción de la suspensión. Una vez reconstituido Mixiland*F.M. se conserva estable por una semana bajo refrigeración. El producto después de reconstituido, puede tomar un color amarillo, lo que es normal por el vehículo y los excipientes, sin que sufra pérdida de potencia.*

- **REGISTRO:** 2422 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 4. (TRIPEN LA) VECOL



Laboratorio:



EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS " VECOL"

Av. El Dorado 82 - 93 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)4254800

Fax: +(571)4254835

Mail: vecol@vecol.com.co

Sitio web: www.vecol.com.co

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: PENICILINA PROCAINICA, PENICILINA BENZATINICA, PENICILINA POTASICA

Especies:



Descripción:

TRIPEN L. A. es un antibiótico

Composición	Por cada ml reconstituído
Penicilina G benzatínica	125.000 UI
Penicilina G procaínica	62.500 UI
Penicilina G potásica	62.500 UI
Exipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Antibiótico
- **INDICACIONES:** Para el tratamiento de infecciones producidas por microorganismos sensibles a las penicilinas: *Streptococcus* sp., *Bacillus anthracis*, *Erysipelothrix* sp., *Actinomyces pyogenes*, *Clostridium* sp., *Fuso*

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

bacterium sp., Listeria sp., Nocardia sp., Leptospira sp., Actinomyces sp. Y Actinobacillus sp

A continuación se relaciona las enfermedades contra las cuales actúa el Tripen

® L.A. y los gérmenes que las producen:

Carbón bacteriano - Bacillus Anthracis

Carbón sintomático - Clostridium chauvoei

Hemoglobinuria bacilar - Clostridium haemolyticum

Hepatitis necrótica - Clostridium novyi

Enterotoxemia - Clostridium perfringens

Edema maligno - Clostridium septicum

Tétanos - Clostridium tetani

Mastitis - Corynebacterium pyogenes

Mal rojo del cerdo - Erysipelothrix insidiosa

Eczema exudativo - Staphylococcus

Adenitis equina - Streptococcus equi

Actinomycosis - Actinomyces bovis

Leptospirosis - Leptospira sp

Listeriosis - Listeria sp.

Nocardiosis - Nocardia asteroides.

- **DOSIS:** La dosis de penicilinas es de 10.000 UI a 20.000 UI / kg de peso vivo, es decir, 1 ml Tripen® L.A. reconstituido / 10 kg de peso vivo. Se aplica por vía intramuscular profunda.

Para reconstituir el TRIPEN® L.A. utilizar la siguiente información:

ml diluyente	TRIPEN L. A.
5	1'500.000 UI
10	3'000.000 UI
20	6'000.000 UI
30	9'000.000 UI

- *Para facilitar la dosificación observar el siguiente cuadro:*

Peso vivo en kg	ml TRIPEN L. A.
10	1
20	2
60	6
120	12
240	24
400	40

- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

La leche producida durante el tratamiento y 6 días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

- **CONTRAINDICACIONES:** Excediendo las dosis recomendadas y niveles de dosificación se pueden presentar residuos de antibióticos superiores a los permitidos para el tiempo de retiro.

La Penicilina G es una sustancia de baja toxicidad, sin embargo, efectos adversos, como alergias o reacciones anafilácticas, algunas veces fatal, se han presentado en animales hipersensible a la penicilina o procaína.

Como sucede en todas las preparaciones de antibióticos, el uso inadecuado de este medicamento puede causar un sobrecrecimiento de organismos no susceptibles, incluyendo hongos. Una baja respuesta en el animal tratado o el desarrollo de nuevos signos o síntomas sugiere que un crecimiento de organismos no susceptibles esta sucediendo.

Debido a que los medicamentos bactericidas pueden interferir con la acción bacteriostática de las tetraciclinas, se recomienda evitar el uso conjunto de este producto con tetraciclinas.

- **MODO DE APLICACIÓN:** Polvo estéril para reconstituir
- **PRESENTACIÓN:** Frascos por 1,5, 3, 6 y 9 millones de UI de penicilinas totales con su respectivo diluyente.
- **REGISTRO:** 1770 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 5. (VETERFLUXINA) VETERLAND



Laboratorio:



LABORATORIOS VETERLAND LTDA

Cr. 19 B 168 - 16 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)6789851

Fax: +(571)6789830

Mail: contacto@laboratoriosveterland.com

Sitio web: www.laboratoriosveterland.com

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: PENICILINA PROCAINICA, ESTREPTOMICINA, FLUMETASONA

Especies:



Descripción:

VETER-FLUCINA es un asociación antibiótica y antiinflamatoria

Composición	Contenido
Penicilina G procaínica	200.000 UI
Estreptomicina	250 mg
Flumetasona	0.0625 mg
Solvente csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Antibiótico, antiinflamatorio
- **INDICACIONES:** Veter-Flucina* y Veter-Flucina* F es un antibiótico bactericida antiinflamatorio, indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos, para el tratamiento de enfermedades producidas por: Streptococcus sp., Staphylococcus sp. Mastitis, abscesos, heridas infectadas, pododermatitis, infecciones respiratorias, digestivas y renales en donde son de frecuente presentación estos gérmenes), Clostridium sp. (Edema maligno, carbón

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

sintomático, enterotoxemia, tétanos, hemoglobinuria bacilar, hepatitis necrótica infecciosa), *Corynebacterium* sp. (Neumonía infecciosa, mastitis, pielonefritis), *Leptospira* sp. (Leptospirosis en las diferentes especies), *Bacillus anthracis* (Carbón bacteridiano o ántrax), *Pasteurella* sp. (Septicemia hemorrágica o pasterelosis), *Haemophilus* sp. (Poliartritis infecciosa), *Fusobacterium* sp. (Necrobacilosis o pododermatitis infecciosa), *Erysipelotrix* sp. (Erisipela). El disponer de un producto como Veter-Flucina* y Veter-Flucina*F que asocia dos antibióticos bactericidas y el más potente antiinflamatorio, resulta conveniente porque contribuye a eliminar enfermedades y lesiones que alteran la salud y la producción animal.

- **DOSIS:** Bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos: 5 mL por cada 100 Kg de peso vivo. Caninos: 1 a 2 mL por cada 5 Kg de peso vivo. Lavados vaginales e intrauterinos: Frasco de Veter-Flucina* de 20 mL en 50 a 100 mL de agua destilada o suero glucosado y el frasco de Veter-Flucina*F de 30 mL en 100 a 150 mL de agua destilada o suero glucosado. El tratamiento deberá repetirse diariamente por 3 a 5 días; sin embargo, la dosis, la frecuencia y la duración del mismo, pueden variar a criterio del Médico Veterinario. Veter-Flucina* todo el frasco de 20 mL para animales que pesen entre 200 y 400 Kg de peso vivo, y Veter-Flucina*F frasco de 30 mL para animales que pesen entre 400 y 600 Kg de peso vivo.
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES:** No administrar a gatos. No debe usarse en el último tercio de la gestación. Venta bajo fórmula del médico veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños
- **MODO DE APLICACIÓN:** Polvo para reconstituír
- **PRESENTACIÓN:** Veter-Flucina* viene en frasco de vidrio siliconado para evitar que el polvo se adhiera al vidrio, permitiendo extraer todo el contenido con mayor facilidad. Veter-Flucina* todo el frasco de 20 mL y Veter-Flucina*F frasco de 30 mL
- **REGISTRO:** 3075 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 6. (AMOXISOL) BAYER



Laboratorio:



BAYER S.A.

Av. Américas 57 - 52 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)4142277

Fax: 4234070 EXT 4382

Sitio web: www.bayerandina.com

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: AMOXICILINA

Especies:



Descripción:

AMOXISOL es una penicilina semi sintética de amplio espectro

Composición	Contenido
Amoxicilina (trihidrato)	150 mg
Excipientes	1 ml

- **ACCIÓN:** Antibiótico
- **INDICACIONES:** Esta indicado en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos para el tratamiento de infecciones en el tracto respiratorio, tracto digestivo, piel, tracto Urogenital y control de infecciones post-quirúrgicas causadas por bacterias como: Actinobacillus sp., Actinomyces bovis, Bacillus anthracis, Bordetella bronchiseptica, Clostridium sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia coli Haemophilus sp., Pasteurella sp., Proteus mirabilis, Salmonella sp, Streptococcus sp. Y Staphylococcus sp.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **DOSIS:** 15 mg/kg de peso, lo que equivale en la practica a 1 ml por cada 10 kg de peso.
Si es necesario la dosis puede repetirse después de 48 horas. Durante 2 a 3 veces. Se aplica por vía intramuscular solamente en bovinos, porcinos, ovinos y por vía intramuscular o subcutánea en caninos y felinos. No se debe aplicar una dosis mayor a 10 ml en el mismo lugar y se recomienda proporcionar un masaje en el área de aplicación.
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben ser sacrificados para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 60 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES:** Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacene este producto por debajo de los 25°C.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Suspensión inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 50 y 100 ml
- **REGISTRO:** 3958 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 7. (TRISEPTIL) INVET



Laboratorio:



INVET S. A.

Autopista Medellin Km 2.5 Vía Bogotá Siberia entrada parcela Bod. I-138

Teléfono: +(571)8985140

Fax: +(57)3208498092

Mail: ventas@invetcolombia.com

Sitio web: www.invetcolombia.com

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: TRIMETOPRIM, SULFAMETAZINA SODICA

Especies:



Descripción:

TRISEPTIL-S.I. es un antiinfeccioso

Composición	Por ml
Trimetoprim	40 mg
Sulfametazina sódica	200 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Quimioterápico sintético
- **INDICACIONES:** Está indicado en el tratamiento de una amplia gama de enfermedades bacterianas. En Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Perros y Gatos. Infecciones respiratorias como neumonías, bronquitis e infecciones

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

bacterianas secundarias consecutivas a neumonía viral. Infecciones del aparato urogenital, tales como : cistitis, vaginitis, uretritis, nefritis y metritis. Infecciones del tracto digestivo como colibacilosis y salmonelosis. Otras infecciones como pododermatitis (sabañon), síndrome mastitis, metritis agalactia en cerdas, para postquirúrgicos, partos, septicemias y heridas contaminadas.

- **DOSIS:** TRISEPTIL-s.i., se usa a razón de 1 ml por cada 15 kg de peso al día, repetir por 3 a 5 días.
En la práctica use TRISEPTIL-s.i., así:
Equinos y Bovinos (240-525 kg) 16 a 35 ml
Terneros y Potros (120-240 kg) 8 a 16 ml
Ovinos y Cerdos (15- 90 kg) 1 a 6 ml
Perros (15- 30 kg) 1 a 2 ml

Vía de administración: inyección endovenosa, intramuscular o intraperitoneal.
(No usar esta última vía de aplicación en Equinos).

- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES:** Venta bajo fórmula del médico veterinario
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 20, 50 y 100 ml
- **REGISTRO:** 5942 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 8. (BUTAZINOL) VIRBAC



Laboratorio:



VIRBAC COLOMBIA LTDA

Carrera 54 76 20 Bogotá Colombia

Teléfono: (+571)2252100 018000122100

Mail: clientescolombia@virbac.com.mx

Sitio web: <http://www.virbac.co/contactenos>

Uso terapéutico: ANTIINFLAMATORIO

Principio Activo: FENILBUTAZONA, CINCOCAINA

Especies:



Descripción:

BUTAZINOL NF 20% es un antiinflamatorio, analgésico y antipirético

Composición	Contenido
Fenilbutazona sódica	200 mg
Clorhidrato de cincocaína	3 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Antiinflamatorio, analgésico, antipirético
- **INDICACIONES:** Tratamiento de condiciones traumáticas e inflamatorias de origen no infeccioso que afectan el sistema músculo esquelético. Su acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética lo hace el fármaco de elección en patologías como: artritis reumática, artrosis, artropatías metabólicas, bursitis, tendónitis, laminitis, miositis, sinovitis, tendosinovitis, espondilosis, tendomiositis, contusiones, distensiones, luxaciones y fracturas.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **DOSIS:** Equinos: 4.4 a 4.8 mg por kg de peso; en la práctica 9-10 mL por 400 kg
Caninos: 20 mg por kg de peso; en la práctica 1 mL por 10 kg
El tratamiento se realiza por 3 a 5 días, vía intramuscular profunda o intravenosa
lenta. La administración es diaria si se utiliza vía intramuscular, e interdiaria
cuando se utiliza la vía venosa.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplicar en animales destinados a consumo humano
- **CONTRAINDICACIONES:** No administrar en animales con insuficiencia cardiaca
congestiva, renal o hepática ni a hembras en el primer tercio de la gestación.
Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco ampolla x 50 mL.
- **REGISTRO:** 3478 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 9. (QUILAND IVERPAZ) VETERLAND



LABORATORIOS VETERLAND LTDA
NIT: 800.002.784-7

FICHA TECNICA (EQUILAND IverPraz)

IVERMECTINA + PRAZIQUANTEL



COMPOSICION:

Cada 100 mL de suspensión oral contienen:

Ivermectina.....1,2 g
Praziquantel.....15 g


Excipientes c.s.p.....100 mL

Formula estructural y molecular:

Praziquantel: (2-ciclohexylcarbonyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4,1)

C₁₉ H₂₄ N₂ O₂ - PM = 312,4

CAS: 55268.74.1



1, Praziquantel (PZQ)

Ivermectina:

ivermectina B1a (5-O-dimetil-22,23-dihidroavermectina A1a) e ivermectina B1b (5-O-demetil-25-de(1-metil-propil)-22,23-dihidro-25-(1-metiletil) avermectina A1a)

Carrera 19 B No.168-16 PBX: 6789851 FAX: 6789830 Bogotá, D.C. Colombia
produccion@laboratoriosveterland.com


ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2



LABORATORIOS VETERLAND LTDA
NIT: 800.002.784-7



QUIMICA:

Derivado semi-sintético de una avermectina del grupo macrólido lactona, producido por el "*Streptomyces avermitilis*". Durante el crecimiento del microorganismo, se genera un complejo de 8 componentes. La avermectina ha sido identificada como un grupo derivado de la lactona macrocíclica, que a diferencia de los antimicrobianos macrólidos carecen de actividad antibacteriana significativa.

Los cuatro componentes principales recuperados del proceso de fermentación, se identifican por el sub-índice "a", como Avermectinas A1a, A2a, B1a, B2a. Los cuatro componentes menores recuperados solo en cantidades muy pequeñas se identifican por el sub-índice "b", como A1b, A2b, B1b, B2b.

Cada uno de los 8 componentes posee actividad antiparasitaria, sin embargo, el componente B1a se recupera en mayores cantidades, por lo tanto, es el derivado químico 22,23-dihidro-B1b, los que han sido ensayados más extensamente como antiparasitarios. La combinación de estos dos componentes ha recibido en nombre genérico de IVERMECTINA, **Equiland Iverpraz**, contiene no menos del 80% de la fracción isomérica B1a y el resto de B1b.

Mezcla de componentes Ivermectina B1a (5-o-dimetil-22,23 - dihydroavermectina e Ivermectina B1b (5-o-dimetil-25-de 1-metilpropil) 22,23-dihidro-25-(1-metilpropil)-22,23-dihidro-25-(1-metiletil) avermectina A 1a.

Ivermectina B1a = C48 H74 O14

Ivermectina B1b = C47 H72 O14

DESCRIPCION:

La Ivermectina y el Praziquantel del **Equiland® Iverpraz** tiene la cualidad que solamente se requiere una pequeña cantidad vía oral para desarrollar su amplia actividad para el control de parásitos internos y externos en los Equinos.

FARMACODINAMIA (Mecanismo de Acción):

FARMACODINAMIA DEL PRODUCTO (RESUMEN)

Ivermectina: La zona de acción de la ivermectina se localiza a nivel de las terminaciones nerviosas propiamente dichas o en la zona de contacto entre una fibra nerviosa y una muscular en el parásito. La ivermectina estimula la liberación del ácido Gamma Aminobutírico (GABA), conduciendo a un bloqueo total de los receptores específicos localizados en las terminaciones nerviosas (actúa sobre canales de cloro neuronales). Como resultado de lo anterior se obtiene la hiperpolarización de la neurona, el bloqueo del impulso nervioso del parásito y en consecuencia su muerte por parálisis flácida.

La acción de la Ivermectina frente a los parásitos está relacionada con la inhibición de la motilidad. Incrementa aparentemente la liberación post -sináptica del ácido Gamma -aminobutírico (GABA) del sistema nervioso. La función normal del GABA es la inhibición de la transmisión nerviosa. El aumento de la liberación del GABA incrementa (hiperpolariza) el potencial normal en reposo de las células post-sinápticas, haciendo más

Carrera 19 B No.168-16 PBX: 6789851 FAX: 6789830 Bogotá, D.C. Colombia
produccion@laboratoriosveterland.com

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2



LABORATORIOS VETERLAND LTDA
NIT: 800.002.784-7

La ivermectina facilita la neurotransmisión de los estímulos a los músculos; por ello, las fibras musculares no se contraen. Bajo la influencia de la Avermectina, los parásitos se paralizan y son eliminados.

Esta liberación además, abre los canales de Cloro, por unirse al sitio específico glutamato. Cerca del 50 % del efecto endectocida, puede ser bloqueado por la picrotoxina, un antagonista del GABA en los canales de cloro. Esta circunstancia da fuerza al papel del GABA, en el mecanismo de acción de las avermectinas.

Praziquantel: El fármaco penetra en el parásito y provoca una alteración en el flujo de iones de calcio en sus células, generando una contracción muscular o parálisis espástica y disminuyendo la capacidad del verme para contraerse o relajarse. Así, es expelido por el organismo, pues ya no consigue fijarse en él. Además, este medicamento parece interferir con la absorción de la adenosina por los vermes en el medio de cultivo, de manera que son incapaces de sintetizar purinas para su supervivencia.

FARMACOCINETICA (Administración, Distribución, Metabolismo, Eliminación):

FARMACOCINÉTICA DEL PRODUCTO - BIODISPONIBILIDAD

Ivermectina: Las concentraciones plasmáticas de Ivermectina se alcanzan rápidamente cuando se administra por vía oral. El fármaco se distribuye en todo el organismo, logrando concentraciones eficaces en las diferentes zonas y en los líquidos corporales, y es el mayor residuo tisular en el hígado, grasa, músculo y riñón (fármaco inalterado). Los residuos tisulares más altos se registran en el tejido hepático, donde el metabolito predominante de la ivermectina es el 24-OH-H2B1a.

La ruta de mayor excreción del fármaco son las heces. Menos del 2% se excreta en la orina, y del total excretado, más del 60% se elimina durante los 3 primeros días post-tratamiento.

La ivermectina es extremadamente lipófila lo que le permite una alta absorción intestinal cuando se administra en gel. La unión a proteínas plasmáticas es alta.

La ivermectina obtiene concentración pico en 15 horas en caballos administrada vía oral. Su volumen de distribución a tejidos es alto con afinidad a la grasa y se concentra en el hígado y en la grasa para ser casi totalmente excretada en las heces (98%). Posee algunos metabolitos como la 24 hidroxil-metil-ivermectina y el 3-0-desmetil ivermectina, que son de menos cuantía. Únicamente el 2% de la dosis es excretada vía renal. El 5 % de la dosis puede ser excretada por la leche.

Su uso intravenoso en solución es fatal para equinos y vía IM y SC es muy doloroso

Praziquantel: El Praziquantel se absorbe rápida y casi totalmente del tracto Gastrointestinal, alcanza niveles plasmáticos en el perro entre 30 y 120 minutos y se distribuye a través de todos los órganos pasando a la bilis. Es metabolizado rápidamente a formas inactivas en el hígado y sólo se excretan cantidades muy bajas de la dosis no metabolizada en la orina y en heces 0,1 %; la totalidad de la droga se excreta en forma de metabolitos.

SEGURIDAD:

Ivermectina: Estudios de campo en YEGUAS gestantes y no gestantes han mostrado un amplio margen de seguridad de la ivermectina cuando se administra a las dosis recomendadas.

Carrera 19 B No.168-16 PBX: 6789851 FAX: 6789830 Bogotá, D.C. Colombia
produccion@laboratoriosveterland.com

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2



LABORATORIOS VETERLAND LTDA

NIT: 800.002.784-7

Salud y producción animal

Toxicidad Aguda y Crónica:

DL 50 Oral en Ratones 50 mg x kg.

DL 50 Oral en Monos 24 mg x kg.

No hay Toxicidad Crónica.

Con dosis de 12.000 mcg/kg de peso vivo vía oral (60 veces dosis terapéutica), vía IM, en caballos, desarrollan signos clínicos de toxicidad como depresión, ataxia, midriasis, relajación del labio inferior y depresión respiratoria. La administración de 2 mg/kg en pasta (10 veces la dosis terapéutica), produce en algunos animales depresión, ataxia y problemas de visión.

En algunos equinos produce edema subcutáneo relacionado con la muerte de microfilarias de *Onchocerca*.

Praziquantel: La clasificación toxicológica no aplica para este producto.

No se han reportado casos de toxicidad.

No se presentan efectos biológicos no deseados

No hay evidencia de efectos adversos conocidos.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:

INDICACIONES:

Equiland IverPraz está indicado en el tratamiento y control del parasitismo gastrointestinal, pulmonar y cutáneo de los equinos, ocasionados por:

Gastrointestinales: Formas adultas e inmaduras de los estróngilos *Cyathostomum sp.*, *Cylicostephanus sp.*, *Cylicodontophorus sp.*, *Cylicocyclus sp.*, *Gyallocephalus sp.*, *Parascaris equorum* (formas adultas y larvianas), *Trychostrongylus axei*, *Strongyloides westeri*, *Habronema muscae*, *Strongylus vulgaris* (forma arterial), *Strongylus edentatus*, *S. equinus*, *Tridontophorus sp.*, *Oxyuris equi* (formas adulta e inmadura) y *Gasterophilus sp.*, *Draschia sp.*

Pulmonar: *Dictyocaulus arnfieldi* (forma adulta e inmadura).

Cutáneos: Microfilarias de *Onchocerca sp.*, Larvas de *Habronema sp.*

Cestodos: *Anoplocephala magna*, *Anoplocephala perfoliata*, *Paranoplocephala mamillana*.

DOSIFICACION y ADMINISTRACION:

Dosis Básica: 200 mcg de Ivermectina por kg de peso vivo. En la práctica: 1 gramo de Equiland IverPraz por cada 60 kg de peso vía oral. El émbolo de la jeringa debe desplazarse hasta la cantidad seleccionada según el peso del animal.

Praziquantel 1 mg/Kg.- 2,5 mg/Kg

La Dosis de Equiland IverPraz es de 0,0167ml/ k.p.v. que equivalen a 200mcg de ivermectina y 2,5 mg de Praziquantel

Una jeringa alcanza para 600 kilos de peso

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consérvese en lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

Entierre o incinere los envases.

No contamine fuentes de agua con los residuos.

Carrera 19 B No.168-16 PBX: 6789851 FAX: 6789830 Bogotá, D.C. Colombia

produccion@laboratoriosveterland.com

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2



LABORATORIOS VETERLAND LTDA
NIT: 800.002.784-7

La ivermectina afecta en forma adversa a los peces y otros animales acuáticos. No se recomienda en otras especies que no sean las autorizadas.

Consérvese en temperatura, por debajo de 30°C, en lugar fresco, seco y protegidos de la luz.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.

No utilizar en yeguas productoras de leche destinada al consumo humano.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

Jeringa en Polipropileno por 10g color blanco con Tapón

Caja en cartulina Maule reverso café calibre 18 con Recubrimiento UV por 1 Jeringa.

Registro ICA No. 9577-MV

Mayor información a solicitud del Médico Veterinario.

Equiland® Iverpraz es marca registrada autorizada a Laboratorios Veterland Ltda. Fabricante. Directora Técnica: Rosa Acosta O. Q.F.U.N. PBX (57-1) 6789851 Cra. 19 B No. 168 -16 contacto@laboratoriosveterland.com Bogotá D.C. -Colombia.

BIBLIOGRAFIA:

-Farmacología veterinaria universidad de concepción Chile

-Camevet

-Manual Meck cuarta edición en español 1993

-Parasitipedia IVERMECTINA para uso veterinario en el ganado bovino, ovino, caprino, porcino, en aves y en perros y gatos. Última actualización el Lunes, 17 Marzo 2014 Escrito por P. Junquera

PERÍODO DE VIDA ÚTIL ESTIMADO: 36 MESES

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 10. (OVICID) PROVET



Laboratorio:



LABORATORIOS PROVET S. A.

Autopista Medellín Km 7 Cost. Occidental Parque Ind. CELTA

Teléfono: +(571)2259110

Fax: +(571)2299102

Mail: provet@laboratoriosprovet.com.co

Sitio web: www.laboratoriosprovet.com

Uso terapéutico: ENDECTOPARASITICIDA

Principio Activo: IVERMECTINA, PRAZIQUANTEL, FENBENDAZOL

Especies:



Descripción:

OVICID GEL es un antiparasitario de amplio espectro para equinos

Composición	Contenido
Ivermectina	0.6 g
Praziquantel	7.5 g
Fenbendazol	22.5 g
Excipientes csp	100 g

- **ACCIÓN:** Antiparasitario
- **INDICACIONES:** **OVICID GEL** es un endectocida de amplio espectro, a base de ivermectina, praziquantel y fenbendazol, siendo eficaz contra todos los estadios de los parásitos de los equinos, mulares, asnales de clase nemátoda, cestoda y artrópoda. Eficaz contra *Strongylus vulgaris*, *edentatus*, y equinus. *Triodontophorus*, *Oesophagodontus robustus* y *craterostomum acuticaudatum*. *Cylicocyclus*, *Coronocyclus*, *Oxyuris equi*, *Parascaris equorum*, *Trichostrongylus axei*, *Strongyloides westeri*, *Parafilaria multipapillosa*, *Draschia megastoma*, *Halicephalobus gingivalis*, *Anoplocephala magna*, *Anoplocephala perfoliata*, *Echinococcus granulosus*, *Gasterophilus* spp., *Rhinoestrus purpureus*.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **DOSIS:** La dosis recomendada por principio activo es: Ivermectina 200 mcg, Praziquantel 2.5 mg y Fenbendazol 7.5 mg por kilogramo de peso. **OVICID GEL** se debe suministrar a razón de 1 g por cada 30 kg de peso. Una jeringa de **OVICID GEL** permite tratar hasta 600 kilos de peso. Vía oral
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Manténgase fuera del alcance de los niños. Uso veterinario. Manténgase en un lugar seco y fresco, protegido de la luz.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Gel oral
- **PRESENTACIÓN:** Jeringa plástica por 20 g
- **REGISTRO:** 8905 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 11. (ANFLAGEC) SERVINSUMOS



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 g contiene:

Mentol	1 g
Alcanfor	5 g
Guayacol	3 g
Salicilato de metilo	10 g
Trementina	3 g
Excipientes c.s.p	100 g

INDICACIONES

Antiinflamatorio para uso externo. Coadyuvante en el tratamiento de inflamaciones a nivel de tendones, músculos, articulaciones y glándulas mamarias en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos.

DOSES

Previo limpieza del área afectada y utilizan-

do una cantidad apropiada de Anflagec, dar un buen masaje sobre las partes inflamadas y traumatizadas. Repetir el masaje 2 veces al día, por el tiempo que sea necesario.

ADMINISTRACIÓN

Para USO EXTERNO únicamente.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacenar a no menos de 15°C y no más de 30 °C en promedio, en lugar seco y protegido de la luz.

PRESENTACIONES

Pote por 500, 250 y 100 mL.

ESPECIES

Registro ICA N° 2952 DB

www.servinsumos.cc

@Laboratorios Servinsumos S.A.



ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 12. (FLUNIXINA) VECOL



Laboratorio:



EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS " VECOL "

Av. El Dorado 82 - 93 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)4254800

Fax: +(571)4254835

Mail: vecol@vecol.com.co

Sitio web: www.vecol.com.co

Uso terapéutico: ANTIINFLAMATORIO

Principio Activo: FLUNIXIN MEGLUMINA

Especies:



Descripción:

FLUNIXINA es un antiinflamatorio no esterooidal

Composición	Por cada ml
Flunixin meglumina	50 mg
Excipientes cs	1 mL

- ACCIÓN:** Analgésico, antiinflamatorio y antipirético, AINE

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **INDICACIONES:** Solución estéril para uso parenteral, que contiene Flunixin Meglumina. Analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Indicado en equinos para la inflamación y el dolor asociados con desórdenes músculo - esqueléticos y cólicos. En bovinos como antipirético y en porcinos como coadyuvante en el tratamiento de la inflamación, dolor y elevación de la temperatura, asociados con mastitis y metritis
- **DOSIS:** En bovinos y porcinos aplicar 2 ml por cada 45 kg de peso vivo. En equinos 1 ml por cada 45 kg de peso vivo. Vía intravenosa ó intramuscular una vez por día, máximo por 5 días.
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los bovinos no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento; los porcinos hasta 21 días después.
La leche producida durante el tratamiento y 48 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES:** Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable.
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 10 y 50 ml
- **REGISTRO:** 4003 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 13. (TUSIVET) PHARMAVET



Laboratorio:



PHARMAVET LTDA

Cr. 21 164 - 71 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)6721936

Fax: +(571)6721956

Mail: pharmavet@laboratoriospharmavet.com

Sitio web: www.laboratoriospharmavet.com

Uso terapéutico: BRNCOSECRETOLITICO/EXPECTORANTE

Principio Activo: DEXTROMETORFANO, GUAYACOLATO DE GLICERILO

Especies:



Descripción:

TUSIVET JARABE es un antitusivo y expectorante

Composición	Por cada 100 ml
Dextrometorfano	200 mg
Guayacolato de glicerilo	2 g

- **ACCIÓN:** Antitusivo y expectorante
- **INDICACIONES:** Indicado para perros y gatos en el tratamiento sintomático de toda clase de tos. Descongestionante de las vías respiratorias. Está indicado en el tratameinto de la tos de las perreras. Favorece la expulsión de flemas en tos húmeda.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **DOSIS:** Perros y gatos 0.5 a 1 ml/kg vía oral, 2 a 4 veces al día durante 5 días consecutivos o hasta la desaparición total de los síntomas. Puede suministrarse puro, directamente en la boca del animal o diluido en agua, leche o jugo de frutas preferiblemente después de las comidas.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica.
- **CONTRAINDICACIONES:** No administrar en animales en gestación o que le estén administrando algún tipo de sedante o tranquilizante. No administrar a pacientes diabéticos. Conservar en un lugar fresco, seco y lejos de la luz solar. Venta bajo fórmula del médico veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños
- **MODO DE APLICACIÓN:** Jarabe oral
- **PRESENTACIÓN:** Frasco plástico por 120 ml, caja por una docena
- **REGISTRO:** 4729 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 14. (ONE) BIO ZOO



ONE es un antiparasitario interno.

Especies: Caninos

Presentación: Sobre x 10 tabletas

- Descripción

Descripción del Producto

Uso terapéutico: ANTIHELMINTICO

Principio Activo:

- FENBENDAZOL: **BENZIMIDAZOL**
- PRAZIQUANTEL: **ISOQUINOLINA**
- TOLTRAZURIL: ANTIPROTOZOARIO, ANTICOCIDIANO

Descripción:

ONE DESPARASITANTE es un antiparasitario interno

Composición	Contenido
Fenbendazol	500 mg
Praziquantel	50 mg
Toltrazuril	150 mg

- **ACCIÓN:** Antiparasitario interno
- **INDICACIONES:** PERROParásitos (espectro de acción)

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- Tratamiento y control de **NEMATODOS** (Ancylostoma spp, Strongyloides stercoralis, Toxascaris leonina, toxocara canis, Trichinella spiralis, trichuris vulpis, uncinaria stenocephala y **CESTODOS** (Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Mesocestoides spp, Taenia spp, Spirometra mansonioides, Diphylobothrium latum, Joyeuxiella pasqualei).
- Tratamiento de infecciones con **Giardia** spp. y otros protozoarios
- **DOSIS:**
 - **1 tableta por cada 10 kg de p.v.** Equivale a 50 mg/kg de fenbendazol, 5 mg/kg de praziquantel y 15 mg/kg de toltrazuril. Una sola toma
 - **Contra nematodos y Giardia:** 1 tableta cada 24 horas durante 3 días

No administrar a cachorros de menos de 4 semanas

- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES:** Mantengase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Tabletas
- **PRESENTACIÓN:** Sobre por 10 tabletas
- **REGISTRO:** 5127 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 15. (ENDOGARD 30) VIRBAC



Composición:

Cada Tableta de 2700 mg contiene:

- Febantel 450 mg.
- Praziquantel 150 mg.
- Pamoato de pirantel 432 mg.
- Ivermectina 0.18 mg.
- Excipientes c.s.p. 1 tab

Indicaciones:

En caninos para el tratamiento de infestaciones parasitarias producidas por :

- **Nemátodos:** *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *A. braziliense*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Strongyloides stercoralis*, *Capillaria* sp., *Spirocera lupi*, *Dipetalonema reconditum*, *Dirofilaria immitis* (microfilarias), *Dirofilaria repens*, (microfilarias), *Oncicola canis*, *Physaloptera canis*.
- **Céstodos:** *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *E. vogeli*, *Spirometra* sp., *Taenia pisiformis*, *T. hydatigena*, *T. serialis*, *T. multiceps*, *Diphyllobothrium* sp., *Mesocostoides* sp.
- **Tremátodos:** *Schistosoma*.
- **Protozoarios:** *Giardia canis*.

Dosis y Vía de Administración:

Administrar una tableta por cada 30 Kg. de peso como dosis única.

Directamente por Vía oral o con el alimento.

Propiedades:

Endogard®, presenta espectro contra parásitos internos que incluyen nemátodos gastrointestinales y pulmonares, céstodos, tremátodos, rnicofilarias y *Giardia canis* en una sola dosis, además de tener forma de hueso con una formulación altamente palatable ya que tiene sabor a hígado facilitando la administración y la formulación en los caninos.

Endogard®, contiene **Febantel** que es un precursor de otros benzimidazoles, como son el fenbendazole y oxfendazole. El **Pirantel** es una tetrahidropirimidina que bloquea la neurotransmisión ganglionar por su acción colinérgica. El Praziquantel es una isoquinolona que inhibe los sistemas enzimáticos del metabolismo de los carbohidratos e inmoviliza al parásito. La **Ivermectina** es activa en el control de la *Dirofilaria immitis*, y es un macrólido derivado de la fermentación del *Streptomyces avermitilis*, que activa la entrada de los canales cloruro glutamato, los cuales hiperpolarizan la neurona del parásito y previene la iniciación o propagación de los potenciales normales de acción.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

No induce embriotoxicidad, teratogénesis, mutagénesis o carcinogénesis.

Presentación:

Caja por 2 tabletas. Perro Grande 30 Kg.

REG. ICA No. 6141 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 16. (FLATIVET) PROVET



Laboratorio:



LABORATORIOS PROVET S. A.

Cl. 67 69 A - 11 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)2259110

Fax: +(571)2299102

Mail: provet@laboratoriosprovet.com.co

Sitio web: www.laboratoriosprovet.com

Uso terapéutico: ANTIFLATULENTO

Principio Activo: DIMETIL POLIXILOXANO

Especies:



Descripción:

FLATIVET es un antiflatulento y antiespumante

Composición	Por cada 100 ml
Dimetil-polisiloxano USP	30 g
Exipientes	100 ml

- **ACCIÓN:** Antiflatulento, antiespumante
- **INDICACIONES:** FLATIVET está especialmente indicado en los procesos de timpanismo o meteorismo, principalmente debidos a la ingestión de forraje verde recalentado, muy tierno o fermentado.
Gracias a su acción lubricante, en caninos y felinos es útil para prevenir y tratar problemas de gases como flatulencia y timpanismo canino; de esta

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

forma previene la presentación de torsiones y vólvulos gástricos.

Favorece el vaciado del tracto gastrointestinal como preparación para una cirugía en cavidad abdominal.

En casos de obstrucción por impactación de la materia fecal en el intestino, favorece el tránsito intestinal (por lubricación y no por efecto laxante).

En gastroenteritis severas actúa como lubricante del lumen intestinal, disminuyendo la fricción y el desprendimiento de la mucosa, creando una película que a su vez disminuye la absorción de las enterotoxinas bacterianas. El dimetil-polisiloxano (Simeticona) reduce la tensión superficial de la burbuja gaseosa, permitiendo la expulsión de los gases gástricos e intestinales y la recuperación rápida del animal.

- **DOSIS:** Vía oral previa dilución en 250 mL de agua administrar:
Bovinos y equinos: 40 mL / 100 Kg de peso
Ovinos y caprinos: 20 mL / 50 Kg de peso
Caninos: 5-10 mL según tamaño, sin diluir
Se recomienda suministrar dos tomas diarias, pero en todos los casos, impera el criterio del Médico Veterinario.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No tiene debido a que el producto no se absorbe a nivel gastrointestinal.
- **CONTRAINDICACIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños
- **MODO DE APLICACIÓN:** Emulsión oral
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 120 ml
- **REGISTRO:** 2224 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 17. (PREDNISOLONA) HOLLIDAY SCOT



Antiinflamatorio glucocorticoide.

El corticoide de elección por vía oral

Composición:

Prednisolona base: 20 mg

Excipientes c. s. p.: 500 mg

Acción:

Antiinflamatorio Glucocorticoide sintético no fluorado con una potencia glucocorticoidea 4 veces mayor al Cortisol, pero con un efecto mineralocorticoide casi nulo.

Su duración de acción es intermedia, 12-36 horas.

Indicaciones

Procesos inflamatorios y alérgicos (prurito) en donde esté indicado el uso de Glucocorticoides. Enfermedades autoinmunes. Como coadyuvante en la terapéutica antineoplásica. Terapia de sustitución.

Dosificación

Perros y gatos:

Terapia de sustitución: 0.25 mg/kg/día. En estados de estrés, aumentar la dosis 2 a 5 veces.

Enfermedades autoinmunes y como coadyuvante de la terapéutica antineoplásica: 2 a 4 mg/kg/día.

En procesos inflamatorios: 0.5 a 1 mg/kg/día.

Para un tratamiento prolongado se debe realizar la terapia a días alternos. Este esquema evita la supresión del eje Hipotálamo-hipófiso-adrenal permitiendo la recuperación del mismo en los días que no se administra la Prednisolona.

Esquema terapéutico:

1) Dosis de inducción: 0.5 a 1 mg/kg/12 horas durante 5 a 7 días.

2) Continuar con 1 a 2 mg/kg una toma cada 48 horas durante 7 días.

3) La semana siguiente continuar con el mismo régimen de administración (cada 48 horas) y con una dosis 50% menor.

4) Reducir semanalmente la cantidad de Prednisolona (administrando siempre a días alternos) hasta llegar a la dosis mínima de mantenimiento con efecto terapéutico.

5) No interrumpir en forma súbita la administración sino gradualmente. Se sugiere que la administración de Prednisolona se realice respetando el ciclo circadiano de cada especie: Perros: diurno / Gatos: nocturno.

REGISTRO ICA 4448 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 18. (JABON ASUNTOL) BAYER



Laboratorio:



BAYER S.A.

Av. Américas 57 - 52 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)4142277

Fax: 4234070 EXT 4382

Sitio web: www.bayerandina.com

Uso terapéutico: ECTOPARASITICIDA

Principio Activo: COUMAPHOS

Especies:



Descripción:

ASUNTOL JABON es un antiparasitario externo

Composición	Contenido
Coumaphos	1 g
Exipientes csp	100 g

- **ACCIÓN:** Antiparasitario externo
- **INDICACIONES:** Está indicado para la limpieza, tratamiento y protección del perro contra pulgas (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), piojos (*Trichodectes canis*, *Linognathus setosus*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*). Jabón ectoparasitico (uso tópico) para el tratamiento, limpieza y protección del perro. El efecto ectoparasitico de Asuntol Jabón se manifiesta rápidamente, y los aceites esenciales contenidos en su formulación confieren brillo y olor agradable al pelaje de sus animales. El Asuntol Jabón es perfectamente tolerado y es un valioso auxiliar en el

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

tratamiento de la sarna superficial y otros ectoparásitos de los perros. Su efecto residual permanece por varios días, sin embargo, en casos de reinfestaciones puede repetirse el tratamiento tan seguido como sea necesario. Asuntol Jabón no es arrastrado por el agua de lluvia, una vez seco el animal.

- **DOSIS:** Inicialmente se debe mojar bien al perro, enjabonarlo hasta obtener abundante espuma. Dejar actuar por 5 minutos, luego enjuagar con bastante agua y repetir la operación.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES:** Lea la etiqueta antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar en Gatos. Antídoto: Sulfato de atropina al 1%. Dosis de atropina para humanos: 0,2 ml (2 mg) cada hora hasta la desaparición de los síntomas. Vía intramuscular.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Jabón de uso externo
- **PRESENTACIÓN:** Jabón por 100 g

- **REGISTRO:** 6303 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 19. (CIPERMETRINA) AGROZ



Laboratorio:



AGROQUIMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA S.A. AGROZ S.A.

Km 1 Vía Espinal Ibagué Colombia

Teléfono: +(82)485584

Fax: +(82)483930

Mail: info@agroz.com.co

Sitio web: www.agroz.com.co

Uso terapéutico: ECTOPARASITICIDA

Principio Activo: CIPERMETRINA

Especies:



Descripción:

CIPERMETRINA 15% EC AGROZ es un baño insecticida

Composición	Contenido
Cipermetrina	150 g
Excipientes csp	1.000 ml

- **ACCIÓN:** Garrapaticida

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **INDICACIONES:** Mosquicida y garrapaticida, indicado en baños por aspersión e inmersión, efectivo en el control de la mosca de los cuernos y la mosca brava.
- **DOSIS:** Baño externo por medio de bomba de espalda, fumigadora de motor o por inmersión del animal de acuerdo a la siguiente dosificación. En aspersión por bomba de 20 L use 20 ml. En aspersión Manga use 1 L por 1000 L de agua. En inmersión en Tanque use 1 L en 1000 L de agua. Recarga de Tanque use 1.5 L en 1000 L de agua. Agitar la mezcla antes de aplicar el producto, rocíe el animal (BOVINOS), bañándolo completamente a baja presión. Una bomba de 20 litros de dilución, alcanza para 5 animales de 400 kg.
Se puede utilizar cualquier equipo de aspersión, asegurándose que este totalmente limpio. Llene la aspersora con el volumen requerido de agua limpia, agregar la dosis de **CIPERMETRINA E.C.15% AGROZ**, agite antes de aplicar. Si hay demora en aplicar, es necesario volver a agitar. Utilizar baja presión y aplique hasta que haya escurrimiento de la solución de insecticida.
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados con el producto no deben ser sacrificados para el consumo humano dentro de las 48 horas siguientes al tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No use el producto en animales diferentes a los bovinos. No trate animales menores a tres meses.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Concentrado emulsionable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 20 ml, 100, 500 y 1.000 ml
- **REGISTRO:** 6238 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 20. (CURAGAN) NOVARTIS

VOLVER CONTENIDO

NOVARTIS

Curagan[®]NL

LARVICIDA ANTISÉPTICO
AEROSOL TÓPICO

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contienen:

Cipermetrina High Cis	1.25 g
Piperonil butóxido	1 g
Violeta de metilo	0.5 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

DESCRIPCIÓN

Larvicida, antiséptico con base en cipermetrina y violeta de metilo con propelente que no daña la capa de ozono.

INDICACIONES

Larvicida y antiséptico para gusaneras (miasis) y heridas, afecciones locales en general como son las lesiones podales y de los pezones, úlceras, abscesos, escoriaciones de la piel y heridas en general.

USOS

- Por su acción larvicida, ayuda a la desinfección y cicatrización de las heridas y controla de manera eficaz las gusaneras o miasis.
- Asepsias en cirugías: castraciones, cesáreas, cortes de cola.
- Heridas, infecciones microbianas, de pezuñas, pezones, onfalorribitis.
- Infecciones bacterianas secundarias en lesiones de fiebre aftosa y estomatitis vesicular, sabañón, pododermatitis.
- Escoriaciones y úlceras de la piel, mataduras.
- Uso en bovinos, equinos, porcinos, caninos, caprinos y ovinos.



MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Dirija la válvula hacia el sitio afectado, a unos 20 cm de distancia y presiónela rociando el producto hasta cubrir totalmente el área de piel o mucosa afectada.

PRECAUCIONES

No almacenar este producto junto con alimentos. Evitar el contacto con los ojos. No perforar ni arrojar al fuego el envase vacío. Manténgase en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

Envase metálico, aerosol por 375 mL.

Clasificación Toxicológica III (Medianamente Tóxico)

• Reg. ICA No. 6.372-MV

• Manténgase fuera del alcance de los niños • Consulte al Médico Veterinario

15

VOLVER CONTENIDO

REGISTRO ICA 6372 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 21. (ROTEDON) COMPAÑÍA CALIFORNIA



Laboratorio:



COMPANIA CALIFORNIA S.A.

CL 17 34 64 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)7447878

Fax: +(571)7447889

Uso terapéutico: ECTOPARASITICIDA

Principio Activo: ETHION

Especies:



Descripción:

ROTEDON EC es un piojicida, mosquicida y garrapaticida

Composición	Contenido
Ethion	83 g
Excipientes csp	100 ml

- **ACCIÓN:** Ectoparasitica
- **INDICACIONES:** En bovinos, Rotedon EC es un rotador por excelencia en programas de uso insidioso de piretroides, diamidinas y otros plaguicidas. Para el control de garrapatas *Boophilus microplus* y *Amblyomma cajennense*, piojos; *Damalinia* sp, *Haematopinus* sp y moscas; *Haematobia irritans*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca* sp. En ovinos, equinos, caprinos, porcinos, en control de moscas, garrapatas y ácaros de la sarna. Puede usarse en la

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

fumigación de instalaciones pecuarias e inmunización de madera disuelto en kerosene (Diesel).

Rotodon EC es un ectoparasitocida en solución concentrada emulsificable a base de Ethión, plaguicida de la familia de los organofosforados, para uso por aspersión e inmersión en animales de granja. Al ser aplicado por aspersión, inmersión o con adherente sobre los animales domésticos, actúa sobre las plagas y se fija a la grasa subcutánea ejerciendo su efecto residual por 17 a 30 días, para ser eliminado lentamente por la piel principalmente y en pocas cantidades a través de pulmón y orina en forma de metabolitos Ethion monooxon o Ethion dioxon.

- **DOSIS:** Dilucion: 1:1300 que equivale a 638.5 ppm (mg/litro agua). En la práctica: 1 mL de Rotodon EC por cada 1300 mL de agua (pH: neutro a alcalino). Tanques de inmersión; carga inicial, mezcla 1 litro de Rotodon EC por cada 1.300 litros de agua. Recarga: 1 litro de Rotodon EC por cada 1.300 litros de agua. Mangas de aspersión y bombas de agua: para la carga inicial y la recarga, procédase como está indicado anteriormente. Generalmente cuando se usan bombas de mano, un animal requiere entre 4 y 5 litros de dilución. Preparación: mezcle la cantidad de Rotodon EC requerida con igual o doble cantidad de agua. Agite bien y agregue esta dilución a la cantidad total de agua agitando hasta homogenización uniforme.

FRECUENCIA DE BAÑOS: En caso de *Boophilus microplus* (garrapata de un solo huésped), bañar cada 21 días. En infestaciones graves bañar cada 10 días, hasta obtener un buen control. Después continuar bañando cada 21 días. En caso de *Amblyomma cajennense* (garrapata de tres huéspedes), bañar cada 7 días. **USO EN RASCADEROS:** Mezclar 9 litros acpm (kerosene o diesel), 9 litros aceite quemado de motor, 1 litro de Rotodon EC, colocarlo en el tanque del rascadera para que impregne por goteo el rascadero.

- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse para consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No usar en animales menores de 100 kg y hembras gestantes. No usar en felinos ni congeneres. No usar en animales de sangre fría. Puede usarse con otros plaguicidas como piretroides, derivados Fenilpirazoles. Las aguas duras y alcalinas pueden afectar su estabilidad y potencia. No mezclar con otros inhibidores de la Acetilcolinesterasa o usar simultáneamente con Imidocarb, Dietilcarmabazina, ya que se aumenta su toxicidad. Es compatible con adyuvantes neutros con adherentes tipo surfactantes y tensoactivos a base de alcoholes polivinilos con silicona.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución emulsificable concentrada
- **PRESENTACIÓN:** Frasco COEX por 250 y 1000 mL.
- **REGISTRO:** 7498 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 22. (AMITRAZ) AGROZ



Laboratorio:



AGROQUIMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA S.A. AGROZ S.A.

Km 1 Vía Espinal Ibagué Colombia

Teléfono: +(82)485584

Fax: +(82)483930

Mail: info@agroz.com.co

Sitio web: www.agroz.com.co

Uso terapéutico: ECTOPARASITICIDA

Principio Activo: AMITRAZ

Especies:



Descripción:

AMITRAZ 12.5% EC AGROZ es un baño insecticida

Composición	Contenido
Amitraz	125 g
Aditivos csp	1.000 ml

- **ACCIÓN:** Garrapaticida
- **INDICACIONES:** Garrapaticida específico en el control de garrapatas del ganado Bovino (*Boophilus microplus* y *Amblyomma cajenense*), indicado para uso por aspersión.
- **DOSIS:** Diluya 1000 ml (1 litro) en 600 litros de Agua. Rocíe el animal bañándolo completamente por aspersión (BOVINOS). Para el control de *Boophilus microplus* bañar cada 21 días. Para el control de *Amblyomma*

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

cajennense bañar cada 7 días. Aproximadamente con 4 Litros de la mezcla es suficiente para bañar un animal adulto.

- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados con el producto no deben ser sacrificados para el consumo humano dentro de 14 días siguientes al tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECUACIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No use el producto en animales diferentes a los bovinos. No trate animales menores a tres meses.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Concentrado emulsionable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 33 ml, 100, 500 y 1.000 ml
- **REGISTRO:** 6235 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 23 (IMAVEROL) ELANCO



Laboratorio:



ELI LILLY INTERAMERICANA INC. ELANCO

Transversal 18 No. 96-41 Piso 6 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)6024200

Fax: +(571)6024259

Sitio web: www.lillycolombia.com

Uso terapéutico: ANTIMICOTICO

Principio Activo: ENILCONAZOL

Especies:



Descripción:

IMAVEROL es un antimicótico de amplio espectro

Composición	Contenido
Enilconazol	100 mg
Exipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Antimicótico
- **INDICACIONES:** Antimicótico de amplio espectro para uso en bovinos, equinos y caninos. Solución para aspersión y baño externo. Indicado para la dermatomicosis en bovinos, equinos y caninos; producida por los hongos: Trichophyton verrucosum, T. mentagrophytes, T. equinum, Microsporum canis y Microsporum gypseum.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **DOSIS:** Diluir una parte de la solución en 50 partes (20 mL: 1.000 mL) de agua tibia y aplicar externamente a bovinos, equinos y caninos 3 a 4 veces a intervalos de 3 a 4 días.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No se absorbe a través de la piel y por lo tanto no deja residuos en la carne y leche de los bovinos tratados. No es corrosivo.
- **CONTRAINDICACIONES:** El éxito de este medicamento depende de la exactitud del diagnóstico. Manténgase fuera del alcance de los niños. Uso veterinario.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución externa
- **PRESENTACIÓN:** Frascos por 100 mL.
- **REGISTRO:** 2080 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 24. (LACTATO DE RINGER) CORPAUL



Correo Remoto Acceso Proveedores Acceso Interno Registro hojas de vida

Inicio Corporativa Unidades de negocio La tienda Promocionales Contáctenos



Portafolio de productos

Uso veterinario



SOLUCION HARTMANN EN AGUA DESTILADA X 500 ml

Nombre Genérico: LACTATO DE RINGER (HARTMANN).

Nombre Comercial: SOLUCION HARTMANN.

Composición: Cada 100 mL contienen Sodio Cloruro 0.600 g, Potasio Cloruro 0.030 g, Calcio Cloruro 0.020 g, Sodio Lactato 0.310 g, mosm por litro 274, Agua Grado Inyectable USP csp. 100 mL.

Forma Farmacéutica: Solución Intravenosa.

Presentación: Bolsa de Polietileno de baja densidad atóxico por 500 mL.

Empaque: Caja por 24 y 16 bolsas.

Vía de administración: Intravenosa e irrigaciones.

Indicaciones: Aporte Hidroelectrolítico en estados de deshidratación isotónica y acidosis moderada por vómito, diarrea, fístulas, exudados, traumatismos, quemaduras, estado de Shock y cirugías.

Contraindicaciones: No usar en casos de alcalosis, ni diluirlo con Calcio o agentes quelantes.

Posología: Según criterio médico Veterinario.

Condiciones de Almacenamiento: Almacenar a temperatura no mayor de 30°C. No almacenar, ni transportar con sustancias que liberen gases o vapores.

Registro Sanitario ICA: 2139-DB

Laboratorio Productor: CORPAUL.

Tiempo de vida útil: 3 años a partir de la fecha de fabricación.

Leyenda: Manténgase fuera del alcance de los niños. Uso veterinario.

Venta: Bajo fórmula médica veterinaria.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 25. (ZOO-VIT) LAB. ZOO

Zoo-Vit® N.F.

Solución inyectable

Energizante vitaminizado

Registro ICA 303-DB

COMPOSICIÓN:

Cada 500 mL contienen:

Riboflavina 5 fosfato (vitamina B ₂)	15 mg
Piridoxina clorhidrato (vitamina B ₆)	50 mg
Cianocobalamina (vitamina B ₁₂)	150 mcg
Niacinamida	150 mg
Dextrosa	50 g



DOSIS:

Equinos y bovinos: 1.000 - 2.000 mL (2 - 4 frascos por 500 mL de **Zoo-Vit N.F.**), diariamente durante 2 días seguidos, como mínimo, según la prescripción del Médico Veterinario.

ADMINISTRACIÓN:

Intravenosa.

Consulte al Médico Veterinario

PRESENTACIÓN: Frasco por 500 mL y Caja x 6 Frascos plásticos x 500 mL.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 26. (LACTATO DE RINGER) CORPAUL



COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de RINGER LACTATO Erma® solución inyectable contiene:

Cloruro	de	Sodio	0,600	g
Cloruro	de	Potasio	0,040	g
Cloruro	de	Calcio 2H ₂ O	0,027	g
Lactato	de	Sodio	0,320	g

Agua para preparaciones inyectables c.s.p. 100 mL

USOS:

En todo tipo de deshidratación.
Shock Hipovolémico
Diarreas
Intoxicaciones
Estados post-operatorios
Acidosis metabólica de intensidad leve (a excepción de acidosis láctica)

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

VIA DE ADMINISTRACION Y DOSIS:

Infusión

Intravenosa.

Administrar 15mL/Kg/hora (5-75 mL/Kg/hora) dependiendo del grado de deshidratación y la condición clínica. En caso de shock, puede ser necesaria una velocidad de infusión de 90 mL/Kg/hora. En todos los casos debe prevalecer el juicio profesional.

En animales jóvenes se utilizan dosis menores proporcionales al volumen circulatorio.

PRESENTACIONES:

Caja con 30 Bolsas por 500 mL.
Caja con 12 Bolsas por 1.500 mL.

USO EN:



Reg. ICA No. 8928 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 27. (GASA HOSPITALARIA) SUPERTEX



[Inicio](#) | [Quiénes Somos](#) | [Servicio al Cliente](#) | [Contacto](#) | [Inglés](#)

Supertex
División médica

- Nuestros Clientes
- Políticas de Calidad
- Registros Sanitarios
- Productos



GASA

Tipo VII, para uso Hospitalario

Usos:

Se usa como apósito para cubrir heridas extensas como quemaduras.

Absorción de exudados u otros líquidos de drenaje.

Para impedir la contaminación potencial de la herida.

Gasa Absorbente

Algunas de las presentaciones son:

Gasa Hospitalaria 1 x 100 yds Tejido (17x 8) Cod.000000900

Gasa Hospitalaria 1 x 100 yds Tejido (17x10) COD 000000089

Gasa Hospitalaria 1 x 100 yds Tejido (20x12)

Gasa Hospitalaria 1 x 25 yds

Gasa Cortada Papel grado médico y Estéril.

[Atrás](#)

Cra 45 No. 32-47 Medellín - Colombia / South America | PBX: (574) 262 11 20 - [Contactos](#).
Administrador - Creado por: [Amired Ltda](#)

Supertex

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2



[Inicio](#) | [Quiénes Somos](#) | [Servicio al Cliente](#) | [Contacto](#) | [Inglés](#)

Supertex®
División médica

• Nuestros Clientes

• Políticas de Calidad

• Registros Sanitarios

• Productos

Registros Sanitarios

REGISTROS INVIMA		
SUPERTEX		
Revisión 2011		
Producto	Número Registro Sanitario	Vigencia (año)
GASA HOSPITALARIA EN ROLLO	INVIMA 2010DM-0006381	2020
GASA BOTIQUÍN (1X1, 1X1/2, 1/2X1/2, 5X1/2, GANCHERA)	INVIMA 2010DM-0006381	2020
COMPRESA QUIRÚRGICA	INVIMA 2010DM-0006381	2020
ESPONJA DE GASA	INVIMA 2010DM-0006381	2020
VENDA DE GASA	INVIMA 2010DM-0006381	2020
APÓSITO	INVIMA 2008 DM-0001533	2018
VENDA ELÁSTICA	INVIMA 2007 DM-0000598	2017
VENDA SEMIELÁSTICA	INVIMA 2008 DM-0001534	2018
VENDA FIJA	INVIMA 2011 DM-0007260	2021
VENDA DE ALGODÓN	INVIMA 2008 DM-0001847-R2	2018
ESPÉCULO, SUPERKIT Y KIT	INVIMA 2004V-0002564	2014
CITOCEPILLO	INVIMA 2005V-0003219	2015

OBSERVACIÓN : Nuestros registros amparan tanto las presentaciones estériles como las no estériles.

Cra 45 No. 32-47 Medellín - Colombia / South America | PBX: (574) 262 11 20 - [Contactos](#).

Administrador - Creado por: [Amired Ltda](#)

Supertex®

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 28. (JERINGAS DESECHABLES 3 ML) RYMCO



RYMCO S.A.
P.B.X. 3559632
FAX: (53) 3559694
AA: 2130
E-mail: ventas@rymco.com.co
SAPPAZQUELLA - COLOMBIA

ETRYM 001 - 14

FICHA TECNICA

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

JERINGAS HIPODERMICAS DE 3 ml DE DOS PARTES, CON AGUJA, ESTERILES PARA USAR UNA SOLA VEZ: Dispositivo medico utilizado para extraer y suministrar sustancias o fluidos al organismo.

2. PRESENTACION COMERCIAL

Empaque integro unitario el cual permite y conserva la esterilidad del producto.

3. FABRICANTE

RYMCO S.A.

4. COMPONENTES Y MATERIALES

Fabricados con materiales atóxicos, según procedimientos descritos en la Norma ISO 10993 Evaluación Biológica de los Dispositivos Médicos y la U.S.P. XXXII

4.1 Cilindro: Fabricado en polipropileno traslúcido, grado médico, en conformidad con la norma FDA, CFR 21, numeral 177.1520 (a) (3) (i) (c.1) y (c) (3.1a) el diseño de la pieza, tiene las siguientes características.

4.1.1 Cono de Acoplamiento: Tipo Luer Slip o Lock concéntrico, su función es acoplar a los conos hembra tipo Luer.

4.1.2 Cuerpo del Cilindro: Cumple con las tolerancias dimensionales, especificadas en la Norma Técnica Colombiana n° 1988.

4.1.3 Alas de Sujeción: Lo cual permite que la jeringa no se deslice en una superficie inclinada (10°) y de fácil manejo para su manipulación.

4.2 Embolo: Fabricado en polietileno de alta densidad o polipropileno grado médico, en conformidad con la norma FDA, CFR 21, numeral 177.1520 (c) 3.1 (a) + 3.2 (a), su función es permitir la succión y desalojo de sustancias al organismo, su diseño tiene las siguientes características.

4.2.1 Pistón: Fabricado de material plástico. Este componente asegura la hermeticidad y suavidad al deslizarse dentro del cilindro.

El embolo junto con el pistón cumple con el requisito de longitud, según especificación de la Norma Técnica Colombiana N° 1988.

4.2.2 Disco de Empuje: Diseño que facilita la punción del producto.

4.3 Escala Volumétrica: impresa en cada jeringa con tinta de color óptico para facilitar su lectura, su función es permitir la dosificación exacta de las soluciones a administrar.



RYMCO S.A.
P.B.X. 3559632
FAX: (53) 3559694
AA: 2130
E-mail: ventas@rymco.com.co
SAPPAZQUELLA - COLOMBIA

ETRYM 001 - 14

5. EMPAQUE: Las jeringas RYMCO se empaquen individualmente con sus respectivas agujas en empaque "BLISTER PEEL PACK", el cual se compone de dos partes:

5.1 Papel Microporoso: Papel grado médico, resistente, elaborado a base de fibras vegetales, con alto control de la microporosidad, el cual permite la esterilización con gas ETO y constituye una barrera a bacterias y/o microorganismos contaminantes.

5.2 Película Plástica: Película transparente, de alta resistencia fabricada con base en un laminado de Poliamida + Polietileno ó Poliamida + Polipropileno + Polietileno.

Se une al papel microporoso, obteniéndose un sellado integro y confiable, manteniendo una apertura del empaque individual suave y libre de fibras.

5.3 Impresión: El empaque lleva claramente impreso la referencia del producto, el número de lote de fabricación y la fecha de expiración del producto.

5.4 Lengüetas: Comodidad con el diseño del empaque que facilita su apertura en forma aséptica (Peel Opening), libre de fibras.

PRESENTACION CAJA X 80 UNIDADES

REGISTRO INVIMA 2013DM-000438-R2

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 29. (JERINGAS DESECHABLES 5 ML) RYMCO



ETRYM 001 - 18

FICHA TECNICA

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

JERINGAS HIPODERMICAS DE 5 ml DE DOS PARTES, CON AGUJA, ESTERILES PARA USAR UNA SOLA VEZ: Dispositivo medico utilizado para extraer y suministrar sustancias o fluidos al organismo.

2. PRESENTACION COMERCIAL

Empaque integro unitario el cual permite y conserva la esterilidad del producto.

3. FABRICANTE

RYMCO S.A.

4. COMPONENTES Y MATERIALES

Fabricados con materiales atóxicos, según procedimientos descritos en la Norma ISO 1993 Evaluación Biológica de los Dispositivos Médicos y la U.S.P. XXXII

4.1 Cilindro: Fabricado en polipropileno traslúcido, grado médico, en conformidad con la norma FDA, CFR 21, numeral 177.1520 (a) (3) (i) (c.1) y (c) (3.1a) el diseño de la pieza, tiene las siguientes características.

4.1.1 Cono de Acoplamiento: Tipo Luer Slip o Lock concéntrico, su función es acoplar a los conos hembra tipo Luer.

4.1.2 Cuerpo del Cilindro: Cumple con las tolerancias dimensionales, especificadas en la Norma Técnica Colombiana n° 1988.

4.1.3 Alas de Sujeción: Lo cual permite que la jeringa no se deslice en una superficie inclinada (10°) y de fácil manejo para su manipulación.

4.2 Embolo: Fabricado en polietileno de alta densidad o polipropileno grado médico, en conformidad con la norma FDA, CFR 21, numeral 177.1520 (c) 3.1 (a) + 3.2 (a), su función es permitir la succión y desalojo de sustancias al organismo, su diseño tiene las siguientes características.

4.2.1 Pistón: Fabricado de material plástico. Este componente asegura la hermeticidad y suavidad al deslizarse dentro del cilindro. El embolo junto con el pistón cumple con el requisito de longitud, según especificación de la Norma Técnica Colombiana N° 1988.

4.2.2 Disco de Empuje: Diseño que facilita la punción del producto.

4.3 Escala Volumétrica: Impresa en cada jeringa con tinta de color óptico para facilitar su lectura, su función es permitir la dosificación exacta de las soluciones a administrar.



ETRYM 001 - 18

5. EMPAQUE: Las jeringas RYMCO se empacan individualmente con sus respectivas agujas en empaque "BLISTER PEEL PACK", el cual se compone de dos partes:

5.1 Papel Microporoso: Papel grado médico, resistente, elaborado a base de fibras vegetales, con alto control de la microporosidad, el cual permite la esterilización con gas ETO y constituye una barrera a bacterias y/o microorganismos contaminantes.

5.2 Película Plástica: Película transparente, de alta resistencia fabricada con base en un laminado de Poliamida + Polietileno ó Poliamida + Polipropileno + Polietileno.

Se une al papel microporoso, obteniéndose un sellado integro y confiable, manteniendo una apertura del empaque individual suave y libre de fibras.

5.3 Impresión: El empaque lleva claramente impreso la referencia del producto, el número de lote de fabricación y la fecha de expiración del producto.

5.4 Lengüetas: Comodidad con el diseño del empaque que facilita su apertura en forma aséptica (Peel Opening), libre de fibras.

PRESENTACION CAJA X 80 UNIDADES

REGISTRO INVIMA 2013DM-000438-R2

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 30. (JERINGAS DESECHABLES 10 ML) RYMCO



RYMCO S.A.
P.B.X. 3559632
FAX: (53) 3559894
AA: 3130
E-mail: rymco@rymco.com.co
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ETRYM 001 - 22

FICHA TECNICA

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
JERINGAS HIPODERMICAS DE 10 ml DE DOS PARTES, CON AGUJA, ESTERILES PARA USAR UNA SOLA VEZ: Dispositivo medico utilizado para extraer y suministrar sustancias o fluidos al organismo.

2. PRESENTACION COMERCIAL
Empaque integro unitario el cual permite y conserva la esterilidad del producto.

3. FABRICANTE
RYMCO S.A.

4. COMPONENTES Y MATERIALES
Fabricados con materiales atóxicos, según procedimientos descritos en la Norma ISO 10993 Evaluación Biológica de los Dispositivos Médicos y la U.S.P. XXXII

4.1 Cilindro: Fabricado en polipropileno traslucido, grado médico, en conformidad con la norma FDA, CFR 21, numeral 177.1520 (a) (3) (i) (c.1) y (c) (3.1a) el diseño de la pieza, tiene las siguientes características.

4.1.1 Cono de Acoplamiento: Tipo Luer Slip o Lock concéntrico, su función es acoplar a los conos hembra tipo Luer.

4.1.2 Cuerpo del Cilindro: Cumple con las tolerancias dimensionales, especificadas en la Norma Técnica Colombiana n° 1988.

4.1.3 Alas de Sujeción: Lo cual permite que la jeringa no se deslice en una superficie inclinada (10°) y de fácil manejo para su manipulación.

4.2 Embolo: Fabricado en polietileno de alta densidad o polipropileno grado médico, en conformidad con la norma FDA, CFR 21, numeral 177.1520 (c) 3.1 (a) + 3.2 (a), su función es permitir la succión y desalojo de sustancias al organismo, su diseño tiene las siguientes características.

4.2.1 Pistón: Fabricado de material plástico. Este componente asegura la hermeticidad y suavidad al deslizarse dentro del cilindro. El embolo junto con el pistón cumple con el requisito de longitud, según especificación de la Norma Técnica Colombiana N° 1988.

4.2.2 Disco de Empuje: Diseño que facilita la punción del producto.

4.3 Escala Volumétrica: Impresa en cada jeringa con tinta de color óptico para facilitar su lectura, su función es permitir la dosificación exacta de las soluciones a administrar.



RYMCO S.A.
P.B.X. 3559632
FAX: (53) 3559894
AA: 3130
E-mail: rymco@rymco.com.co
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ETRYM 001 - 22

5. EMPAQUE: Las jeringas RYMCO se empaquen individualmente con sus respectivas agujas en empaque "BLISTER PEEL PACK", el cual se compone de dos partes:

5.1 Papel Microporoso: Papel grado médico, resistente, elaborado a base de fibras vegetales, con alto control de la microporosidad, el cual permite la esterilización con gas ETO y constituye una barrera a bacterias y/o microorganismos contaminantes.

5.2 Película Plástica: Película transparente, de alta resistencia fabricada con base en un laminado de Poliamida + Polietileno ó Poliamida + Polipropileno + Polietileno.

Se une al papel microporoso, obteniéndose un sellado integro y confiable, manteniendo una apertura del empaque individual suave y libre de fibras.

5.3 Impresión: El empaque lleva claramente impreso la referencia del producto, el número de lote de fabricación y la fecha de expiración del producto.

5.4 Lengüetas: Comodidad con el diseño del empaque que facilita su apertura en forma aséptica (Peel Opening), libre de fibras.

PRESENTACION CAJA X 80 UNIDADES

REGISTRO INVIMA 2013DM-000438-R2

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 31. (JERINGAS DESECHABLES 20 ML) RYMCO



RYMCO S.A.
P.B.X. 3559632
FAX: (53) 3559694
AA: 3130
E-mail: rymco@rymco.com.co
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ETRYM 001 - 26

FICHA TECNICA

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

JERINGAS HIPODERMICAS DE 20 ml DE DOS PARTES, CON AGUJA, ESTERILES PARA USAR UNA SOLA VEZ: Dispositivo medico utilizado para extraer y suministrar sustancias o fluidos al organismo.

2. PRESENTACION COMERCIAL

Empaque integro unitario el cual permite y conserva la esterilidad del producto.

3. FABRICANTE

RYMCO S.A.

4. COMPONENTES Y MATERIALES

Fabricados con materiales atóxicos, según procedimientos descritos en la Norma ISO 10993 Evaluación Biológica de los Dispositivos Médicos y la U.S.P. XXXII

4.1 Cilindro: Fabricado en polipropileno traslúcido, grado médico, en conformidad con la norma FDA, CFR 21, numeral 177.1520 (a) (3) (i) (c.1) y (c) (3.1a) el diseño de la pieza, tiene las siguientes características.

4.1.1 Cono de Acoplamiento: Tipo Luer Slip o Lock el cual puede ser excéntrico ó concéntrico, su función es acoplar a los conos hembra tipo Luer.

4.1.2 Cuerpo del Cilindro: Cumple con las tolerancias dimensionales, especificadas en la Norma Técnica Colombiana n° 1988.

4.1.3 Alas de Sujeción: Lo cual permite que la jeringa no se deslice en una superficie inclinada (10°) y de fácil manejo para su manipulación.

4.2 Embolo: Fabricado en polietileno de alta densidad o polipropileno grado médico, en conformidad con la norma FDA, CFR 21, numeral 177.1520 (c) 3.1 (a) + 3.2 (a), su función es permitir la succión y desalojo de sustancias al organismo, su diseño tiene las siguientes características.

4.2.1 Pistón: Fabricado de material plástico. Este componente asegura la hermeticidad y suavidad al deslizarse dentro del cilindro. El embolo junto con el pistón cumple con el requisito de longitud, según especificación de la Norma Técnica Colombiana N° 1988.

4.2.2 Disco de Empuje: Diseño que facilita la punción del producto.

4.3 Escala Volumétrica: Impresa en cada jeringa con tinta de color óptico para facilitar su lectura, su función es permitir la dosificación exacta de las soluciones a administrar.



RYMCO S.A.
P.B.X. 3559632
FAX: (53) 3559694
AA: 3130
E-mail: rymco@rymco.com.co
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ETRYM 001 - 26

5. EMPAQUE: Las jeringas RYMCO se empaquen individualmente con sus respectivas agujas en empaque "BLISTER PEEL PACK", el cual se compone de dos partes:

5.1 Papel Microporoso: Papel grado médico, resistente, elaborado a base de fibras vegetales, con alto control de la microporosidad, el cual permite la esterilización con gas ET0 y constituye una barrera a bacterias y/o microorganismos contaminantes.

5.2 Película Plástica: Película transparente, de alta resistencia fabricada con base en un laminado de Poliamida + Polietileno ó Poliamida + Polipropileno + Polietileno.

Se une al papel microporoso, obteniéndose un sellado integro y confiable, manteniendo una apertura del empaque individual suave y libre de fibras.

5.3 Impresión: El empaque lleva claramente impreso la referencia del producto, el número de lote de fabricación y la fecha de expiración del producto.

5.4 Lengüetas: Comodidad con el diseño del empaque que facilita su apertura en forma aséptica (Peel Opening), libre de fibras.

PRESENTACION CAJA X 80 UNIDADES

REGISTRO INVIMA 2013DM-000438-R2

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 32. (JERINGAS DESECHABLES 50 ML) RYMCO



CASA MATRIZ

PRODUCTOS

SERVIMED

NOTICIAS & EVENTOS



Componentes y Materiales:

Fabricados con materiales atóxicos, según procedimiento descrito en la U.S.P. XXVII.

Cilindro:

Fabricado en polipropileno traslúcido, el diseño de la pieza, tiene las siguientes características.

- *Cono de Acoplamiento:* Tipo Luer 6% el cual puede ser excéntrico o concéntrico, su función es acoplar a los conos hembra tipo Luer.
- *Cuerpo del Cilindro:* Cumple con las tolerancias dimensionales, especificadas en la Norma Técnica Colombiana n° 1988.
- *Alas de Sujeción:* Lo cual permite que la jeringa no se deslice en una superficie inclinada (10°) y de fácil manejo para su manipulación.

Émbolo:

Fabricado en polietileno de alta densidad o polipropileno, su función es permitir la succión y desalojo de sustancias del organismo, su diseño tiene las siguientes características.

- *Pistón:* El cual puede ser plástico (dos partes) o de caucho (tres partes). Este componente asegura la hermeticidad y suavidad al deslizarse dentro del cilindro. El émbolo junto con el pistón cumple con el requisito de longitud, según especificación de la Norma Técnica Colombiana N° 1988.
- *Disco de Empuje:* Diseño que facilita la punción del producto.

Escala Volumétrica:

Impresa en cada jeringa con tinta de color óptico para facilitar su lectura, su función es permitir la dosificación exacta de las soluciones a administrar.

Registro INVIMA 2013DM-000430 R2

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 33. (VENOCLISIS MACRO GOTEO CAL 20 X 1 ½") RYMCO



CASA MATRIZ

PRODUCTOS

SERVIMED

NOTICIAS & EVENTOS



Componentes y Materiales:

Fabricados con materiales atóxicos, según procedimiento descrito en la U.S.P. XXVII.

Dispositivo de perforación (Spike): Fabricado en A.B.S, terminado en una punta en forma de bisel, la cual permite la perforación del contenedor de la solución a administrar.

Protector del Dispositivo: Fabricado en Polietileno o Polipropileno, su función es proteger el dispositivo de perforación, posee en su extremo abierto unas espiras, las cuales permiten la entrada y salida del gas ETO en el interior del equipo.

Cámara de Goteo: Fabricada de PVC flexible, translucido, la cámara va ensamblada al spike por su parte más ancha, su función es facilitar el conteo de gotas y evitar que se formen burbujas en el interior de la manguera.

Manguera: Fabricada de PVC flexible, translucido, no colapsable, en uno de sus extremos va ensamblada a la cámara, su función es permitir el transporte de la solución a administrar.

Regulador de Flujo: Fabricado en A.B.S, posee un dispositivo que permite la interrupción del flujo sin alterar el goteo; su función es asegurar un goteo preciso y uniforme.

Sitio de Inyección (Látex): Fabricado en látex natural, su función es permitir la aplicación adicional de medicamentos.

Cono Luer: Fabricado en polipropileno, que adapta perfectamente a conos tipo luer, su función es acoplar al equipo de Catéter o equipo de pericraneal.

REGISTRO INVIMA 2006DM-0000157-R1

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 34. (VENOCLISIS MICRO GOTEO CAL 22X 1 ½") RYMCO



CASA MATRIZ

PRODUCTOS

SERVIMED

NOTICIAS & EVENTOS



ESPECIFICACIONES GENERALES: Equipo para administración de soluciones microgoteo. Dispositivo estéril desechable, con tres orificios para facilitar el flujo de soluciones y protector, cámara transparente, con factor goteo, manguera de tránsito, regulador de flujo con rodillo, para el control del goteo, para la inyección **alterna de medicamentos**, esterilizado con óxido de estileno, libre de pirógenos.

COMPONENTES: PVC grado médico.

USOS O MODO DE EMPLEO: Dispositivo médico estéril que sirve para administrar líquidos por una vía endovenosa en forma continua y/o dosificada.

PRECAUCIONES: Solo destape al momento de usar. Por ningún motivo utilice un producto abierto con posterioridad ya que no se garantiza la esterilidad del mismo.

REGISTRO INVIMA 2006DM-0000157-R1

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 35-36. (CATETER TIPO PERIFERICO N. 14 Y 22) BECTON DICKINSON



Descripción

ESPECIFICACIONES GENERALES: Catéter intravenoso "INSYTE" No. 14 X 2", No.16 X 1 ¼, No.18 X 1 ¼, No.20 X 1 ¼, No. 22 X 1"ó No.24 X 3/4". Catéter de vialon para venopunción periférica. Bisel con "Precisión Glide" de Becton Dickinson, con bordes en ángulo agudo, libre de irregularidades, lo que disminuye la fuerza de penetración a través de la piel y la pared vascular. Proceso de siliconización del catéter y de la aguja facilita el deslizamiento del catéter dentro de la vena disminuyendo las posibilidades de trauma al endotelio vascular.

COMPONENTES: Diseñado en material Vialón el poliuretano, materia prima de BD con sus propiedades de : Tromboresistencia por sus paredes lisas .No estimula la agregación plaquetaria, evitando así la formación de trombos, disminuye las complicaciones en el paciente. Termosensibilidad: Se ablanda hasta un 75% en el interior de la vena. Garantizando mayor tiempo de permanencia en vena. Menoria elastomérica: No se acoda, no se colapsa, se asocian con una incidencia de 50% menos de flebitis que los catéteres de FEP (Teflón) según Roberts y Maki. Mayor resistencia tensil: Comparativamente frente al P.V.C, el FEP y las siliconas, se ha comprobado una superior resistencia. Biocompatibilidad: Por las características de su material Vialón representado en mayor tiempo de permanencia en vena, menores complicaciones para el paciente y menor número de catéteres por procedimiento.

USOS O MODO DE EMPLEO: Catéter periférico, diseñado en Poliuretano Vialón, el biomaterial, materia prima de BD. Catéter unido a un pabellón, diseñado para colocación en venas periféricas (manos y brazos preferiblemente) con el objetivo de administrar al sistema circulatorio líquidos, fármacos y/o sangre.

PRECAUCIONES: Técnica de esterilización: Oxido de Etileno. Vida útil partir de su fabricación: 5 Años. Siempre y cuando el empaque se mantenga íntegro y libre de humedad. Producto para usarlo una sola vez. Condiciones de almacenamiento: Manténgase en un lugar libre de humedad y evitando temperaturas extremas.

Clasificación de Riesgo: IIA.

UNIDAD DE VENTA: Unidad.

REGISTRO INVIMA: 2005V-0003510

LABORATORIO: BECTON DICKINSON

PAIS ORIGEN: ESTADOS UNIDOS

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 37. (JABON QUIRUCIDAL) LAB. QUIRUMEDICAS

Indicado en el lavado de manos del personal médico y paramédico, la preparación preoperatoria del paciente, el lavado de heridas infectadas y no infectadas, la desinfección de laceraciones en pacientes ambulatorios, lavado del paciente quemado, y en general, para la profilaxis de la piel.

Composición:

Cada 100 ml contiene:

Clorhexidina digluconato	4.0 g
Cetrimida	1.0 g
Alcohol isopropílico	1.0 g
Excipientes c.s.p.	100 cc

Presentación:

Frasco * 60 ml, 120 ml, 240 ml, 500 ml,
1 LT, galón * 3750 ml, bolsa * 1000 ml.

Registro INVIMA 2008M-0008204



REGISTRO INVIMA 2008M-0008204

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 38. (SULFALLIDOL) LAB. VECOL

Sulfallidol®



DESCRIPCIÓN:

Ungüento de aplicación tópica (externa).

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g del producto contienen:

Alantoína.....	2 g
Sulfanilamida.....	6 g
Subnitrato de bismuto.....	1 g
Óxido de Zinc.....	15 g

INDICACIONES:

Se recomienda para tratar lesiones en la piel de los animales domésticos como cicatrizante y regenerador de epitelios.



DOSIS Y FORMA DE EMPLEO:

Previo limpieza de la piel en el área afectada, se aplica externamente frotando muy bien, de 2 a 3 veces al día.

PRESENTACIÓN:

Envase plástico por 100 g

Registro ICA No. 1925 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 39. (BISMOPET) INVET



Laboratorio:



INVET S. A.

Autopista Medellin Km 2.5 Vía Bogotá Siberia entrada parcela Bod. I-138

Teléfono: +(571)8985140

Fax: +(57)3208498092

Mail: ventas@invetcolombia.com

Sitio web: www.invetcolombia.com

Uso terapéutico: ANTIDIARREICO

Principio Activo: SUBSALICILATO DE BISMUTO

Especies:



Descripción:

BISMO PET es una suspensión bactericida

Composición	Contenido
Subsalicilato de bismuto	1.75 g
Excipientes csp	100 ml

- **ACCIÓN:** Antidiarréico

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **INDICACIONES:** En perros, gatos, terneros y potros como coadyuvante en el control y tratamiento de diarreas y enteritis no específicas. OTROS USOS: Diarreas por hipersecreción producida por enterotoxinas. Protección de la mucosa gastrointestinal por disminución del peristaltismo y por irritación de toxinas. Antiácido y antiinflamatorio. Tratamiento de desórdenes gastrointestinales en general.
- **DOSIS:** Vía oral, a razón de 20 mg de activo por kg de peso, 3 veces al día. En la práctica administrar en Perros y Gatos 20 ml por cada 15 kg tres (3) veces al día. En Potros y Terneros de 85 a 220 kg usar de 100 a 250 ml en tres (3) tomas al día. Administrar con jeringa apropiada de plástico o con sonda, evitando la aspiración pulmonar. La duración del tratamiento depende de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES:** Debe usarse con precaución en gatos y en animales menores de un mes de edad. Este producto contiene Salicilato. En casos de severa diarrea y/o inflamación gastrointestinal puede ser necesaria hospitalización e hidratación oral o parenteral. Consultar al Médico Veterinario si persisten síntomas de depresión, fiebre, vómito, diarrea o molestia abdominal. La administración de BISMO-PET puede dar lugar a un color oscurecimiento de las heces, lo cual no debe confundirse con melena. **IMPORTANTE:** Agitar antes de usar.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Suspensión oral
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 120 y 240 ml
- **REGISTRO:** 5945 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 40. (PEZOSAN) PROVET



Laboratorio:



LABORATORIOS PROVET S. A.

Autopista Medellín Km 7 Cost. Occidental Parque Ind. CELTA

Teléfono: +(571)2259110

Fax: +(571)2299102

Mail: provect@laboratoriosprovect.com.co

Sitio web: www.laboratoriosprovect.com

Uso terapéutico: CICATRIZANTE

Principio Activo: OXIDO DE ZINC, NEOMICINA SULFATO, ALANTOINA, LIDOCAINA, ACEITE DE KALAYA

Especies:



Descripción:

PEZOSAN-N UNGÜENTO NF es un anestésico y cicatrizante

Composición	Contenido
Neomicina sulfato	1 g
Alantoína	2 g
Lidocaína	2.75 g

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Óxido de zinc	10 g
Aceite de kalaya csp	100 g

- **ACCIÓN:** Bactericida, anestésico local, lubricante y cicatrizante
- **INDICACIONES:** En todas las especies: Alivia rápidamente el dolor y sana rápidamente pequeñas heridas, quemaduras, escoriaciones y afecciones dolorosas de la piel, a la vez que previene y contrarresta infecciones. En bovinos: Alivia rápidamente el dolor y cura el agrietamiento de pezones, permitiendo el ordeño y el amamantamiento. En pequeños animales: Ideal en procesos de cicatrización postquirúrgicos tales como: caudectomías (cortes de cola), corte de orejas, amputación de espolones, pezuñas y garras. En humanos: Alivia rápidamente el dolor y sana rápidamente pequeñas heridas, quemaduras, escoriaciones y afecciones dolorosas de la piel, a la vez que previene y contrarresta infecciones. Util en la prevención y el tratamiento de la pañalitis.
- **DOSIS:** Previa limpieza del área afectada, aplicar PEZOSAN-N, 2 a 3 veces al día, hasta la curación de la herida.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee
- **CONTRAINDICACIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños
- **MODO DE APLICACIÓN:** Ungüento
- **PRESENTACIÓN:** Pote por 30, 100 y 220 g
- **REGISTRO:** 2607 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 41. (ALFA 3) LAB. ZOO

Alfa-3®

Crema

Cicatrizante, secante, desinfectante y repelente de insectos

Registro ICA 1869-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 mL contienen:

Acido fénico	1.5 g
Oxido de zinc	7 g
Aceite de pino	2 g
Excipientes c.s.p.	100 g

INDICACIONES:

En bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos y caninos como cicatrizante, antiséptico, secante y repelente de insectos.

Desinfección, secado y estimulación de la cicatrización en todo tipo de heridas. Actúa como repelente de insectos, impide el desarrollo de miasis (gusaneras). Útil en desgarres de la piel, heridas y grietas en glándula mamaria (ubres y pezones), úlceras causadas por sillas y arneses, infecciones del ombligo (onfalitis), caudectomías (corte de cola en ovejas), y en heridas quirúrgicas, para lograr una cicatrización rápida sin infección.

PRESENTACIONES:

Tubo colapsible por 30 mL. Frasco plástico por 250 mL.

DOSIS:

Aplicar una cantidad suficiente para cubrir el área afectada con una capa uniforme de crema.

ADMINISTRACIÓN:

Tópica. Aplicar uniformemente sobre la herida, 3 - 5 veces al día, durante 7 días seguidos como mínimo. En caso de heridas contaminadas: lavar la zona afectada con jabón o soluciones antisépticas, secar y aplicar **Alfa-3** hasta la cicatrización de la herida.



REGISTRO ICA 1869-DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 42. (COMPLEX) PHARVET

COMPLEX.55®

Recostituyente general

El anti-anémico ideal de última generación
Vitamina B₁₂, 550 mcg

COMPOSICIÓN

Cada ml de COMPLEX.55 contiene:

- Cianocobalamina	550mcg
- Niacinamida	100mg
- Tiamina HCL	55mg
- Aspartato de Potasio	25mg
- Metionina	5mg
- Excipientes	1ml

EFFECTOS FARMACOLÓGICOS

Por su composición ejerce un efecto antianémico y reconstituyente en todos los animales. Es un estimulante metabólico, pues todos sus componentes participan en reacciones enzimáticas generadoras de energía fundamentales para el buen desarrollo de los animales

ACCIONES

Por su alto contenido en cianocobalamina, tiamina, niacinamida, aspartato de potasio y metionina, COMPLEX.55. Ejerce una acción estimulante sobre el metabolismo enzimático y la actividad muscular; permitiendo una mejor oxigenación, disminuyendo el cansancio y la fatiga en los animales débiles y en proceso de recuperación.

PRESENTACIÓN

- Frascos de 10ml
- Frascos de 20ml
- Frascos de 50ml
- Frascos de 100ml
- Frascos de 250ml
- Frascos de 500ml



Registro ICA
6646- MV

INDICACIONES

- Anemias por hemoparasitos y de cualquier índole.
- Estimulante del apetito
- Lesiones neurológicas y músculo - esqueléticas.
- Agotamiento y/o estados de debilidad generalizados.

APLICACIÓN Y DOSIS

Por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa.

Bovinos, equinos y porcinos:

1ml/100kg de peso

5 ml/ por animal adulto (Bovino)

BENEFICIOS

- Antianémico reconstituyente de última generación con la máxima potencia.
- Dosis optimizadas y concentradas para mayor actividad farmacológica.

COMPLEX.55

Es un producto farmacéutico de alto índice de seguridad y sus componentes carecen de toxicidad aguda manifiesta.

REGISTRO ICA 6646-MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 43. (COMPLELAND B12 ORAL) VETERLAND



Laboratorio:



LABORATORIOS VETERLAND LTDA

Cr. 19 B 168 - 16 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)6789851

Fax: +(571)6789830

Mail: contacto@laboratoriosveterland.com

Sitio web: www.laboratoriosveterland.com

Uso terapéutico: VITAMINICO MINERAL

Principio Activo: VITAMINA B1, B2, B3, B5, B6, B12, BIOTINA, ACIDO PANTOTENICO, CALCIO

Especies:



Descripción:

COMPLELAND B12 ORAL es un complejo de vitamina B

Composición	Contenido
Ácido pantoténico	200 mg
Biotina	45 mg
Tiamina clorhidrato (B1)	150 mg
Riboflavina (B2)	72 mg

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Piridoxina clorhidrato (B6)	72 mg
Cianocobalamina (B12)	320 mcg
Niacinamida	2.200 mg
Glicerofosfato de calcio	1.000 mg
Glicerofosfato de manganeso	100 mg
Glicerofosfato de potasio 75%	100 mg
Glicerofosfato de sodio	1.800 mg
Ácido cítrico anhidro	85 mg
Ácido láctico 85%	2.000 mg
Excipientes csp	100 ml

- **ACCIÓN:** Vitamínico, mineralizante
- **INDICACIONES:** Compleland* B12 incorpora en su fórmula Ácido Pantoténico y Biotina, las cuales en interrelación con la vitamina B12 y el Complejo B, constituyen importante factor de crecimiento. Su deficiencia se relaciona con anorexia, ulceración y necrosis intestinal, diarreas sanguinolentas, degeneración de la mielina de los nervios periféricos, alopecia, cojeras inespecíficas, dermatitis, escamaciones en la piel, crecimiento lento, incoordinación (paso de ganso en cerdos), bajos índices de concepción. Su deficiencia en aves ocasiona también retardo en el desarrollo del plumaje, dermatitis en las comisuras del pico, alrededor de párpados, en la cloaca y en las patas; en gallinas se presenta disminución en la incubabilidad de los huevos y los pollos de un día muestran mortalidades tempranas. Compleland*B12 ejerce también acción hidratante. Los glicerofosfatos de Calcio, Sodio, Potasio y Manganeso presentes en la fórmula de Compleland*B12 tienen propiedades Neurotónicas y constituyen fuentes de Calcio y Fósforo, factores que mejoran la conversión alimenticia, promueven el consumo de agua y ayudan a combatir el estrés presente en enfermedades de diversa etiología.
- **DOSIS:** Aves: 15 a 20 mL por litro de agua de bebida. Equinos y bovinos: 20 mL por cada 100 kg de peso vivo-día. Felinos: 2 a 5 mL día. Caninos: Cachorros Adultos Raza pequeña 2 a 5 mL 5 a 10 mL día. Raza grande 5 a 10 mL 10 a 15 mL día
En todos los casos el tratamiento deberá mantenerse durante 3 a 5 días, sin embargo, la dosis y la frecuencia pueden variar a criterio del Médico Veterinario según las necesidades de los animales y las fuentes de alimentación.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:** Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Consérvese en un lugar fresco y protegido de la luz
- **MODO DE APLICACIÓN:** Suspensión oral
- **PRESENTACIÓN:** Frasco inyectable por 100 mL, 1000 mL y 4.000 mL.
- **REGISTRO:** 2730 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 44. (LOCION PODAL) LAB. INDUSTRIALES S.A. "LA QUINSA" PROVIMI



Laboratorio:

LABORATORIOS INDUSTRIALES. S.A." LAQUINSA" PROVIMI

Apdo 10288-1000 San José Costa Rica

Teléfono: +(506)22471000

Fax: +(506)22361419

Mail: consulta@laquinsa.co.cr

Uso terapéutico: ANTISEPTICO / DESINFECTANTE

Principio Activo: TRINITROFENOL, ACIDO ACETICO, FORMALDEHIDO

Especies:



Descripción:

LOCIÓN PODAL es un antiséptico y desinfectante para el casco

Composición	Contenido
Trinitrofenol	0.31 g
Ácido acético	2.78 g
Formaldehido solución	6.18 g
Vehículo csp	100 ml

- **ACCIÓN:** Antiséptico y desinfectante
- **INDICACIONES:** Para tratar la podredumbre del casco; controlar y tratar afecciones en los cascos y pezuñas producidas por hongos y bacterias en épocas húmedas; endurecer cascos y pezuñas cuando existe reblandecimiento

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

y para el tratamiento de las lesiones en los cascos y pezuñas causadas por la estomatitis.

- **DOSIS:** Laver perfectamente el casco o la pezuña afectada y aplicar a diario una cantidad de **LOCIÓN PODAL** cubriendo completamente la pezuña o el casco, luego se recomienda colocar al animal en un lugar seco. En el invierno se recomienda aplicar regularmente **LOCIÓN PODAL** para controlar los problemas ocasionados por el exceso de humedad. Aplicar dos veces al día al ganado que entra al establo.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica.
- **CONTRAINDICACIONES:** Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener el producto en el envase original, alejado del calor y la luz, en un lugar fresco y seco.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución tópica
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 500 ml y 1.000 ml
- **REGISTRO:** 4339 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 45. (DIRPIRINA) VECOL



Laboratorio:



EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS " VECOL"

Av. El Dorado 82 - 93 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)4254800

Fax: +(571)4254835

Mail: vecol@vecol.com.co

Sitio web: www.vecol.com.co

Uso terapéutico: ANTIINFLAMATORIO

Principio Activo: DIPIRONA

Especies:



Descripción:

DIPIRINA es un analgésico, antipirético y antiespasmódico

Composición	Por cada ml
Dipirone	500 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Analgésico, antipirético y antiespasmódico
- **INDICACIONES:** Útil en el tratamiento sintomático de afecciones caracterizadas por dolores agudos y fiebre en todas las especies domésticas. Especialmente efectivo en cólicos en equinos y bovinos.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **DOSIS:** Bovinos, Equinos: La dosis recomendada es de 1 ml / 30 kg de peso vivo. Caninos y Gatos: La dosis recomendada es de 0.5 ml / 10 kg de peso vivo. Se aplica por vía Intramuscular o Intravenosa lenta cada 8 horas
- **TIEMPO DE RETIRO:** La leche producida durante el tratamiento y 2 días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES:** Manténgase en lugar fresco y seco. Evite las temperaturas bajas
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 20, 50 y 100 ml

- **REGISTRO:** 1062 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 46. (LEXAVET UNGÜENTO) VIRBAC



Laboratorio:



VIRBAC COLOMBIA LTDA

Carrera 54 76 20 Bogotá Colombia

Teléfono: (+571)2252100 018000122100

Mail: clientescolombia@virbac.com.mx

Sitio web: <http://www.virbac.co/contactenos>

Uso terapéutico: ECTOPARASITICIDA

Principio Activo: DICLORVOS

Especies:



Descripción:

LEXAVET es un ectoparasitida

Composición	Contenido
Diclorvos DDVP	0.5 g
Aceite de pino	26.5 g
Excipientes c.s.p.	100 g

- **ACCIÓN:** Ectoparasitida

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **INDICACIONES:** Lexavet® Ungüento indicado principalmente en todas aquellas zonas donde la prevalencia de las moscas, miasis y del nuche es alta, ya que éstas ponen sus huevos casi en todas las heridas que se producen, incluso en erosiones tan pequeñas como mordeduras de garrapatas y moscas en la piel de todas las especies domésticas; también para el control del gusano de la nariz de las ovejas (Oestrus ovis). Lexavet® Se aplica sobre la piel afectada por gusaneras, donde es absorbido produciendo su efecto sobre las larvas de las moscas. Estas larvas se desarrollan únicamente en tejidos de animales vivos de sangre caliente. Además de poseer efecto bactericida, debido a su composición con derivados fenólicos, contribuyen a para que permanezca por mas tiempo sobre la zona de aplicación permitiendo acción prolongada.
- **DOSIS:** Aplíquelo directamente sobre la gusanera y/o herida. En ovejas aplíquese en las fosas nasales. Aplíquelo diariamente hasta cuando desaparezcan las larvas o sane la herida. Uso externo, aplicar 2 veces por semana.
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 15 días después de finalizado el tratamiento.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Ungüento
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 220 y 400 g.
- **REGISTRO:** 3495 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 47. (ATROPINA ZOO) LAB. ZOO



Laboratorio:



LABORATORIOS ZOO S.A.S.

Dg. 30 C 3 A - 36 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)5665397

Fax: +(571)2887323

Mail: laboratorioszoo@laboratorioszoo.com

Sitio web: www.laboratorioszoo.com

Uso terapéutico: ANTICOLINERGICO

Principio Activo: ATROPINA SULFATO

Especies:



Descripción:

ATROPINA ZOO es un preanestésico, antiespasmódico, anticolinérgico, antisecretorio y antídoto de intoxicaciones

Composición	Contenido
Atropina sulfato	1 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Anticolinérgico

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **INDICACIONES:** Anticolinérgico, antiespasmódico, antisecretorio, antídoto en intoxicaciones por insecticidas organofosforados y carbamatos. En general, inhibe los efectos de la actividad del sistema nervioso autónomo parasimpático, por lo que se puede utilizar en los siguientes casos: En medicación preanestésica: disminuir la salivación y las secreciones de las vías respiratorias durante la anestesia general, evitar la bronco-constricción inducida por la administración de anestésicos generales inhalados. Reducir el peristaltismo gastrointestinal generado por los reflejos vagales inducidos por la manipulación quirúrgica de los órganos internos. Como antídoto: tratamiento de intoxicaciones por agonistas colinérgicos e inhibidores de la acetil colinesterasa, tales como muscarina e insecticidas carbamatos y organofosforados que actúan como anticolinesterasas. En caso de emergencia se puede administrar por vía intravenosa. Evita la bradicardia y contrarresta el aumento de las secreciones a nivel de tracto respiratorio. En oftalmología: como midriático (dilatador de pupila), para exploraciones de fondo de ojo con el objetivo de examinar las estructuras oculares internas, dilata el esfínter del iris, inervado por fibras colinérgicas del nervio motor ocular común.

Sistema cardiovascular: en colapso cardiovascular y en el tratamiento inicial de infarto agudo del miocardio. Restablece la frecuencia cardíaca y la presión arterial durante la anestesia cuando la estimulación vagal producida por la manipulación quirúrgica causa una súbita disminución de la frecuencia del pulso y de la actividad cardíaca, por lo que evita el síncope vagal y la bradicardia grave. Actúa como acelerador cardíaco.

Tracto genitourinario: tratamiento de cólico renal por cálculos, debido a que relaja la musculatura lisa uretral. Se utiliza para disminuir la presión intravesical, aumenta la capacidad vesical y disminuye la fuerza de contracción de la vejiga.

- **DOSIS:** En general en todas las especies la dosis de atropina como antiespasmódico, antisecretorio y preanestésico es de 0.044 mg x kg de peso vivo, vía S.C., I.M. o I.V.
- | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|---|----|-----|-----|----|
| Bovinos | 4 | - | 5 | mL | por | 100 | kg |
| Equinos | 1 | - | 4 | mL | por | 100 | kg |
| Ovinos y caprinos | 2 | - | 3 | mL | por | 50 | kg |
| Porcinos | 2 | - | 3 | mL | por | 50 | kg |
| Caninos y felinos | 0.44 | | | mL | por | 10 | kg |

En caso de intoxicación por organofosforados, carbamatos o muscarina, se recomienda administrar a la dosis de 0.25 mg x kg de peso vivo (equivalente a 25 mL de Atropina por cada 100 kg de peso), aplicar una cuarta parte de la dosis por vía I.V. lenta y el resto por vía I.M. Observar los animales permanentemente y de acuerdo con la sintomatología, repetir el tratamiento cada 6 - 12 horas durante 3 días seguidos. En todo caso, la dosificación y la frecuencia del tratamiento deben ser bajo el criterio y la supervisión del Médico Veterinario.

- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee
- **CONTRAINDICACIONES:** No aplicar en animales con íleo paralítico. No aplicar en animales que presenten adherencias en cristalino y córnea o con glaucoma

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

porque en la midriasis causada por la atropina, se bloquea el drenaje de los líquidos oculares por el conducto de Schlemm, provocando aumento de la presión intraocular.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Sequedad de boca y garganta, disfagia (dificultad para tragar), estreñimiento, taquicardia, fotofobia, problemas de visión, depresión, parálisis, broncodilatación, excitación, convulsiones y aumento de la presión arterial. Con dosis altas induce contracción ventricular prematura, incontinencia y vómito. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.

- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frascos por 10 y 50 ml
- **REGISTRO:** 121 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 48. (GUANTE DE EXAMEN) ETERNA – PRECISION CARE



Protección de manos en tratamientos médicos no estériles. Fabricados con los estándares de la norma ASTM D3578.

- Fabricados en látex natural.
- Alta resistencia a la tracción y abrasión.
- Anatómicos manga larga.
- Revestimiento de almidón que reduce la fricción sobre la piel y permite un ajuste perfecto y confortable.
- Color natural.
- Borde enrollado.

Tallas: S - M - L

Presentación: Display x 100 unidades - Bolsa x 2 Unidades - Bolsa x 10 Unidades


REGISTRO SANITARIO NO. INVIMA 2011DM-0007180

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 49. (GUANTES DE NITRILO) ETERNA – PRECISION CARE



Protección de manos en la manipulación de sustancias químicas con propiedades irritantes, tóxicas, de riesgo biológico y para la manipulación de alimentos.

- Fabricados en nitrilo sintético.
- Alta resistencia a lípidos, aceites y productos químicos.
- Alta resistencia a la perforación y al desgaste.
- Ambidiestros.
- Borde enrollado.
- Recomendado para minimizar problemas de salud relacionados con uso del látex y/o talco.
- Color azul.
- Sin talco.

Tallas: S - M - L

Presentación: Display x 100 unidades

REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2017DM-0015819

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 50. (TAPA BOCAS) OTAI



Datos Generales del Producto

Expediente	20031804	Nombre producto	MASCARILLA (TAPABOCAS) DESECHABLE PARA ATAR O CON ELASTICOS Y/O CON PELICULA ANTIEMPAÑANTE - OTAL, SANQI MEDICAL.			
Registro Sanitario	INVIMA 2011DM-0007122	Vencimiento	2021/03/31	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA TODAS LAS REFERENCIAS DE MASCARILLA (TAPABOCAS) DESECHABLE PARA ATAR O CON ELASTICO Y/O CON PELICULA ANTIEMPAÑANTE MARCA OTAL, SANQI MEDICAL. SE APRUEBAN LAS ETIQUETAS ALLEGADAS CON RADICADO NO. 2012071578 DEL 25/06/2012.					
Marcas	OTAI, SANQUI MEDICAL.					

Datos de Interés

Vida Útil	100 Años	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	INDICADOS PARA REDUCIR EL RIESGO POTENCIAL DE EXPOSICION A FLUIDOS CORPORALES Y/O PARTICULAS SUSPENDIDAS EN EL AMBIENTE, AYUDAN A LIMITAR LA PROPAGACION DE MICROORGANISMOS.	Riesgo	

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
50 UNIDADES / CAJA, 40 CAJAS / CAJA MASTER, 25 UNIDADES / CAJA, 20 CAJAS / CAJA MASTER.
CAJA X 100 UNIDADES.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 51. (CANIGEN SEXUPLE) LAB. VIRBAC



Laboratorio:



VIRBAC COLOMBIA LTDA

Carrera 54 76 20 Bogotá Colombia

Teléfono: (+571)2252100 018000122100

Mail: clientescolombia@virbac.com.mx

Sitio web: <http://www.virbac.co/contactenos>

Uso terapéutico: BIOLOGICO

Principio Activo: VIRUS DE MOQUILLO, HEPATITIS, PARVOVIRUS, PARAINFLUENZA, RABIA, LEPTOSPIRA

Especies:



Descripción:

CANIGEN SEXTUPLE es una vacuna multivalente

Composición
Virus de Moquillo canino vivo modificado cepa Lederle.
Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Parvovirus canino atenuado cepa Cornell
Parainfluenza canina atenuada cepa Manhattan.
Leptospira interrogans serovar canicola cepa Instituto Pasteur
Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae cepa ATCC
Virus rábico inactivado cepa Pasteur VP 12
Excipientes c.s.p.

- **ACCIÓN:** Biológico
- **INDICACIONES:** Para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Parvovirus, Complejo Respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza; Leptospirosis y Rabia canina. Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico, **Canigen® Séxtuple** es la primera que logra la asociación de seis antígenos, capaz de conferir una protección equivalente a la desarrollada por antígenos individuales, lo que permite proteger a los perros con una sola revacunación. Todas las fracciones contienen Altos títulos, lo que permite sobrepasar la inmunidad materna en condiciones normales. Una vacuna con antígenos activos atenuados e inactivos y una selección de Cepas de Alta Infectividad mundialmente reconocidas, generan una respuesta inmune más intensa tanto de tipo Humoral como de tipo Celular, además de tener el número de pasajes adecuado para que sea totalmente segura y no diseminar el virus al medio ambiente.
- **DOSIS:** Vía Subcutánea ó Intramuscular. Unidosis de 1.5 mL. Se recomienda para la revacunación anual en perros adultos y se puede utilizar como la última vacuna del calendario de vacunación de cachorros (animales mayores de tres meses de edad). A criterio del Médico Veterinario.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Mantenga el producto en refrigeración entre 2 y 8 °C, en estricta protección de la luz solar directa. No permita el congelamiento.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco unidosis de 1.5 mL..
- **REGISTRO:** 8626 BV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 52. (EQUILIS PREQUENZA TE) LAB. MSD SALUD ANIMAL MERCK & CO INC



Laboratorio:



MSD Salud Animal MERCK & CO INC

Av Kr 68 17 64 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(57)(1)5925092

Fax: +(571)4128620

Mail: infoclientes@merck.com

Sitio web: www.msd-salud-animal.com.co

Uso terapéutico: BIOLÓGICO

Principio Activo: TETANOS, INFLUENZA

Especies:



Descripción:

EQUILIS PREQUENZA TE es una vacuna inactivada contra la Influenza Equina y el Tétano

Composición	Contenido
Praga 1/56 (H7N7)	100 UA
New Market 1/93 (N3N8 Americano)	50 UA
New Market 2/93 (H3N8 Europeo)	50 UA
Toxoide tetánico	40 LF

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **ACCIÓN:** Vacuna inactivada
- **INDICACIONES:** Inmunización activa de equinos y ponies, contra la Influenza Equina reduciendo la severidad y la duración de los signos clínicos y reduce la cantidad y duración de la excreción del virus después de la infección, además inmuniza activamente contra el Tétano previniendo la mortalidad causada por este.
- **DOSIS:** Inyectar 1 ml por vía intramuscular profunda. Sólo deben vacunarse animales sanos. Conservar en refrigeración entre 2 - 8°C. No congelar. Antes de aplicar la vacuna permitir que esta llegue a una temperatura de 15°C - 25°C.

Aplicar en animales mayores de 6 meses de edad
1a vacunación 1 ml Día 0
2a vacunación 1 ml al mes de la primera dosis
3a vacunación 1 ml a los 6 meses de la primera dosis
4a vacunación 1 ml a los 18 meses de la primera dosis
Revacunación Anual.

- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Agitar antes de usar. Ocasionalmente y de manera transitoria puede causar inflamación en el sitio de la inyección, que desaparece en una semana aproximadamente. Es segura en hembras gestantes, y puede ser administrada durante el programa de entrenamiento sin necesidad de reducir el ejercicio. NO congelar. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Frasco unidosis
- **PRESENTACIÓN:** Estuche con 10 viales de 1 dosis.
- **REGISTRO:** 5752 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 53. (ALCOHOL) JGB



Alcohol JGB



INVIMA 2008M-007725

Es un medicamento. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. si los síntomas persisten consulte a su médico.

Composición: Cada 100 mL de solución hidroalcohólica contiene 73.7 mL de alcohol etílico impotabilizado al 96%, agua purificada.

Alcohol Antiséptico de uso externo, útil para la limpieza y desinfección de la piel.

Presentaciones

Alcohol 120mL/ 350 mL/ 700 mL / Galon

Instrucciones de uso

Aplicar directamente sobre la piel en la zona afectada.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 54. (AGUA OXIGENADA) BIOFARMA



LABORATORIOS BIOFARMA DE COLOMBIA

Seguridad y Confianza

 Carrera 69c No. 31-94 sur, Bogotá - Colombia

servicio al cliente:

 **403 84 29**

INICIO

PRODUCTOS

EMPRESA

PEDIDOS

CONTÁCTENOS

INFORMACION

VM

Composición:

Cada 100 ml contienen:

Peróxido de hidrogeno al 50%	6 g
Vehículo c.s.p.	100 ml



Indicaciones:

Antiséptico y desinfectante de uso externo para gargarismos, duchas nasales, lavado de heridas, infecciones menores de la piel.

Contraindicaciones y advertencias:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del medicamento.
Consérvese a temperatura no mayor de 30 °C en su empaque original.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación:

60ml, 120 ml, 500 ml, 1 Galón

Registro INVIMA 2009M-0010181

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 55. (CLORHEXIDIN JABON) LAB. VIRBAC



Laboratorio:



VIRBAC COLOMBIA LTDA

Carrera 54 76 20 Bogotá Colombia

Teléfono: (+571)2252100 018000122100

Mail: clientescolombia@virbac.com.mx

Sitio web: <http://www.virbac.co/contactenos>

Uso terapéutico: JABON ANTISEPTICO

Principio Activo: CLORHEXIDINA

Especies:



Descripción:

CLORHEXIN JABON es un antiséptico desodorante

Composición	Contenido
Clohexidina acetato	0.5 %
Jabón base	97.142%
Exipientes csp	100%

- **ACCIÓN:** Antiséptico
- **INDICACIONES:** Pasta de jabón que contiene clorhexidina; sustancia considerada como uno de los mejores antisépticos para el pelo y la piel, presenta una exquisita fragancia. Limpia y desinfecta profundamente, da brillo, desodoriza y restaura la condición del pelo y la piel en caninos, felinos y equinos.
- **DOSIS:** Moje completamente al animal y enjabónelo totalmente hasta producir abundante espuma; adicione más agua si es necesario. Haga un masaje durante 15 minutos para asegurar un buen contacto del jabón con el pelo y la piel.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Enjuague luego con abundante agua. En caso de afecciones del pelo y la piel, repita el procedimiento una vez por semana durante 4 semanas.

- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Pasta
- **PRESENTACIÓN:** Pasta por 100 g
- **REGISTRO:** 3720 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 56. (ESPECIFICO COOPERS) LAB. MSD SALUD ANIMAL MERCK & CO INC



Laboratorio:



MSD Salud Animal MERCK & CO INC

Av Kr 68 17 64 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(57)(1)5925092

Fax: +(571)4128620

Mail: infoclientes@merck.com

Sitio web: www.msd-salud-animal.com.co

Uso terapéutico: ANTISEPTICO / DESINFECTANTE

Principio Activo: ACEITES CRESOTADOS DERIVADOS DE LA HULLA

Especies:



Descripción:

ESPECIFICO COOPERS es un antiséptico y desinfectante

Composición	Contenido
Aceite de cresota (Fenoles 0.17 g)	0.44 g
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Antiséptico, desinfectante

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **INDICACIONES:** Antiséptico para animales y desinfectante para uso en instalaciones pecuarias. Antiséptico en cirugías, heridas, miasis, curación de ombligo. Desinfección general de establos, gallineros, galpones, corrales, porquerizas, vehículos, suelos, excretas y cercas
- **DOSIS:** Para antisepsia en animales: Utilizar una dilución al 3% de Específico Coopers (0,45% Fenol); en la práctica, 30 mL de Específico Coopers en 1 Litro de agua. Para desinfección general de instalaciones: Utilizar una dilución al 12% de Específico Coopers (1,896 Fenol); en la práctica, 120 mL de Específico Coopers en 1 Litro de agua
- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Cáustico. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en un lugar fresco y protegido de la luz
- **MODO DE APLICACIÓN:** Emulsión desinfectante
- **PRESENTACIÓN:** Frascos en vidrio ámbar por 50, 120, 235, 470 y 1000 mL. Tambor en acero laminado cold rolled por 3800 mL, 19 Litros y 190 Litros
- **REGISTRO:** 1018 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 57. (YODOLAND) VETERLAND



Laboratorio:



LABORATORIOS VETERLAND LTDA

Cr. 19 B 168 - 16 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)6789851

Fax: +(571)6789830

Mail: contacto@laboratoriosveterland.com

Sitio web: www.laboratoriosveterland.com

Uso terapéutico: ANTISEPTICO / DESINFECTANTE

Principio Activo: YODO ETANOL, ACIDO SULFURICO, ACIDO FOSFORICO

Especies:



Descripción:

YODOLAND TM es un desinfectante bactericida, viricida y fungicida

Composición	Contenido
Complejo yodo etanol, yodo disponible 2.6%	27.53 g
Ácido fosfórico	2 g
Ácido sulfúrico	4 g
Exipientes csp	100 ml

- **ACCIÓN:** Bactericida, viricida y fungicida

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **INDICACIONES:** Especialmente recomendado en lugares con alto riesgo de contaminación; jaulas, parideras, áreas de maternidad, desinfección de casetas para terneros, galpones y corrales, lanado y desinfección de manos, ubres, pezuñas, heridas expuestas, campos y áreas operatorias, utensilios diversos que están en contacto con una alta carga bacteriana; lavapatas, pediluvios y tapetes: 4 mL por litro de agua. Desinfección y limpieza de construcciones e instalaciones de granjas avícolas, porcícolas, establos, clínicas veterinarias, perreras, mallas, techos, pisos, depósitos de huevos, bandejas, áreas de cuarentena, prevención y control del Foot-rot. Programas de control integral en el manejo sanitario de la mastitis: 3 mL por litro de agua. Limpieza y desinfección de equipos, botas, guantes, mangas, palas, carretillas, escobillones, baldes, vagones y camiones de transporte de animales: 2 mL por litro de agua. Desinfección de equipos metálicos o de plástico, comederos, bebederos, incubadoras, nacederos, jaulas criadoras, equipos de lechería estanques: 1 mL por litro de agua. Potabilización de agua de bebida para animales: 0.5 mL por litro de agua.
- **DOSIS:** De acuerdo al uso, ver indicaciones
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES:** Manténgase fuera del alcance de los niños
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución
- **PRESENTACIÓN:** Envase por 100 mL, por 1 L, por 1 Galón y por 5 Galones.
- **REGISTRO:** 2961 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 58. (PANOLOG) NOVARTIS



Laboratorio:



NOVARTIS DE COLOMBIA S. A.

Cl. 93 B 16 - 31 Bogotá - Colombia

Teléfono: (571)6544444

Mail: soporte.usuario@novartis.com

Sitio web: www.sanidadanimalnovartis.com

Uso terapéutico: CREMA DERMATOLOGICA

Principio Activo: NEOMICINA SULFATO, NISTATINA, TIOESTREPTON, TRIAMCINOLONA ACETONIDA

Especies:



Descripción:

PANOLOG POMADA es un antibiótico, antiinflamatorio, antifúngico y antiprurítico

Composición	Contenido
Nistatina	100.000 UI
Neomicina sulfato	2.5mg
Tioestrepton	2.500 UI
Acetonida de triamcinolona	1 mg
Exipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Antibiótico, antiinflamatorio, antifúngico y antiprurítico
- **INDICACIONES:** La preparación está indicada para el tratamiento local de enfermedades cutáneas en perros y en gatos producidas por bacterias Gram +, Gram - y hongos (Candida albicans o Moniliasis). Es particularmente útil para el tratamiento de otitis agudas y crónicas causadas por bacterias Gram (+) y Gram (-) (Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Proteus sp., Pseudomonas sp.); en intertrigo interdigital en felinos y caninos y por Candida albicans en infecciones de la glándula paranal en caninos, por Gram (+) y Gram (-), en el tratamiento de enfermedades dermatológicas caracterizadas por inflamaciones y dermatitis exudativas particularmente aquellas que son adecuadas o amenazadas por infecciones bacterianas o producidas por Candida albicans. Es de utilidad en dermatitis eczematosas, dermatitis por contacto y dermatitis seborreica y como coadyudante

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

en el tratamiento de dermatitis secundaria a parasitismo externo (reacciones alérgicas a Ctenocephalides canis).

- **DOSIS:** La frecuencia de administración depende de la severidad de la lesión que se está tratando. Para inflamaciones moderadas la aplicación puede variar desde una sola vez diariamente a una vez por semana; para condiciones severas puede ser aplicado 2 - 3 veces diarias si es necesario. La frecuencia del tratamiento puede disminuirse a medida que se aprecie la mejoría. Otitis: Limpiar el canal auricular del cerumen acumulado con agua oxigenada. Inspeccione el canal y remueva los cuerpos extraños tales como la grasa, garrapatas, etc. Suministre 3 - 5 gotas de PANOLOG® UNGÜENTO. Glándula paranal infectada o áreas enquistadas: Drene la glándula o el quiste y llene con PANOLOG® UNGÜENTO.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES:** No indicado en el tratamiento de abscesos o infecciones profundas tales como inflamación de los vasos linfáticos. La terapia con antibióticos es la indicada en estos casos. PANOLOG® UNGÜENTO es muy bien tolerado. Las reacciones cutáneas que se pueden atribuir a su uso son muy escasas. Algunas pruebas han podido demostrar que los corticosteroides pueden ser absorbidos después de la aplicación tópica y causar efectos sistémicos. El porcentaje de efectos de ese tipo es mínimo en la aplicación tópica. No se recomienda para el tratamiento de abscesos profundos o aquellos que han sido perforados, ni tampoco para el tratamiento de quemaduras graves. Puede presentarse sensibilidad a la neomicina. Cuando aparezcan síntomas de enrojecimiento, irritación, persista o aumente la inflamación debe discontinuarse su uso. No se debe usar cuando hay pus en la lesión pues el fármaco puede contribuir a difundir la infección. Uso veterinario, manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Ungüento
- **PRESENTACIÓN:** *Ungüento por 15 Ml*
- **REGISTRO:** 4575 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 59. (ALERVEC) VECOL



Laboratorio:



EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS " VECOL"

Av. El Dorado 82 - 93 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)4254800

Fax: +(571)4254835

Mail: vecol@vecol.com.co

Sitio web: www.vecol.com.co

Uso terapéutico: ANTIHISTAMINICO

Principio Activo: DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO

Especies:



Descripción:

ALERVEC es un antihistamínico y antialérgico

Composición	Por cada ml
Clorhidrato de difenhidramina	25 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Antihistamínico.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **INDICACIONES:** Se recomienda en todos los casos de reacciones alérgicas, shock anafiláctico, laminitis, otitis eczematosa en bovinos y equinos, dermatitis, urticaria y conjuntivitis en caninos y felinos.
- **DOSIS:** Para Bovinos y Equinos es de 1 mg/ kg de peso vivo. Bovinos y equinos 1 ml por cada 25 kg de peso vivo. Para Caninos y Felinos es de 0,5 mg / kg de peso vivo. Caninos y felinos 0,2 ml por cada 10 kg de peso vivo. Aplicar por vía intramuscular o intravenosa
- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee
- **CONTRAINDICACIONES:** Mantenerse en un lugar fresco y seco. Evite las bajas temperaturas, no almacenar con alimentos
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frascos de vidrio por 10 y 50 ml
- **REGISTRO:** 1907 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 60. (CEFTIHIT) COLVET



Laboratorio:



LABORATORIO COLOMBIANO DE VETERINARIA S.A COLVET S.A.

Calle 162 No. 21 - 51 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(57)(1)6691066

Fax: 018000111066

Mail: info@colvet.com

Sitio web: www.laboratorioscolvet.com.co

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: CEFTIOFUR SODICO

Especies:



Descripción:

CEFTIHIT es un antimicrobiano

Composición	Contenido
Ceftiofur sódico	50 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Antimicrobiano
- **INDICACIONES:** Antibiótico de amplio espectro cuyo ingrediente activo es una cefalosporina de tercera generación. **CEFTIHIT** es un polvo estéril para reconstituír, indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por *Pasteurella* sp., *Haemophilus* sp., *Salmonella* sp., *Staphylococcus*

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

sp., Escherichia coli, Streptococcus sp., enfermedades podales causadas por Actinobacillus pleuroneumoniae, actinobacillus pyogenes, bacteroides melaninogenicus y fusobacterium necrophorum. Por su farmacocinética, sin tiempo de retiro en leche.

- **DOSIS:** Agregue el contenido completo del diluyente estéril al vial de polvo, de acuerdo a la presentación. **CEFTIHIT** de 1 gramo adicionar 20 ml de diluyente estéril, 4 gramos adicionar 80 ml de diluyente estéril. Inyección intramuscular profunda. Bovinos 1.1 - 2.2 mg/kg de peso vivo o 1-2 ml por cada 50 kg de peso vivo durante 3 a 5 días. Equinos 2.2 - 4.4 mg/kg de peso vivo o 2-4 ml por cada 50 kg de peso vivo durante 3 a 5 días. Porcinos 3-5 mg/kg de peso vivo o 0.6 a 1 ml por cada 10 kg de peso vivo durante 3 a 5 días.
- **TIEMPO DE RETIRO:** NO TIENE TIEMPO RETIRO EN LECHE. El sacrificio de los animales para el consumo se debe hacer luego de 12 horas del último tratamiento.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. El producto reconstituído en condiciones de refrigeración entre 2-8°C es estable por 5 días.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Polvo para reconstituír
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 1 y 4 gramos
- **REGISTRO:** 6500 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 61. (PIEDRA ALUMBRE) PROTOKIMICA



DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre químico: Sulfato doble de Aluminio y Amonio

Otros nombres: Alumbre de Amonio, Piedra Alumbre, Alumbre

Fórmula Química o Componentes: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{NH}_4)\text{SO}_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$

CAS: 7784-26-1 UN: N.A. Calidad: Técnica.

Descripción: Cristales incoloros a rojizo de sabor fuertemente astringente, soluble en agua y glicerina

MANEJO Y APLICACIÓN

Clarificación del agua. En la agroindustria del banano para lavado de látex y aumentar el tiempo de la fruta

sin madurar. Astringente. Farmacéutico. Cuero y tintorería como mordiente. Encolado de papel.

PRESENTACION X 1 KG

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 62. (GASTROZOLE) PROVET



Laboratorio:



LABORATORIOS PROVET S. A.

Autopista Medellín Km 7 Cost. Occidental Parque Ind. CELTA

Teléfono: +(571)2259110

Fax: +(571)2299102

Mail: provet@laboratoriosprovet.com.co

Sitio web: www.laboratoriosprovet.com

Uso terapéutico: ANTIACIDO

Principio Activo: OMEPAZOL

Especies:



Descripción:

GASTROZOLE es un antiácido y antiulceroso

Composición	Contenido
Omeprazol sódico	2.4 g
Excipientes csp	6.4 g

- **ACCIÓN:** Antiácido, antiulceroso
- **INDICACIONES:** **GASTROZOLE EQ** está indicado para el tratamiento y prevención del síndrome de úlcera gástrica en caballos y potros mayores a 4 semanas de edad. Tratamiento de esofagitis, gastritis erosiva, úlceras gastroduodenales y gastritis causadas por drogas ulcerogénicas.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **DOSIS:** Tratamiento de úlceras gástricas, administrar **GASTROZOLE EQ** a la dosis de 4mg/kg de peso, una vez al día durante 28 días consecutivos. En la práctica cada marca en el émbolo dosificador sirve para tratar 100 kg de peso vivo. Prevención y reincidencia de las úlceras: continuar con el tratamiento por 28 días adicionales, a la dosis de 2 mg/kg de peso, una vez al día. En la práctica cada marca en el émbolo dosificador sirve para tratar 200 kg de peso vivo. Se recomienda la administración en ayuno. Gradúe el anillo de la jeringa a la dosis a suministrar. Abra el anillo, deslicelo a lo largo de la barra del émbolo, gire el anillo 1/4 y asegure que quede cerrado. Asegure que el animal degluta el producto. Se indica tratamiento durante 4 semana vía oral.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No usar el producto en caballos destinados para consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECUACIONES:** Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase en un lugar seco y fresco, protegido de la luz y a temperatura inferior a 30°C.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Pasta oral
- **PRESENTACIÓN:** Jeringa plástica por 6.4 gr. Caja por 7 jeringas cada una por 6.4 gr.
- **REGISTRO:** 8847 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 63. (MELOXIC 2%) PROVET



Laboratorio:



LABORATORIOS PROVET S. A.

Autopista Medellín Km 7 Cost. Occidental Parque Ind. CELTA

Teléfono: +(571)2259110

Fax: +(571)2299102

Mail: provét@laboratoriosprovét.com.co

Sitio web: www.laboratoriosprovét.com

Uso terapéutico: ANTIINFLAMATORIO

Principio Activo: MELOXICAM

Descripción:

MELOXIC 2% es un Antiinflamatorio, analgésico y antipirético

Composición	Por cada ml
Meloxicam	20 mg
Excipientes	1 ml

- **ACCIÓN:** Antiinflamatorio, analgésico y antipirético
- **INDICACIONES:** Equinos: Como Analgésico y antiinflamatorio en: Trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos Reducción del dolor pre y postoperatorio, tras cirugía ortopédica y de tejidos blandos. Tratamiento del dolor asociado con cólico equino*. Bovinos: Como Analgésico y antiinflamatorio en: Trastornos músculo-esqueléticos.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Reducción del dolor pre y postoperatorio, tras procedimientos quirúrgicos.

Tratamiento del dolor y la inflamación asociada con:

Infección respiratoria aguda*

Mastitis aguda*

Diarrea en animales jóvenes o adultos*

Porcinos: Como Analgésico y antiinflamatorio en:

Trastornos músculo-esqueléticos (Cojeras).

Reducción del dolor pre y postoperatorio, tras procedimientos quirúrgicos.

Tratamiento del dolor y la inflamación asociada con el síndrome de Mastitis-

Metritis-Agalactia.*

Síndrome de emaciación postdestete*.

*El tratamiento de estas patologías, debe estar acompañado de la respectiva terapia prescrita por el Médico Veterinario.

El meloxicam es un fármaco antiinflamatorio no esteroide (AINE) que actúa inhibiendo la acción de la enzima ciclooxigenasa 2 (COX-2), responsable de la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos responsables del dolor, la inflamación y la fiebre; ejerciendo de este modo efectos antiinflamatorios, analgésicos, antiexudativos y antipiréticos. Se puede emplear por varios días. No lesiona la mucosa gástrica, ni el riñón. No interviene en procesos de coagulación. Es seguro en la preanestesia.

- **DOSIS:** Equinos: Aplicar por vía intravenosa, una dosis única de 0,6 mg/Kg de peso, equivalente a 3,0 mL/100Kg. En caso de ser necesario, se puede administrar una segunda dosis, después de 24 horas. Bovinos: Aplicar por vía intravenosa o subcutánea, una dosis única de 0,5 mg/Kg de peso, equivalente a 2,5 mL/100Kg. El tratamiento puede repetirse cada 24 horas durante 3 a 5 días. Cerdos: Aplicar por vía intramuscular, una dosis única de 0,4 mg/Kg de peso, equivalente a 2,0 mL/100Kg. En caso de ser necesario, se puede administrar una segunda dosis, después de 24 horas. Otras indicaciones o duración del tratamiento a criterio del Médico Veterinario.
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano, hasta 15 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 5 días después de finalizado el mismo, no es apta para el consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES:** No administrar a equinos de edad inferior a 6 semanas. En caso de que se produzcan efectos secundarios, se debe interrumpir el tratamiento. Evitar su uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos ya que existe un riesgo potencial de aumentar la toxicidad renal. No administrar con otros AINEs o glucocorticoides.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 30 y 50 ml.
- **REGISTRO:** 7114 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 64. (MELOXIC TABLETAS) PROVET



Laboratorio:



LABORATORIOS PROVET S. A.

Autopista Medellín Km 7 Cost. Occidental Parque Ind. CELTA

Teléfono: +(571)2259110

Fax: +(571)2299102

Mail: provet@laboratoriosprovet.com.co

Sitio web: www.laboratoriosprovet.com

Uso terapéutico: ANTIINFLAMATORIO

Principio Activo: MELOXICAM

Especies:



Descripción:

MELOXIC TABLETAS es un Antiinflamatorio, analgésico y antipirético

Composición	Por cada tableta
Meloxicam	2 mg
Excipientes, csp	1 tableta

- **ACCIÓN:** Antiinflamatorio, analgésico y antipirético
- **INDICACIONES:** En perros, Como analgésico, antiinflamatorio y antipirético en: Trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos: Displasia de cadera, artritis, osteoartrosis, discoespondilitis. Reducción del dolor pre y post-operatorio, tras cirugía ortopédica y de tejidos blandos: Ovariohisterectomías, castraciones, ablación de conducto auditivo

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

externo, etc.
Procedimientos diagnósticos que generen dolor: Toracocentesis,
Amniocentesis, etc.

El meloxicam es un fármaco antiinflamatorio no esteroide (AINE) COX-2 preferencial, enzima que induce la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos responsables del dolor, la inflamación y la fiebre; ejerciendo de este modo efectos antiinflamatorios, analgésicos, antiexudativos y antipiréticos. Se puede emplear por varios días. No lesiona la mucosa gástrica, ni el riñón. No interviene en procesos de coagulación. Es seguro en la preanestesia.

- **DOSIS:** Perros: Trastornos músculo-esqueléticos: Suministrar por vía oral, una dosis única de 0,2 mg/Kg de peso, equivalente a 1 Tableta/10Kg. Reducción del dolor postoperatorio durante 20 o más horas: Antes de la cirugía (por ejemplo en la inducción de la anestesia), suministrar por vía oral, una dosis única de 0,2 mg/Kg de peso, equivalente a 1 Tableta/10Kg. NOTA: Como continuación del tratamiento en perros (a partir del segundo día), la dosis a emplear es 0.1 mg / Kg, equivalente a ½ Tableta / 10 Kg, cada 24 horas, durante 5 a 7 días. Otra indicación o duración del tratamiento a criterio del Médico Veterinario
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES:** En caso de que se produzcan efectos secundarios, se debe interrumpir el tratamiento. Evitar su uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos ya que existe un riesgo potencial de aumentar la toxicidad renal. No administrar con otros AINEs o glucocorticoides. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Tableta oral
- **PRESENTACIÓN:** Blister por 10 tabletas.
- **REGISTRO:** 7568 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 65. (PENTRILAND X 10 UI) VETERLAND



Laboratorio:



LABORATORIOS VETERLAND LTDA

Cr. 19 B 168 - 16 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)6789851

Fax: +(571)6789830

Mail: contacto@laboratoriosveterland.com

Sitio web: www.laboratoriosveterland.com

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: PENICILINA PROCAINICA, PENICILINA BENZATINICA, PENICILINA SODICA

Especies:



Descripción:

PENTRILAND R.L.A. es una antibiótico bactericida de rápida, mediana y larga acción

Composición	Contenido
Penicilina G benzatínica	125.000 UI
Penicilina G procaínica	93.750 UI
Penicilina G sódica	93.750 UI

- **ACCIÓN:** Antibiótico

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **INDICACIONES:** Pentriland® R.L.A. está indicado en el tratamiento parenteral de las enfermedades infecciosas de los bovinos, equinos, porcinos y caninos, ocasionadas por gérmenes sensibles a la Penicilina, tales como: Streptococosis Erisipela, Estafilococosis, Nefritis, Neumonía, Pielonefritis, Adenitis, Poliartritis, Mastitis, Actinomicosis, Infecciones cutáneas, Actinobacilosis, Pododermatitis, Necrobacilosis, Carbón bacteriano (antrax), Enterotoxemia, Carbón sintomático, Hemoglobinuria bacilar, Edema maligno, Listeriosis, Leptospirosis, Tétanos, Procesos piógenos, Metritis.
- **DOSIS:** Pentriland® R.L.A. debe administrarse siempre por vía intramuscular profunda. (nunca endovenosa ni subcutánea). En los bovinos y equinos, el sitio recomendado para la inyección es la tabla del cuello, o en la grupa; en las demás especies en la pierna o en el jamón. Deben usarse jeringas y agujas estériles, previamente hervidas. No desinfectar las jeringas con alcohol ya que puede alterar parcialmente la actividad de la Penicilina. Dosis: La Penicilina es el antibiótico con mayor margen de seguridad en su dosificación, debido a su acción selectiva sobre la pared bacteriana. (La célula animal carece de pared, por lo cual, la Penicilina respeta su integridad). La dosificación de la Penicilina G Benzatínica puede oscilar entre 7.000 y 22.000 U.I./kg de peso vivo en una sola dosis para 7 días, mientras que las Penicilinas G Sódica y G Procaínica pueden ser dosificadas en un rango de 10.000 y 22.000 U.I./kg de peso vivo cada 12 y 24 horas respectivamente. Aplicar Pentriland® R.L.A. vía intramuscular una sola vez de 1 a 2 mL por cada 15 kg de peso vivo.
En la práctica se recomienda aplicar Pentriland® R. L.A. en una sola dosis así:
Especies mayores:
Animales que pesen entre 100 y 225 kg: una ampolla de Pentriland® R.L.A. 3.75 (12 mL)
Animales que pesen entre 200 y 450 kg: una ampolla de Pentriland® R.L.A. 7.5 (24 mL)
Animales que pesen entre 267 y 600 kg: una ampolla de Pentriland® R.L.A. 10.0 (32 mL)
Animales de mas de 600 kg: ajustar la dosificación.
Especies menores:
Aplicar una inyección de 1 a 2 mL por cada 15 kg de peso vivo. En todos los casos, éstas dosis y la frecuencia de la aplicación pueden ser aumentadas a criterio del Médico Veterinario, según la severidad de la infección y la especie tratada.
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 6 días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES:** Exclusivamente para inyección intramuscular profunda. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo prescripción del Médico Veterinario. Mayor información a solicitud del Médico Veterinario
- **MODO DE APLICACIÓN:** Polvo para reconstituír

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **PRESENTACIÓN:** Pentriland*R.L.A. se presenta en forma de polvo para reconstituir en frasco ampolla de vidrio siliconado con tapón y agrafe. La silicona evita que la Penicilina se adhiera al vidrio, permitiendo extraer todo el contenido con mayor facilidad. Pentriland*R.L.A. 3.75: Frasco ampolla con 3.750.000 U.I. de Penicilina y 10 mL de diluyente, que producen 12 mL de suspensión. Pentriland*R.L.A. 7.5: Frasco ampolla con 7.500.000 U.I. de Penicilina y 20 mL de diluyente, que producen 24 mL de suspensión. Pentriland*R.L.A. 10.0: Frasco ampolla con 10.000.000 U.I. de Penicilina y 27 mL de diluyente, que producen 32 mL de suspensión. Forma de preparación: Agregue mediante aguja hipodérmica el diluyente que acompaña al frasco de Pentriland*R.L.A., agite el frasco mientras se adiciona el diluyente y antes de extraer su contenido introduzca un poco de aire en el frasco para facilitar la extracción de la suspensión. Una vez reconstituido, Pentriland*R.L.A. se conserva estable por una semana bajo refrigeración.
- **REGISTRO:** 2513 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 66. (DERMOSYN) LAB. VIRBAC



Laboratorio:



VIRBAC COLOMBIA LTDA

Carrera 54 76 20 Bogotá Colombia

Teléfono: (+571)2252100 018000122100

Mail: clientescolombia@virbac.com.mx

Sitio web: <http://www.virbac.co/contactenos>

Uso terapéutico: ANTISEPTICO / DESINFECTANTE

Principio Activo: GENTAMICINA, DEXAMETASONA, KETOCONAZOL

Especies:



Descripción:

DERMOSYN es una loción dermatológica

Composición	Contenido
Ketoconazol USP	10 mg
Gentamicina base	3 mg
Dexametasona base	0.5 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Antibiótico, antiinflamatoria, antimicótica

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **INDICACIONES:** Acción tópica polivalente: bactericida, fungicida y antiinflamatoria, recomendado para afecciones cutáneas como: Prurito, eczema, dermatitis alérgicas, pénfigo, dermatofitosis, excoiaciones, úlceras, intertrigo, alopecia areata, onicomiosis, otitis externa y todo tipo de afecciones dermatoides de origen bacteriano y micótico producidas por gérmenes como: Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Aerobacter sp., Klebsiella sp., Shigella sp., E. coli, Trycophyton verrucosum, T. mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Candida albicans.
- **DOSIS:** Distribuya la solución sobre el área afectada asegurando un buen contacto; se puede aplicar por varios días hasta obtener mejoría y resolución de los síntomas.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Venta bajo formula del medico veterinario. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Loción
- **PRESENTACIÓN:** Frasco dispensador por 50 y por 100 mL.
- **REGISTRO:** 3553 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 67. (EMIVEM 100) LAB. VM



EMIVEM 100 L.A.

Frascos ámbar por 10, 20, 50, 100, 250 y 500 mL.

CLASE DE PRODUCTO: Antibiótico de Amplio Espectro

COMPOSICION: Cada mL contiene: Oxitetraciclina Clorhidrato 100 mg, Excipientes c.s.p. 1mL.

ALMACENAMIENTO: Consérvese en un lugar fresco y seco.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular, subcutánea, vaginal e intrauterina. Dosis recomendada: 0.5 a 1 mL por cada 10 Kg de peso. En caso de anaplasmosis duplicar la dosis. Repetir cada 36 horas o seguir instrucciones del médico veterinario. Para lavados vaginales o intrauterinos utilizar 25 mL disueltos en 100 mL de agua destilada tibia. Aves: Intramuscular en la pechuga a razón de 1 mL por cada 2 Kg de peso.

INDICACION

Antibiótico de amplio espectro indicado en Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos y aves para el tratamiento de infecciones causadas por: Anaplasma sp, Rickettsia sp, Clostridium sp, Streptococcus sp, Escherichia coli, Campylobacter sp, Pasteurella multocida, Leptospira sp, Listeria sp y Haemophilus sp.

ADVERTENCIAS

Administración mediante prescripción del médico veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.

REGISTRO ICA 3158 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 68. (BRAVECTO 20-40) MSD SALUD ANIMAL MERCK & CO INC



Uso terapéutico: ECTOPARASITICIDA

Principio Activo: FLURALANER

Especies:



Descripción:

BRAVECTO es un pulguicida y garrapaticida

Composición	Tableta
Fluralaner	136.4 mg

- **ACCIÓN:** Pulguicida y garrapaticida
- **INDICACIONES:** Bravecto mata las pulgas adultas y está indicado para el tratamiento y la prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*) y para el tratamiento y control de infestaciones por garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) durante 12 semanas en perros y cachorros a partir de los 2 meses de edad, que pesen 2 kilogramos o más. Fluralaner es un potente inhibidor del sistema nervioso de los artrópodos que actúa como antagonista de los canales de sodio. Fluralaner posee una eficacia significativamente superior, en relación con otras moléculas como el Fipronil. 3 veces más protección contra pulgas y garrapatas. Protección de larga duración por 12 semanas frente a los tratamientos convencionales de 4 semanas.
- **DOSIS:** Bravecto debe administrarse por vía oral en una sola dosis cada 12 semanas siguiendo la dosificación según los rangos de peso. Bravecto puede administrarse directamente o con la comida. Cada tableta masticable ha sido formulada para obtener una dosis mínima de 11.4 mg/lb (25 mg/kg) de peso vivo. El tratamiento con Bravecto puede comenzar en cualquier momento del año y continuar todo el año sin interrupción.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee
- **CONTRAINDICACIONES:** Contraindicado para uso en seres humanos. Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Mantenga el producto en su envase original hasta usarlo, para evitar que los niños tengan acceso directo a él. No coma, no beba, ni fume mientras manipula el producto. Inmediatamente después de usar el producto lávese las manos con abundante agua y jabón. Es seguro en hembras gestantes o lactantes. Seguro en perros de raza con deficiencia del gen MRD1. Este medicamento solo puede ser administrado por veterinarios autorizados o bajo sus órdenes.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Tableta masticables saborizadas a hígado.
- **PRESENTACIÓN:** 2 kg a 4.5 kg 1 Bravecto de 112.5 mg. >4.5 kg a 10 kg 1 Bravecto de 250 mg. >10 kg a 20 kg 1 Bravecto de 500 mg. >20 kg a 40 kg 1 Bravecto de 1000 mg. >40 kg a 56 kg 1 Bravecto de 1400 mg
- **REGISTRO:** 9561 MV

REGISTRO ICA No 9561 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 69. (GENTAX-100) INVET



Laboratorio:



INVET S. A.

Autopista Medellin Km 2.5 Vía Bogotá Siberia entrada parcela Bod. I-138

Teléfono: +(571)8985140

Fax: +(57)3208498092

Mail: ventas@invetcolombia.com

Sitio web: www.invetcolombia.com

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: GENTAMICINA

Especies:



Descripción:

GENTAX-100 es un antibiótico

Composición	Contenido
Gentamicina (como sulfato)	100 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Antibiótico aminoglicósido bactericida
- **INDICACIONES:** Perros: Infecciones del tracto urinario: cistitis y nefritis. Infecciones del tracto respiratorio: tonsilitis, neumonía y traqueobronquitis. Piel y tejidos blandos: piodermatitis, heridas, laceraciones y peritonitis

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Gatos: Infecciones del tracto urinario: cistitis y nefritis. Piel y tejidos blandos: heridas, laceraciones y peritonitis.

Yeguas y Vacas: Infecciones bacterianas del útero (metritis) causadas por bacterias sensibles a la Gentamicina.

Vacas: Infecciones bacterianas de la glándula mamaria y del útero (metritis), causadas por bacterias sensibles a la Gentamicina.

- **DOSIS:** Perros y Gatos: Inyección intramuscular o subcutánea de 5 mg de Gentamicina por kg de peso, 2 veces el primer día luego una vez diaria por 4 a 5 días. La duración del tratamiento depende de los resultados y criterio del Médico Veterinario. La alcalinización de la orina puede ayudar al afecto terapéutico.

Yeguas y Vacas: Infusión intrauterina de 10 a 25 ml de GENTAX-100, diluida en 200 a 500 ml de solución salina estéril por 3 a 5 días, durante la época del celo en yeguas. La dosis y duración del tratamiento dependerán de la severidad y cronicidad de la metritis y del criterio del Médico Veterinario.

Mastitis en Vacas: Administrar con sonda intramamaria a razón de 200 mg de Gentamicina base por cuarto. En la práctica use 2 ml de GENTAX-100 en 18 ml de agua destilada o solución salina estéril.

- **TIEMPO DE RETIRO:** La leche del cuarto tratado no debe suministrarse para consumo humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento.
- **CONTRAINDICACIONES:** Uso veterinario, venta bajo fórmula médica del médico veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Caja de 6 frascos por 20 ml
- **REGISTRO:** 2321 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 70. (OFTALMOSYN) VIRBAC



Laboratorio:



VIRBAC COLOMBIA LTDA

Carrera 54 76 20 Bogotá Colombia

Teléfono: (+571)2252100 018000122100

Mail: clientescolombia@virbac.com.mx

Sitio web: <http://www.virbac.co/contactenos>

Uso terapéutico: COLIRIO

Principio Activo: GENTAMICINA, DEXAMETASONA, LIDOCAINA

Especies:



Descripción:

OFTALMOSYN es una solución ótico oftálmica

Composición	Contenido
Gentamicina sulfato	3 mg
Dexametasona fosfato sódico	1 mg
Lidocaína clorhidrato	5 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Solución ótico – oftálmica

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **INDICACIONES:** Indicado en el tratamiento de afecciones de ojos y oídos como: Blefaritis, conjuntivitis, queratitis y otitis externa y media en donde estén involucrados gérmenes sensibles a la Gentamicina, incluso *Pseudomona sp.*
- **DOSIS:** Instilar en el ojo afectado 2 a 3 gotas, 2 o 3 veces por día. En casos de otitis administrar en el oído 4 a 5 gotas, 2 ó 3 veces por día.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES:** No utilizar en presencia de úlceras corneales. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución
- **PRESENTACIÓN:** Frasco gotero por 10 mL.
- **REGISTRO:** 3098 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 71. (BORGAL) MSD SALUD ANIMAL MERCK & CO INC



Laboratorio:



MSD Salud Animal MERCK & CO INC

Av Kr 68 17 64 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(57)(1)5925092

Fax: +(571)4128620

Mail: infoclientes@merck.com

Sitio web: www.msd-salud-animal.com.co

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: TRIMETOPRIM, SULFADOXINA

Especies:



Descripción:

BORGAL 24% es un antimicrobiano

Composición	Contenido
Sulfadoxina	200 mg
Trimetoprim	40 mg
Excipientes csp	1 ml

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **ACCIÓN:** Antibiótico
- **INDICACIONES:** Para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por *Haemophilus* spp, *Pasteurella* spp, *Escherichia coli*, *Fusobacterium* spp, *Shigella* spp, *Proteus* spp, *Actinobacillus* spp, *Aerobacter* spp, *Campylobacter* spp, *Klebsiella* spp, *Corynebacterium* spp, *Streptococcus* spp y *Bordetella* spp.
- **DOSIS:** La dosis corresponde al 5 mg por kilo, lo que equivale a administrar: Animales adultos: 6 ml por cada 100 Kg. Animales medianos: 3 ml por cada 50 Kg. Animales pequeños: 1.5 ml por cada 25 Kg. Bovinos y Porcinos: Intramuscular, Intravenosa y Subcutánea. Equinos: De preferencia Intravenosa o Intramuscular. Ovinos: Intravenosa e Intramuscular.
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento. La Leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 30 y 100 ml
- **REGISTRO:** 1357 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 72. (PILERAN INYECTABLE) HOLLIDAY SCOTT SA



Laboratorio:



HOLLIDAY SCOTT S. A.

Int. Neyer 924 - (B1643GAT) Beccar - Buenos Aires - Argentina

Teléfono: (5411) 4732-0222

Mail: info@holliday.com.ar

Sitio web: www.holliday-scott.com

Uso terapéutico: ANTIEMETICO

Principio Activo: METOCLOPRAMIDA

Especies:



Descripción:

PILERAN INYECTABLE es un antiemético gastrocinético

Composición	Contenido
Metoclopramida clorhidrato	500 mg
Vehículo csp	100 ml

- **ACCIÓN:** Antiemético, gastrocinético
- **INDICACIONES:** Vómitos de diversas etiologías, náuseas, vaciado gástrico, esofagitis por reflujo, preparación para estudios radiológicos del tubo digestivo. Potente antiemético de acción central y periférica con efecto gastrocinético a nivel gastropiloro duodenoyeyunal.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **DOSIS:** Perros y gatos: Administrar 1 ml cada 10 kg cada 8 horas por vía subcutánea (SC), intramuscular (IM) o endovenosa (EV) lenta. Infusión continua endovenosa: 1-2 mg/kg (1 ml/2,5-5 kg/24 hs).
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Presencia de cuerpos extraños lacerantes a nivel gastrointestinal, obstrucción mecánica, perforación digestiva, no debe utilizarse conjuntamente con anticolinérgicos u opiáceos. No es recomendable su uso en estados tempranos de preñez. Los efectos colaterales son dosis dependientes e incluyen nerviosismo, hiperexcitabilidad, inquietud, depresión y constipación en caso de tratamiento prolongado. Proteger la Metoclopramida de la luz cubriendo al sachet de la solución parenteral.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 50 ml
- **REGISTRO:** DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 73. (ALERVEC) VECOL



Laboratorio:



EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS " VECOL"

Av. El Dorado 82 - 93 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)4254800

Fax: +(571)4254835

Mail: vecol@vecol.com.co

Sitio web: www.vecol.com.co

Uso terapéutico: ANTIHISTAMINICO

Principio Activo: DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO

Especies:



Descripción:

ALERVEC es un antihistamínico y antialérgico

Composición	Por cada ml
Clorhidrato de difenhidramina	25 mg
Excipientes csp	1 ml

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **ACCIÓN:** Antihistamínico.
- **INDICACIONES:** Se recomienda en todos los casos de reacciones alérgicas, shock anafiláctico, laminitis, otitis eczematosa en bovinos y equinos, dermatitis, urticaria y conjuntivitis en caninos y felinos.
- **DOSIS:** Para Bovinos y Equinos es de 1 mg/ kg de peso vivo. Bovinos y equinos 1 ml por cada 25 kg de peso vivo. Para Caninos y Felinos es de 0,5 mg / kg de peso vivo. Caninos y felinos 0,2 ml por cada 10 kg de peso vivo. Aplicar por vía intramuscular o intravenosa
- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee
- **CONTRAINDICACIONES:** Mantenerse en un lugar fresco y seco. Evite las bajas temperaturas, no almacenar con alimentos
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frascos de vidrio por 10 y 50 ml
- **REGISTRO:** 1907 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 74. (DOMOSYN SOLUCION) VIRBAC



Laboratorio:



VIRBAC COLOMBIA LTDA

Carrera 54 76 20 Bogotá Colombia

Teléfono: (+571)2252100 018000122100

Mail: clientescolombia@virbac.com.mx

Sitio web: <http://www.virbac.co/contactenos>

Uso terapéutico: ANTIINFLAMATORIO

Principio Activo: DIMETIL SULFOXIDO

Especies:



Descripción:

DOMOSYN SOLUCION es antiinflamatorio, analgésico y cicatrizante

Composición	Contenido
Dimetilsulfóxido	90 mL
Excipientes csp	100 mL

- **ACCIÓN:** Antiinflamatorio, analgésico, cicatrizante
- **INDICACIONES:** DOMOSYN SOLUCIÓN se recomienda para el tratamiento y control del dolor y la inflamación de origen no infeccioso, asociados con algunas condiciones patológicas músculo esqueléticas localizadas agudas, crónicas o recurrentes. Útil además como cicatrizante; evita adherencias post-quirúrgicas.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **DOSIS:** Tópica: Caninos y Felinos: Administrar 3 a 4 veces al día en el área afectada sin excederse de 20 mL por día. No prolongar la terapia más de 14 días.
Equinos y Bovinos: Administrar 1 a 3 veces al día en el área afectada sin excederse de 100 mL x día. No prolongar la terapia por más de 30 días.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee
- **CONTRAINDICACIONES:** Al hacer las aplicaciones es aconsejable usar guantes sintéticos. Durante el tratamiento con **DOMOSYN SOLUCIÓN** está contraindicado su uso con otros medicamentos tópicos en la misma zona. No debe ser usado antes ni después del tratamiento con inhibidores de la colinesterasa. No usar en el primer tercio de la gestación. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 50 y 120 ml
- **REGISTRO:** 3462 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 75. (BELAMYL R) ELANCO



Laboratorio:



ELI LILLY INTERAMERICA, INC

Transversal 18 No. 96-41 Piso 6 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)6024200

Fax: +(571)6024259

Sitio web: www.elanco.com

Uso terapéutico: **VITAMINICO**

Principio Activo: **VITAMINA B1, B2, B3, B12**

Especies:



Descripción:

BELAMYL-R es un vitamínico del complejo B

Composición	Contenido
Tiamina	10 mg
Riboflavina	3 mg
Nicotinamida	100 mg

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Vitamina B12	50 mcg
Excipientes csp	1 ml

- ACCIÓN: Vitamínico
- INDICACIONES: En bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos para el tratamiento de anemias normocíticas y macrocíticas o megaloblásticas y normocrómicas. BELAMYL-R®, a través de sus componentes, es esencial para la formación de coenzimas en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas o aminoácidos, en la síntesis de D.N.A. y de otras moléculas, en la maduración de los glóbulos rojos y en el funcionamiento de la célula nerviosa.
- DOSIS: Bovinos y equinos: 1mL por cada 50 kilogramos de peso vivo. Porcinos y ovinos: 1mL por cada 25 kilogramos de peso vivo. Caninos: 1mL por cada 10 kilogramos de peso vivo. Diario o en días alternos, hasta 5 - 10 dosis (20 dosis en casos graves).
- TIEMPO DE RETIRO: No posee
- CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: Manténgase fuera del alcance de los niños. Uso veterinario.
- MODO DE APLICACIÓN: Solución inyectable
- PRESENTACIÓN: Frasco por 10, 30, 50, 100, 250 y 500 mL y 2 frascos x 500 mL.
- REGISTRO: 343 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 76. (FENNEL MK) MK TECNOQUIMICAS



Laboratorio:



MK TECNOQUIMICAS S. A.

Cl. 23 7 - 39 Cali - Colombia

Teléfono: (572)8825555

Fax: (572)8830193

Mail: eagroveterinariabog@tecnoquimicas.com

Sitio web: www.tecnoquimicas.com

Uso terapéutico: **ANTIHELMINTICO**

Principio Activo: **FENBENDAZOL**

Species:



Descripción:

FENNEL MK es un antiparasitario interno

Composición	Contenido por ml
Fenbendazol	100 mg

- ACCIÓN: Antiparasitario
- INDICACIONES: Tratamiento y control de los parásitos gastrointestinales, pulmonares y cestodos
Bovinos ovinos y caprinos:

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Haemonchus sp, Ostertagia sp, Trichostrongylus sp, Cooperia sp, Bunostomum sp, Trichuris sp, Oesophagostomum sp, Nematodirus sp, Chabertia sp, Dictyocaulus sp, Moniezia sp.

Equinos: Strongylus sp, Strongyloides sp, Oxiurus sp y Parascaris.

- DOSIS: Bovinos ovinos y caprinos: 5mg por kilo de peso. Corresponden a 5 mL. Por 100Kg de peso. Equinos: 7.5mg por kilo. Corresponden a 15 ml por 200 kilos de peso. Vía oral
- TIEMPO DE RETIRO: No tiene tiempo de retiro en leche. Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después del tratamiento.
- CONTRAINDICACIONES: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños
- MODO DE APLICACIÓN: Suspensión oral
- PRESENTACIÓN: Jeringa por 25 ml, Envases plásticos por 100, 500 y 1000 mL.
- REGISTRO: 5711 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 77. (AGUJAS DESECHABLES 16 X 1 1/2) RYMCO



Descripción

ESPECIFICACIONES GENERALES: Aguja Hipodérmica hueca esterilizada, desechable.

COMPONENTES: acero inoxidable.

USOS O MODO DE EMPLEO: Utilizada con una jeringa para inyectar sustancias en el cuerpo. También pueden ser utilizados para tomar muestras de líquidos y tejidos del cuerpo.

PRECAUCIONES: Manipular con precaución, no dejar al alcance de los niños, después de ser usada depositar en un guardián.

UNIDAD DE VENTA: Caja.

REGISTRO INVIMA: 2009DM-0004987

LABORATORIO: RYMCO

PAIS ORIGEN: COLOMBIA

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 78. (ESPARADRAPO HOSPITALARIO) ZIBOJECT



INVIMA Consulta Datos de Productos ? X

Registro ☒ Clasificación ATC ☐

Grupo: MEDICO QUIRURGICOS ▼ Producto: ESPARADRAPO

☒ Por nombre del Producto ☐ Por Registro Sanitario ☐ Por Principio Activo Expediente:

Ingrese parte del nombre de producto (mínimo 3 caracteres)

Buscar

Nueva Consulta

Para ver información detallada del producto, haga click en el número de expediente.

[<< Atras](#)

Datos Generales del Producto

Expediente	20044378	Nombre producto	ESPARADRAPO ZIBOJECT				
Registro Sanitario	INVIMA 2012DM-0008470	Vencimiento	2022/02/15	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	PRODUCTO NO ESTERIL						
Marcas	ZIBOJECT						

Datos de Interés

Vida Útil	0 Años	Miembros Comprometidos	PIEL
Usos	PROTECCION DE HERIDAS, INMOVILIZACION DE PACIENTES, FIJACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS, FIJACION DE APOSITOS, LA CINTA QUIRURGICA ADHESIVA ES PARA USO HOSPITALARIO O CUIDADO DE HERIDAS, ANTES DE USA LAVAR BIEN LA PIEL Y LIMPIAR LA SUPERFICIE, HACER CORTE DE ACUERDO A LA LONGITUD NECESARIA.	Riesgo	

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
CILINDRO DE PAPEL Y CAJA DE CARTON / BLISTER 1/2 IN X 5 YDS, 1 IN X 5 YDS, CARRETO: 1/2 IN X 1 YD, 1 IN X 1 YD , 2 IN X 1 YD, 1/2 IN X 5 YDS, 1 IN X 5 YDS, 2 IN X 5 YDS, 3 IN X 5 YDS, 4 IN X 5 YDS, 5 IN X 5 YDS,
CAJA PLEGADIZA: 1/2 IN X 1 YD, 1 IN X 1 YD, TUBO HOSPITALARIO: SURTIDO 1 CONTIENE: 1 ROLLO DE 1 IN X 10 YDS, 2 ROLLOS DE 2 IN X 10 YDS, 1 ROLLO DE 3 IN X 10 YDS, 1 ROLLO DE 4 IN X 10 YDS;
SURTIDO 2 CONTIENE: 12 ROLLOS DE 1 IN X 10 YDS; SURTIDO 3 CONTIENE: 6 ROLLOS 2 IN X 10 YDAS;
SURTIDO 4 CONTIENE: 4 ROLLOS DE 3 IN X 10 YDS; SURTIDO 5 CONTIENE: 3 ROLLOS DE 4 IN X 10 YDS.

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion
ACONDICIONADOR	ZIBOJECT S.A.S.	Calle 14 No. 25 - 44
FABRICANTE	JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD	1 GUOXIANG RD. WUJIN
IMPORTADOR	ZIBOJECT S.A.S.	Calle 14 No. 25 - 44
TITULAR REGISTRO SANITARIO	ZIBOJECT S.A.S.	Calle 14 No. 25 - 44

[Imprimir](#) << [Atras](#)

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 79. (CLORDENT) VIRBAC



Laboratorio:



VIRBAC COLOMBIA LTDA

Carrera 54 76 20 Bogotá Colombia

Teléfono: (+571)2252100 018000122100

Mail: clientescolombia@virbac.com.mx

Sitio web: <http://www.virbac.co/contactenos>

Uso terapéutico: ANTISEPTICO / DESINFECTANTE

Principio Activo: CLORHEXIDINA

Especies:



Descripción:

CLORDENT es una solución oral antiséptica

Composición	Contenido
Clohexidina acetato	100 mg
Excipientes csp	100 ml

- **ACCIÓN:** Antiséptico oral
- **INDICACIONES:** Solución antiséptica oral para la higiene bucal de caninos y felinos. Evita el mal aliento y es coadyuvante en el tratamiento de

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

enfermedades bucofaríngeas como: faringitis, tonsilitis, gingivitis, estomatitis, periodontitis, heridas bucales y postoperatorias de cirugías de la cavidad bucal.

- **DOSIS:** Enjuague bucal: Sujete el animal e introduzca el aplicador entre las encías y la parte interna de la mejilla, deposite allí una pequeña cantidad de CLORDENT. realice un masaje sobre las encías con la mejilla asegurándose de frotar también los dientes. Repita el procedimiento en el lado opuesto. Cepillado dental: Vierta una pequeña cantidad de CLORDENT en un recipiente, humedezca el cepillo en la solución y proceda al cepillado, humedezca el cepillo tantas veces como sea necesario.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución oral
- **PRESENTACIÓN:** Frasco dispensador por 120 mL.
- **REGISTRO:** 3544 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 80. (BAXIDIN) BASIC FARM

Baxidin®

SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE

DESCRIPCIÓN

BAXIDIN es una solución antiséptica y desinfectante biodegradable a base de clorhexidina digluconato en un vehículo acuoso, lo que permite un uso seguro, pues no irrita, incluso al ser utilizado en mucosas o heridas abiertas.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución antiséptica contienen:

Clorhexidina digluconato 0,5g: La clorhexidina es un agente antimicrobiano perteneciente al grupo de las biguanidas. Su mecanismo de acción se debe a una disrupción de la pared celular, aumentando la permeabilidad y produciendo precipitación de las proteínas celulares, por lo que se considera de amplio espectro, ya que es efectivo contra bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, levaduras y virus. Debido a la propiedad que tiene de unirse a la queratina, presenta un efecto residual, con la gran ventaja que no se inactiva fácilmente en presencia de material orgánico y es menos irritante para la piel que los yodóforos. Es ideal para usar incluso sobre mucosas y heridas abiertas.

INDICACIONES

En caninos, gatos, bovinos, equinos y porcinos como antiséptico de uso externo e interno. Como desinfectante de instrumental quirúrgico y equipos de diagnóstico veterinario.

PRESENTACIONES

Frasco por 60 mL con válvula
Frasco por 120 mL con válvula
Frasco por 120 mL con tapa
Frasco por 300 mL con válvula tipo gatillo
Frasco por 1 litro
Garrafa por 4 litros



BENEFICIOS

- Gracias a su base acuosa, no irrita la piel.
- Efecto bactericida altamente efectivo aún en presencia de material orgánico, sangre, suero, pus o tejido necrótico.
- Se puede utilizar como antiséptico con seguridad y sin irritar, aún sobre mucosas, heridas y ulceraciones de la piel.

Reg. ICA No. 3392-DB
Reg. 2A-10523-AGROCALIDAD
Reg. CO34-15-01-3462
Reg. RF-5339-10 MIDA

Para mayor información acerca del producto remítase a la hoja de seguridad del producto o contacte al representante de ventas BASIC FARM.

Linea **Mascotas**

Basic Farm
Innovamos para tu beneficio

BASIC FARM - www.basicfarm.com - Atención al Cliente Tel: 346 1664 - Bogotá/ Colombia.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 81. (NEGUVON POLVO) BAYER



Laboratorio:



BAYER S.A.

Av. Américas 57 - 52 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)4142277

Fax: 4234070 EXT 4382

Sitio web: www.bayerandina.com

Uso terapéutico: ENDECTOPARASITICIDA

Principio Activo: TRICLORPHON, METRIFONATO

Especies:



Descripción:

NEGUVON POLVO es un antiparasitario de amplia acción para uso interno y externo

Composición	Contenido
Triclorphon	97 mg
Excipientes csp	1 g.

- **ACCIÓN:** Antiparasitario interno y externo
- **INDICACIONES:** Indicaciones: Aplicación externa: Contra Dermatobia hominis (nuche, ura, berne), sarna (no indicado en Argentina), piojos, pulgas, miasis o

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

gusaneras, piojo arador rojo de las aves, *Oestrus ovis*, *Melophagus ovinus* (falsa garrapata del ovino). En perros sólo es de uso externo. Aplicación interna: Contra parásitos gastrointestinales: *Haemonchus* sp., *Oesophagostomum* sp., *Ascaris* sp., *Cooperia* sp., *Ostertagia* sp., *Gasterophilus* sp., *Habronema* sp., *Trichostrongylus* sp.

- **DOSIS:** 1. Aplicación externa: Piojos, ácaros de la sarna, moscas y larvas (nuche, miasis): 1 sobre de 15 g en 1,5 litros de agua.

2. Aplicación interna: Parásitos gastrointestinales de bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos: 1 sobre de 15 g en 150 mL de agua. De esta solución administrar 5 mL por cada 10 Kg de peso vivo, vía oral. En Equinos, la dosis es de 3,5 mL de esta solución, por cada 10 Kg de peso. Información adicional en el inserto del producto.

- **TIEMPO DE RETIRO:** Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento. Tiempo de retiro en leche es de 0 días.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Precauciones: No se recomienda su uso en el último tercio de la gestación. No administrar en animales débiles o fatigados. Cuando se use en animales en producción de leche, debe hacerse después del ordeño. No asperjar contra el viento y usarropa de protección durante el proceso. No se almacene en casa de habitación. No permitir el contacto con alimentos. Este producto es tóxico para peces y abejas, no contaminar fuentes de agua o ríos. No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto. Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de la luz solar y a una temperatura inferior a 25°C. Antídoto: Sulfato de atropina al 1%: humanos: 0,2 mL (2 mg) por vía intramuscular. En animales: (0,25 mg/Kg) en la práctica 25 mL por 100 Kg de peso vivo o 2,5 mL por cada 10 Kg de peso vivo, por vía intramuscular. Observar los animales permanentemente, si persisten los síntomas repetir el tratamiento cada 12 horas por 2 ó 3 días.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Polvo
- **PRESENTACIÓN:** Frasco plástico por 200 g, Sobres por 15 g (Cartón por 50 sobres de 15 d cada uno), Tarro por 1 kg.
- **REGISTRO:** 348 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 82. (BRILLO SHAMPOO) PROVET



Laboratorio:



LABORATORIOS PROVET S. A.

Autopista Medellín Km 7 Cost. Occidental Parque Ind. CELTA

Teléfono: +(571)2259110

Fax: +(571)2299102

Mail: provét@laboratoriosprovét.com.co

Sitio web: www.laboratoriosprovét.com

Uso terapéutico: SHAMPOO ANTISEPTICO

Principio Activo: IRGASAN, TEXAPON, COMPERLAND, EUPERLAN, GLUCAMATE, GLUCQUAT

Especies:



Descripción:

BRILLO SHAMPOO es antiséptico y acondicionador

Composición	Contenido
Irgasán DP 300	0.5 g
Texapón	24 ml
Comperland KD	7 ml

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Euperlan	5 g
Glucamate doe	10 g
Glucquat 100	3 g
Excipientes csp	100 ml

- **ACCIÓN:** Shampoo, Antiséptico y Acondicionador, medicado, de acción desodorante bactericida y fungicida
- **INDICACIONES:** En animales domésticos proporciona limpieza, brillo y desinfección del pelaje; al igual que contribuye a la recuperación de infecciones leves de la piel. En ejemplares de exposición. Por sus excelentes propiedades también es utilizado para uso humano, especialmente en salones de belleza.

No altera el pH natural de la piel de las mascotas (pH 6,5 – 7,5); No reseca la piel y no produce caspa. Permite que no se enrede el pelo y por tanto sea fácil de cepillar, a la vez que le confiere un aspecto sedoso y brillante.

- **DOSIS:** Aplicar la cantidad requerida para generar espuma
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Shampoo
- **PRESENTACIÓN:** Dispensador por 50 sobres de 22 g. Frascos por 120, 250 y 500 ml. Garrafa por 2 litros
- **REGISTRO:** 2999 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 83. (SHAMPOO INSECTICIDA) CANAMOR



Coadyudante en el tratamiento de dermatitis bacterianas y fúngicas en perros y gatos de todas las razas. Propiedades antiinflamatorias que al ser usado sobre una piel irritada, disminuyen los signos asociados a la inflamación. Deliciosa y agradable Fragancia Buen efecto limpiador para baño corporal Proporciona suavidad e hidratación a la delicada piel de perros y gatos.

Características

- Principio activo (d-fenotrina) que elimina pulgas, piojos y garrapatas adultos que infestan a los perros
- Evita los signos de malestar general que tantas molestias causan en los perros y sus propietarios.
- Dejar actuar los jabones y champo de 5 a 10 minutos sobre la piel del animal para favorecer su acción específica ya sea antimicrobial, antimicótica, antiparasitaria.
- Mantenga buenos hábitos higiénicos en las mascotas y su medio ambiente, realice cada mes a mes y medio el baño de la mascota.
- Mantenga los productos en un lugar seco, fresco, protegido de la luz directa y adecuadamente cerrados.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- Seguir siempre las instrucciones de la etiqueta.
- Presentación frasco 230 ml.

REGISTRO ICA 6124 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 84. (KERACLEEN) INVET



Laboratorio:



INVET S. A.

Autopista Medellín Km 2.5 Vía Bogotá Siberia entrada parcela Bod. I-138

Teléfono: +(571)8985140

Fax: +(57)3208498092

Mail: ventas@invetcolombia.com

Sitio web: www.invetcolombia.com

Uso terapéutico: SHAMPOO ANTISEPTICO

Principio Activo: ACIDO SALICILICO, AZUFRE

Especies:



Descripción:

KERACLEEN es un shampoo medicado

Composición	Contenido
Ácido salicílico	2 g
Azufre	2 g
Excipientes csp	100 ml

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **ACCIÓN:** Queratolítico, queratoplástico, antipruriginoso y bacteriostático
- **INDICACIONES:** Shampoo queratolítico, queratoplástico y antiprurítico para el tratamiento de la seborrea y dermatitis pruriginosa en Perros. Disminuye en forma efectiva la formación de escamas.
- **DOSIS:** Aplicar 2 a 3 veces a la semana al iniciar la terapia, luego a intervalos según criterio del Medico Veterinario. Agitar el contenido del frasco antes de su aplicación. Aplicar el shampoo sobre el pelaje del animal y masajear hasta que una espuma suave se presente. Dejar actuar por 10 minutos y luego enjuagar a fondo; repetir si es necesario.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES:** Uso tópico únicamente para Perros. Evitar el contacto con los ojos y membranas mucosas. Suspender el uso del producto si la piel llega a irritarse o inflamarse.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Shampoo medicado
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 240 ml, caja dispensadora de 6 frascos por 240 ml
- **REGISTRO:** 5935 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 85. (ENERMAX) LAB. BUSSIE



Laboratorio:



LABORATORIOS BUSSIE S.A.

Av Calle 19 No 34-76 Bogotá - Colombia

Teléfono: (571) 3648060 018000111851

Sitio web: www.bussie.com.co

Uso terapéutico: VITAMINICO MINERAL

Principio Activo: ADENOSINTRIFOSFATO, ASPARTATO DE MAGNESIO, ASPARTATO DE POTASIO, VITAMINA B12

Especies:



Descripción:

ENERMAX es un Complejo vitamínico mineral con ATP

Composición	Contenido
Adenosín trifosfato (ATP)	0,1 g
Aspartato de magnesio	1,5 g
Aspartato de potasio	1,0 g

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Selenito de sodio	0,10 mg
Vitamina B12	0,05 g
Excipientes c.s.p	100 mL

- **ACCIÓN:** Antiinflamatorio
- **INDICACIONES:** **ENERMAX®** es un reconstituyente muscular en solución inyectable, es una combinación de ATP con Potasio, Magnesio, Sodio, Selenio y Vitamina B12, lista para usar, que puede ayudar a aumentar la capacidad de trabajo y resistencia a la fatiga en animales de trabajo. **ENERMAX®** En bovinos, equinos, ovinos, cerdos, perros y gatos para el tratamiento de miopatías de origen metabólico. Otras indicaciones a criterio del médico veterinario.
- **DOSIS:** Bovinos y equinos: 1 mL/20 Kg. Ovinos, cerdos y perros: 1 mL/10 Kg. Gatos: 1 mL/5 Kg.
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 96 horas después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Mantengase fuera del alcance de los niños. Mantener el producto en su envase y empaque original en lugar fresco y seco, a temperatura inferior a 30°C, protegido del sol y la luz. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frascos de 25 mL, 50 mL y 250 mL
- **REGISTRO:** 9345 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 86. (MIRRAPEL OLEOSO) LAB. COMANDINA



Laboratorio:



COMANDINA SAS

Calle 4B N° 27-189 Cali - Colombia

Teléfono: +(572) 3816930

Mail: info@comandinasa.com

Sitio web: www.mirrapel.com

Uso terapéutico: VITAMINICO MINERAL ACIDOS GRASOS

Principio Activo: VITAMINA A, D3, E, B6, BIOTINA, ZINC, SELENIO, COLINA, INOSITOL, OLEICO

Especies:



Descripción:

MIRRAPEL OLEOSO es un suplemento alimenticio

Composición	Contenido
Vitamina A	55.000 UI
Vitamina D3	10.000 UI
Vitamina E	120 UI
Piridoxina (B6)	30 mg

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Biotina	100 mcg
Zinc	120 mg
Selenio	150 mcg
Colina	240 mg
Inositol	150 mg
Acido oléico	21.000 mg
Acido linoléico	42.000 mg
Acido linolénico	5.000 mg
Acido araquidónico	mg
Acidos grasos esenciales	46%
Exipientes csp	100 ml

- **ACCIÓN:** Vitamínico, mineral y ácidos grasos
- **INDICACIONES:** Las deficiencias de ácidos grasos no saturados, o de las vitaminas y minerales presentes en Mirrapel Oleoso, pueden manifestarse con trastornos del pelo y la piel de los animales produciendo piel seca, pelo opaco y quebradizo. Controla la caída de pelo. **Mirrapel Oleoso**, por su contenido de ácidos grasos poliinsaturados Omega 3, Omega 6 y Omega 9, contribuye a cubrir las deficiencias de ellos en la alimentación y a mejorar la salud de las mascotas.
- **DOSIS:** Usa Mirrapel todos los días a partir de los 2 meses hasta su vejez. Administrar Mirrapel Oleoso una vez al día directamente por vía oral o mezclado con el alimento seco o húmedo, en las siguientes cantidades:

Perros: 1 mL por cada 4 kg de peso.

Hembras en Gestación o Lactancia: 1 mL por cada 3 kg de peso.

Gatos: 1 mL por cada 2 kg de peso.

Hembras en gestación o Lactancia: 4 mL por día.

Las cantidades totales pueden suministrarse en una sola vez o fraccionándolas a lo largo del día en dos o tres porciones y pueden ser modificadas a criterio del

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

médico veterinario. Duración del suministro: Mínimo de 2 a 3 meses continuos o según indique tu médico veterinario.

- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** El suministro de ácidos grasos puede tornar suave el pelo de perros de raza de pelo de alambre. Lo anterior debe tenerse en cuenta antes de iniciar su administración. Agitar antes de usar. Conservar el frasco bien tapado dentro de la caja plegadiza. No almacenar por encima de 30°C. No refrigerar. No congelar. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Uso veterinario.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Suspensión oleosa
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 120 y 236 ml
- **REGISTRO:** 7159 SL

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 87. (EQUILIBRIUM AGES) BAYER



Laboratorio:



BAYER S.A.

Av. Américas 57 - 52 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)4142277

Fax: 4234070 EXT 4382

Sitio web: www.bayerandina.com

Uso terapéutico: VITAMINICO MINERAL AMINOACIDOS

Principio Activo: VITAMINA A, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, COLINA, CALCIO, FOSFORO, POTASIO

Descripción:

EQUILIBRIUM AGES es un suplemento vitamínico mineral con aminoácidos y ácidos grasos esenciales

Composición	Contenido
Vitamina A	1.320 UI
Vitamina B1	880 ug
Vitamina B2	880 ug
Vitamina B6	704 ug
Vitamina B12	22 ug
Vitamina C	8.8 mg

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Vitamina D3	264 UI
Vitamina E	22 UI
Vitamina K	220 ug
Colina	22 mg
Biotina	8.8 ug
Ácido fólico	26.4 ug
Niacina	6.6 mg
Ácido pantoténico	990 ug
Calcio	6 mg
Cobalto	13.2 ug
Cobre	160 ug
Fósforo	6 mg
Hierro	3 mg
Magnesio	1.3 mg
Manganeso	62 ug
Selenio	2.6 ug
Sodio	1.2 mg
Zinc	2.1 mg
Potasio	9.9 ug
Yodo	273 ug
Ácidos grasos omega 3	57.6 mg
Ácidos grasos omega 6	9.6 mg

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Ácido linoléico	5.6 mg
Arginina	7.3 mg
Cistina	1.6 mg
Histidina	3.6 mg
Isoleucina	7.3 mg
Leucina	10.7 mg
Lisina	10.3 mg
Metionina	2.4 mg
Fenilalanina	6.1 mg
Treonina	7 mg
Triptófano	1.7 mg
Tirosina	5 mg

- **ACCIÓN:** Vitamínico mineral
- **INDICACIONES:** Ideal para piel sana y pelo brillante. Evita caída excesiva de pelo. **EQUILIBRUM AGES**, es un suplemento vitamínico y mineral con ácidos grasos esenciales (Omega 3 y 6) y aminoácidos para perros.
- **DOSIS:** Cachorros (1 - 4 kg de peso) 1 tableta. Perros pequeños (4 - 10 kg) 2 tabletas. Perros medianos (10 - 25 kg de peso) 3 tabletas. Perros grandes (25 - 40 kg de peso). **EQUILIBRIUM AGES** es altamente palatable por lo que puede darse solo o junto con el alimento.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas menores de 25° C.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Tabletetas
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 60 tabletetas
- **REGISTRO:** 11081 SL

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 88. (ORGANEW) VIETNIL



DESCRIPCIÓN

Organew® reúne en su formulación vitaminas, aminoácidos, FOS, MOS y levaduras vivas. Esta perfecta combinación auxilia en el desarrollo de una microbiota intestinal saludable, proporcionando una mejor digestibilidad de los alimentos y, por consiguiente, un aumento de la eficiencia alimentar.

INDICACIONES

Suplemento conteniendo aminoácidos, vitaminas, levaduras y prebiótico, indicado para animales en crecimiento, aumento de peso, aumento de la actuación, estímulo del apetito, mejora en la conversión alimentar y en el desempeño reproductivo. **Organew®** contiene levaduras vivas, FOS y MOS, que auxilian en el desarrollo de una microbiota intestinal saludable, proporcionando una mejor digestibilidad de los alimentos y, por consiguiente, un aumento de la eficiencia alimentar.

MODO DE USAR

Para utilizarse por vía oral, añadido al alimento.

Perros: 2,5g para cada 10Kg de peso vivo, una vez al día.

Gatos: 1g, una vez al día.

Aves: 1 a 2g por kg de ración.

NIVELES DE GARANTÍA

POR Kg DEL PRODUCTO:

Proteína Cruda (Mín.)	178,6 g
Extracto Etéreo (Mín.)	28,3 mg
Materia Fibrosa (Máx.)	500 g

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Materia Mineral (Máx.)	61,0 g
Humedad (Máx.)	100 g
Saccharomyces cerevisiae	9×10 ⁹ UFC
Mananoligosacarídeos	1.000 mg
Fruto-oligosacarídeos	2.000 mg
Vitamina B1 (Mín.)	5,4 mg
Vitamina B2 (Mín.)	19 mg
Vitamina B6 (Mín.)	11,2 mg
Vitamina B12 (Mín.)	24 mcg
Biotina (Mín.)	2,8 mg
Ácido Fólico (Mín.)	10 mg
Colina (Mín.)	750 mg
Ácido Nicotínico (Mín.)	20,30 mg
Lisina (Mín.)	16,68 g
Histidina (Mín.)	3.526 mg
Arginina (Mín.)	9.770 mg
Ácido Aspártico (Mín.)	18,11 g
Treonina (Mín.)	7.699 mg
Serina (Mín.)	9.803 mg
Ác. Glutámico (Mín.)	20,36g
Prolina (Mín.)	7.327 mg
Glicina (Mín.)	8.481 mg
Alanina (Mín.)	11,97 g
Cistina (Mín.)	2.461 mg
Valina (Mín.)	9.668 mg

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Metionina (Mín.)	6.649 mg
Isoleucina (Mín.)	8.740 mg
Leucina (Mín.)	13,3 g
Tirosina (Mín.)	4.570 mg
Fenilalanina (Mín.)	7.130 mg

PRESENTACIÓN

Bolsas metalizadas conteniendo 100g y 1kg del producto con medida dosificadora

REGISTRO ICA 10801 SL

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 89. (MIRRAPEL EQUINOS) LAB. COMANDINA



Laboratorio:



COMANDINA SAS

Calle 4B N° 27-189 Cali - Colombia

Teléfono: +(572) 3816930

Mail: info@comandinasa.com

Sitio web: www.mirrapel.com

Uso terapéutico: VITAMINICO MINERAL ACIDOS GRASOS AMINOACIDOS

Principio Activo: VITAMINA A, E, C, B6, BIOTINA, METIONINA, LISINA, LECITINA, AZUFRE, ZINC, GRASA

Especies:



Descripción:

MIRRAPEL EQUINOS es un suplemento alimenticio

Composición	Contenido
Vitamina A	60.000 UI
Vitamina E	550 UI

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Vitamina C	2.000 UI
Vitamina B6	80 mg
Biotina	3.500 mg
Metionina	50 g
Lisina	30 g
Lecitina	12 g
Azufre	8.000 mg
Zinc	6.500 mg
Selenio	0.5 mg
Humedad	8 %
Acido oléico	3.6 %
Acido linoléico	7.6 %
Acido linolénico	1.0 %
Acido Esteárico	0.6 %
Acido palmítico	1.24 %
Grasa	20 %
Excipientes csp	1.000 g

- **ACCIÓN:** Vitamínico, mineral, ácidos grasos y aminoácidos
- **INDICACIONES:** Suplemento alimenticio a base de ácidos grasos no saturados, metionina, lisina, lecitina, vitaminas y minerales para Equinos. La falta de ácidos grasos no saturados o de las vitaminas y minerales presentes en Mirrapel Equinos, pueden manifestarse por trastornos de los cascos, el pelo y la piel de los animales, produciendo cascos débiles, piel seca, pelo opaco y quebradizo. Mirrapel Equinos contiene ácidos grasos poliinsaturados Omega 3, Omegas 6 y Omegas 9.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **DOSIS:** Suminístrese **Mirrapel Equinos** a los animales en todas sus etapas, espolvoreado o mezclado con el alimento seco o húmedo, una vez al día en las siguientes cantidades mínimas. Dosis para todos los días: Potros menores de un año: de 30 a 40 gramos. Potros mayores de un año y equinos adultos: de 45 a 60 gramos. Úsalo a diario; en problemas de salud de pelo y piel mínimo de 2 a 3 meses continuos o según indique tu médico veterinario. En problemas de reblandecimiento de cascos u otros severos como fracturas, cuarteaduras o pérdida de tejido de la pérdida o la suela de los cascos úsalo mínimo durante 6 meses.
Una alimentación correcta, un alojamiento adecuado y el herrado profesional son fundamentales para la salud de los cascos
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Conservar las bolsas y el balde bien cerrados. No almacenar por encima de 30°C. No refrigerar. No congelar. Después de abierto use el producto antes de dos meses. No introduzca objetos húmedos dentro del producto. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Polvo oral
- **PRESENTACIÓN:** Balde de 2 kg (con 2 bolsas conteniendo 1 kg cada una).
- **REGISTRO:** 6869 AL

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 90. (CASQUIL) VIRBAC



Laboratorio:



VIRBAC COLOMBIA LTDA

Carrera 54 76 20 Bogotá Colombia

Teléfono: (+571)2252100 018000122100

Mail: clientescolombia@virbac.com.mx

Sitio web: <http://www.virbac.co/contactenos>

Uso terapéutico: ANTISEPTICO / DESINFECTANTE

Principio Activo: ALQUITRAN VEGETAL, FORMOL

Especies:



Descripción:

CASQUIL es un protector de casco y pezuña

Composición	Contenido
Alquitrán vegetal	95 g
Formol líquido	5 g

- **ACCIÓN:** Protector
- **INDICACIONES:** Afecciones de los cascos como agrietamientos, excoriaciones, heridas, pérdida de la dureza, asperezas y fragilidad por humedad o sequedad excesivas.
Coadyuvante en el tratamiento de lesiones podales como en: fiebre aftosa, estomatitis vesicular y panadizo o sabañón de los bovinos, hormiguillo (mazamorra) de los equinos, "foot rot" de los ovinos, tornillo en la cola de los

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

bovinos (fungosis, topizada de terneros, descorne mecánico o accidental y en operaciones de cascos y como apósito antiséptico.

- **DOSIS:** *CASQUIL* se aplica 1 ó 2 veces al día con un hisopo o brocha, dejando una capa delgada sobre la superficie del casco o cuerno, según el grado de lesión.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Ungüento
- **PRESENTACIÓN:** Envase metálico por 250 g
- **REGISTRO:** 1195 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 91. (SULFATO DE COBRE) CONAGRAN LTDA



SULFATO DE COBRE TIPO NIEVE

ConaCu-25 NT

PRODUCTO :	SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO
GRADO :	TECNICO
APARIENCIA :	FINOS CRISTALES
COLOR :	AZUL
PESO MOLECULAR (GM/MOL) :	249,6
HUMEDAD (29 °C) (% MAX.) :	1
GRANULOMETRIA (% PASA MALLA 24)	100
SOLUBILIDAD (% MIN)	99
PH (SOL 0,2M) :	3,5
TOXICIDAD L.D. (50).mg/Kg B.W.	470
CONTENIDO DE COBRE (% B.S.)	25 +/- 0,2
CONTENIDO DE PLOMO (Pb ppm)	menos de 200
CONTENIDO DE AZUFRE (% B.S.)	12,8 +/- 0,13
UNIDAD DE EMPAQUE	SACOS POR 25 Kg
MATERIAL DE EMPAQUE	BOLSA DOBLE POLIPR Y POLIETILENO

USOS : MICROELEMENTO PARA NUTRICION ANIMAL Y VEGETAL.

MANEJO: USAR GUANTES, EVITAR CONTACTO CON LA PIEL. USAR PROTECCION RESPIRATORIA.

FABIO LOPEZ DUARTE
Ingeniero Químico
Tarjeta profesional 0055



Planta No. 1 - Of. Principal
Km. 6 Vía Cajicá - Zipaquirá - Zona Industrial
Tels. 866 4206 - 866 4255 • Cel: (300) 202 2729

Planta No. 2 - Valle del Cauca
Km. 9 Vía Candelaria Pto. Tejada
Tel.: 339 26 31 • Fax: 391 99 44 • Cel: (300) 202 3091

REGISTRO ICA PECUARIO 1897/ AGRICOLA 828

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 92. (CERULINE) INVET



Solución Auricular

DESCRIPCIÓN: Ácido bórico 2g/100ml, Ácido acético 2g/100ml, Ácido salicílico 0,1g/100ml

INDICACIONES: Limpiador auricular indicado en Perros y Gatos, ayuda a remover material celular y cerumen. Sirve como limpieza de rutina y controla olores del canal del oído. También puede emplearse después del baño y para facilitar el examen de oído.

DOSIFICACIÓN: Llenar el canal del oído y efectuar un suave masaje en la base del oído. Los desechos y el exceso de solución pueden ser retirados del interior del oído por medio de una torunda de algodón o gasa. Aplicar una o dos veces por semana.

CARACTERÍSTICAS: Fórmula técnicamente balanceada de acción antibacterial y antifúngica. Disuelve por completo el cerumen. Al no tener alcohol no irrita. Válvula que permite fácil aplicación. Mantiene seco el canal del oído.

PRESENTACIÓN: Frasco por 120 ml

REG. ICA N° 6260-MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 93. (CEFALEXINA 500 MG) HOLLIDAY SCOTT S.A.



Laboratorio:



HOLLIDAY SCOTT S. A.

Int. Neyer 924 - (B1643GAT) Beccar - Buenos Aires - Argentina

Teléfono: (5411) 4732-0222

Mail: info@holliday.com.ar

Sitio web: www.holliday-scott.com

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: CEFALEXINA

Especies:



Descripción:

CEFALEXINA 500 MG es un antibiótico cefalosporínico de primera generación

Composición	Contenido
Cefalexina monohidrato	500 mg
Excipientes csp	1 Comprimido

- **ACCIÓN:** Antibiótico
- **INDICACIONES:** Infecciones de piel, tejidos blandos, osteoarticulares, otitis (con perforación timpánica), vías respiratorias y genitourinarias. Piodermias superficiales: Se sugiere continuar la administración 7 - 10 días luego de la desaparición de la dermatitis. Piodermias profundas: Se sugiere continuar la administración 14 - 21 días luego de la desaparición de la dermatitis.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **DOSIS:** Perros y Gatos: Administrar 20 a 30 mg / kg cada 8 a 12 hs (1 comprimido cada 20 kg de peso como dosis promedio). De elección en tratamientos prolongados de dermatopatías infecciosas por más de 30 días. En piodermias superficiales: Se sugiere continuar la administración 7 a 10 días luego de la desaparición de la dermatitis. En piodermias profundas: Se sugiere continuar la administración 14 a 21 días luego de la desaparición de la dermatitis. Antibiótico de baja toxicidad y amplio margen de seguridad: DL50 oral en ratas 5 g/kg.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Administrar con cautela en alérgicos o con idiosincrasia medicamentosa. Prevenir infecciones por gérmenes no susceptibles, particularmente *Cándida*. En caso de insuficiencia renal la dosis debe reducirse o prolongar los intervalos posológicos según criterio del Médico Veterinario actuante. Preñez: si bien atraviesa la barrera placentaria no se han observado efectos secundarios en el feto. Puede presentarse Náuseas, vómitos, diarrea y malestar abdominal.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Comprimidos
- **PRESENTACIÓN:** Caja por 5 o 30 blisters, cada blister de 10 comprimidos cada uno
- **REGISTRO:** DB 4083

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 94. (BAYTRIL 0.5%) BAYER

Baytril^{M.R.} 0.5%

Antidiarreico y contra infecciones sistémicas



Descripción:

Fórmula especial antidiarreica, contra infecciones bacterianas entéricas, así como septicémicas y respiratorias para uso en las diferentes especies animales.

Gracias a la excelente absorción que alcanza **Baytril^{M.R.} 0.5%**, la administración por esta vía tiene las mismas ventajas que la presentación inyectable, pues se alcanzan concentraciones en órganos y fluidos similares a las alcanzadas por vía parenteral, además de que viene listo para usarse.

Fórmula:

Cada ml contiene:

Enrofloxacin5 mg.

Excipiente c.b.p.1 ml.

Vía de administración:

Oral

Dosis:

Porcinos, bovinos, ovinos y caprinos:

0.5ml / kg p.c.

Perros y gatos:

1ml / kg p.c.

Gallos de pelea y aves de ornato:

2ml / kg p.c.



Presentación:

Frasco de 100 ml con aplicador

Indicaciones:

Por su amplio espectro de acción, **Baytril^{M.R.} 0.5%** está indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes gram-positivos, gram-negativos, micoplasmas, ya sean mixtas o sencillas como:

- Infecciones respiratorias
- Infecciones intestinales
- Infecciones septicémicas

En infecciones sistémicas o casos severos, la dosificación puede incrementarse a criterios del Médico Veterinario sin riesgo alguno para los animales.

El intervalo óptimo de aplicación es de 24 horas

En el caso de *Salmonella spp.*, se recomienda un tratamiento de 5 días consecutivos.

El tiempo de retiro en carne y leche es de 5 días, antes del sacrificio de los animales.

Información propiedad de Bayer de México S.A. de C.V.



Science For A Better Life

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 95. (FRONIL SPRAY) LAB-VET



FRONIL SPRAY

Solución cutánea

Antiparasitario contra pulgas, piojos y garrapatas en perros y gatos.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:

Fipronil	0.25 g
Excipientes c.s.p.	100 ml



DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar sobre el pelo del animal a una distancia de 10 a 20 cm. En animales de pelo largo rociar el producto a contra pelo, de manera que llegue hasta la piel, friccionando después el pelo. La dosis es de 15 mg del producto por Kg dependiendo del tamaño del pelo. Cada chorro equivale a 0.5 ml. En la práctica aplicar de 6 a 12 chorros por Kg de peso. Fronil ofrece contra las pulgas, una protección mínima de 30 días en perros y 40 días en gatos. Puede ser administrado en cachorros y gatitos a partir de las 10 semanas de edad.

PRESENTACIÓN

Envases por 100 ml y 250 ml con válvula atomizadora.

REGISTRO ICA 7184 - MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 96. (SILIMARINA) GENFAR

SILIMARINA GENFAR®

Cápsulas

Hepatoterápico

Antagonista de los tóxicos hepáticos

POSOLOGÍA



SILIMARINA Genfar® se administra en

Adultos: Inicialmente 1 cápsula 3 veces al día, después de las comidas, durante 4 a 6 semanas, se continúa con 1 cápsula 2 veces al día como dosis de mantenimiento.

Dosis inicial: 12 mg/kg/día.

Dosis mantenimiento: 6 mg/kg/día.

PRESENTACIÓN: SILIMARINA Genfar® Cápsulas de 150 mg, caja por 20 (Reg. San. INVIMA 2001M-012396).

Laboratorios Genfar S.A.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 97. (VENDA COBAN) NEXCARE

Venda Elástica Coban®

Beneficios

- Excelente fijación y compresión sin adhesivo
- Delgada, porosa y ligera y de fácil secado (cuando se humedece)
- No necesita clips adicionales para detenerse.
- Elástica
- Se ajusta al tamaño requerido ya que se puede cortar.
- Estirar la venda primero antes de aplicar
- Si se moja se puede secar con una toalla de papel.



Especificaciones

Aplicaciones	Asegurar gasas , Asegurar dispositivos médicos , Piel sensible , Áreas difíciles de cubrir y/o proteger
Nombre Clínico	Coban
Propiedades	Respirable , Autoadherente
Tamaños Disponibles	7.6cm x 4.5m
Usos	Asegurar férulas, compresas frío caliente, apósitos y tubos de catéter. Apoya, asegura y protege contra torceduras y esguinces

REGISTRO INVIMA 2013DM-001732-R2

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 98. (KETAMINA 50) LAB. HOLLIDAY



Laboratorio:



HOLLIDAY SCOTT S. A.

Int. Neyer 924 - (B1643GAT) Beccar - Buenos Aires - Argentina

Teléfono: (5411) 4732-0222

Mail: info@holliday.com.ar

Sitio web: www.holliday-scott.com

Uso terapéutico: ANESTESICO

Principio Activo: KETAMINA

Especies:



Descripción:

KETAMINA 50 es un anestésico

Composición	Contenido
Ketamina base	50 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Anestésico
- **INDICACIONES:** Premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia. De elección en operación cesárea. Se puede combinar con otras drogas como Acepromacina (Acedán), Xilazina, Diazepán, Midazolam, Tiopental sódico, Eter Gliceril Guayacólico y anestésicos

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

inhalatorios, de esta manera se bloquean los efectos colaterales indeseables de la Ketamina y se obtiene un mejor protocolo anestésico.

- **DOSIS:** Perros y gatos: Vía endovenosa (EV): de 7 a 10 mg/Kg. Vía intramuscular (IM): de 15 a 25 mg/Kg.
Equinos: Vía endovenosa (EV): de 3 a 5 mg/Kg. Vía intramuscular (IM): 15 mg/Kg.
Bovinos: Vía endovenosa (EV): 5 mg/Kg. Vía intramuscular (IM): 15 mg/Kg.
Porcinos: Vía endovenosa (EV): 5 mg/Kg. Vía intramuscular (IM): de 15 a 20 mg/Kg.
Ovinos: Vía endovenosa (EV): 3 mg/Kg. Vía intramuscular (IM): de 10 a 20 mg/Kg.
Aves: Vía intramuscular (IM): de 10 a 20 mg/kg.

- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Contraindicaciones: Animales convulsivos - Traumatismo craneano con aumento de la presión intracraneana - Glaucoma y en aquellos casos en donde no se debe aumentar la presión intraocular - Insuficiencia cardíaca descompensada - Hipertensión - Insuficiencia renal (especialmente en gatos) - Insuficiencia hepática severa (especialmente en perros).
Precauciones: La Ketamina produce sialorrea por lo cual se recomienda el uso de sulfato de atropina al 1 por mil en los casos que se requiera - Cuando se usa de forma EV, puede observarse apnea dependiente de la dosis y la velocidad de administración - En caso de sobrevenir un paro respiratorio, se indica la ventilación a presión positiva. No utilizar analépticos - La repetición de la Ketamina en el mantenimiento anestésico prolonga la recuperación proporcionalmente a las veces administradas - Durante la recuperación se recomienda que el animal esté en un lugar con poca luz y poco ruido. Puede presentarse: Salivación, emesis, vocalización, recuperación errática y prolongada, movimientos espasmódicos, convulsiones, temblores musculares, hipertonicidad, opistótonos, disnea e hipertensión arterial. La combinación con otras drogas anestésicas puede reducir hasta un 50% la dosis de Ketamina.

- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 50 ml
- **REGISTRO:** 3204 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 99. (SONDA NASOGASTRICA)

SONDA NASOGASTRICA



Sonda Nasogástrica: Se utiliza para realizar lavados gástricos, succión y drenaje de líquidos o fluidos gástricos, pulmonares y en la administración de alimentos en forma líquida.

OBJETIVO

- Toma de muestras del contenido gástrico con fines diagnósticos.
- Vaciar el contenido gástrico mediante drenaje o aspiración.
- Lavado gástrico.
- Administración de alimentación enteral.
- Administración de medicamentos.
- Prevención de broncoaspiración en pacientes con disminución de conciencia.
- Diagnóstico de hemorragia digestiva alta.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 100. (CUCHILLAS PARA BISTURI) NUBENCO



Nombre Genérico	Hoja De bistur
Nombre comercial	Cuchillas para bistur desechables
Marca	NUBENCO, MARCA REGISTRADA
Fabricante	Nubenco Enterprises
Composición del producto	Acero inoxidable o Acero al carb n.
Presentación del producto	Empaque unitario en papel aluminio, con información de referencia, lote, código de barras, fecha de fabricación y vencimiento, certificaciones, registro INVIMA, otros registros. Caja de cart n liso por 100 unidades. Con información de referencia, lote, fecha de fabricación y expiración, certificaciones de calidad, registro INVIMA, otros registros.
Características del producto	Producto estéril, desechable. Hoja recta delgada, plana y puntiaguda, su filo resistente permite cortes en línea. Uso en todas las especialidades, presentación en diferentes tamaños
Indicaciones de uso	<p>Dispositivo utilizado para la disección de la piel o de tejidos en las intervenciones quirúrgicas.</p> 

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Clasificación	Dispositivo Invasivo, Riesgo II a
Proceso de esterilización	xido de etileno, Tiempo de vida útil 5 años.
Registro sanitario	INVIMA 2002V-0000926
Controles de calidad	Análisis Biológicos; (esterilidad, apirogenicidad y atoxicidad), Análisis Físico Mecánicos; (resistencia de las uniones, del material de fabricación y cumplimiento de medidas: longitud y diámetro), Análisis Químico; (Acidez o Alcalinidad, Metales extraíbles y resistencia a la corrosión).
Precauciones de uso	<ul style="list-style-type: none">• No utilizar si el empaque no está íntegro.• Producto descartable, manejo de residuos cortopunzantes, según norma establecida en país de comercialización.• Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las recomendaciones de almacenamiento de insumos médicos.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 101. (CUCHILLA PARA BARBERA) MINORA

HOJAS DE CUCHILLA PARA BARBERA



Modelo: 800900029

Disponibilidad: En stock

[Descripción](#)

HOJAS DE CUCHILLA PARA BARBERA

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 102. (TERMOMETRO) LABEXO



Termómetros Varios

Termómetro Uso Veterinario



- * Rango Temperatura 35+42°C
- * Resolución: 1°C
- * Columna de Mercurio
- * Tipo varilla con anillo de sujeción
- * Con caimán metálico
- * Estuche plástico tipo esfero
- * Marca BRIXCO

- * Termometro 13 cm

Ref.	Especificaciones
4382	35+42°C

CONTACTO:

PBX: (571) 669 3468
FAX: (571) 669 3468 Ext. 102

Dirección: Cra. 7 # 180 - 75 "CODABAS"
Modulo 6 Bodega 25
Bogotá - Colombia

info@labexco.com - ventas@labexco.com

Horario de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:30 m y
de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 103. (BOLSA ROJAS) PATOJITO

Bolsas de Basura



Utiliza nuestras bolsas oxo-biodegradables para recoger la basura, recuerda siempre reciclar, separa residuos orgánicos (frutas, comida, etc...) e inorgánicos (plásticos, papel, tetrapack, etc...)

Tamaños

Papelera 50x70 cms (50 Litros, 30 Litros)

Grande 65 x 95 cms

Industrial 90 x 130 cms

Aromas

Chicle

Floral

Canela

Vainilla

Limón

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 104 - 105. (AGUJAS VACUTAINER) RYMCO

[INICIO](#)

[e-Business](#)

[Contacto](#)

[PQR](#)

[Ley Habeas Data](#)

[English](#)



[CASA MATRIZ](#)

[PRODUCTOS](#)

[SERVIDED](#)

[NOTICIAS & EVENTOS](#)

AGUJA MULTIPLE VACUTAINER



Descripción

ESPECIFICACIONES GENERALES: Caja X 100 unidades Aguja vacutainer. Aguja en acero inoxidable estéril para la extracción de sangre al vacío.

COMPONENTES: Acero strainless, acero inoxidable.

USOS O MODO DE EMPLEO: Aguja de doble punta una de ellas se inserta en el paciente y la otra perfora los tubos al vacío.

PRECAUCIONES: Manipular con precaución, no dejar al alcance de los niños, después de ser usada depositar en un guardián. Tiene un sello de seguridad de color blanco que une las dos partes de la envoltura de la aguja el cual se rompe en el momento de su uso.

UNIDAD DE VENTA: Caja.

REGISTRO INVIMA: 2008DM-0001813

LABORATORIO: RYMCO

PAIS ORIGEN: COLOMBIA

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 106. (ALGODÓN) HIGIETEX

ALGODÓN / COTTON



Certificación en el Sello del Producto bajo la Norma NTC 2209 Algodón Purificado para uso medicinal. /
Certification in products seal under NTC 2209 Norm Purified Cotton for medicinal use.

REFERENCIA / REFERENCE

CANTIDAD / QUANTITY

Algodón / Cotton	454 gr (Libra / Pound), 15 gr, 10 gr, 5 gr
Zig-zag	250 gr, 100 gr, 50 gr, 25 gr, 20 gr
Manta / Blanket	Compacta / compact: 1000 gr - Cinta / tape: 100 gr



Usos / Uses:

Doméstico: Para remover esmalte de uñas y maquillaje, aplicar cremas limpiadoras, astringentes y aceites. Y para la delicada piel del bebé.

Domestic use: For removing enamel from fingernails make up, astringent and oils. For baby skin too.

Medicinal: Para primeros auxilios, en curaciones e inyectología.

Medical use: For all relational to first AID.

Industrial: Limpieza de equipos de tipografía, tratamiento de flores y en tanatología.

Industrial use: Cleaning typographic stuff, flowers treatment and thanatology treatment too.

Registro Sanitario N° INVIMA 2006DM-0000295 R2 /
Sanitary code N° INVIMA 2006DM-0000295 R2

LABORATORIOS HIGIETEX S.A.

Calle: 12 N° 52 A 119

Tel: (574) 255 47 82 - Fax: (574) 255 07 10

E-mail: servicioalcliente@higietex.com.co

www.higietex.com.co



ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 107. (VASELINA) DROGAM



o / Droga blanca / Semi solidos / Vaselina 500 GR



Vaselina

500 GR

Usos: Suavizante y lubricante de la piel.

Beneficios:

- Permite tener pies más suaves.
- Suaviza los labios agrietados.
- Da brillo a los labios.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 108. (METRONIDAZOL 500 MG) PISSA



OTROZOL®

Principio activo: Metronidazol

Presentación: Frasco flex-oval 500 mg / 100 ml

Forma farmacéutica: Solución inyectable

Reg. Sanitario: INVIMA 2008 M-010787 R1

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 109 (METRONIDAZOL 500 MG) LA SANTE

METRONIDAZOL

Presentación

500 MG CAJA x 100 TAB

Dosis y vía de administración

La dosis recomendada de METRONIDAZOL LA SANTE® en adultos es: en amebiasis y giardiasis, 500 mg 3 veces al día por 5 a 10 días. En tricomoniasis, 2 gramos en 1 sola dosis, durante 5 a 10 días.

Registro sanitario

INVIMA M-002041



ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 110. (MIRRAPEL PETS) COMANDINA



Laboratorio:



COMANDINA SAS

Calle 4B N° 27-189 Cali - Colombia

Teléfono: +(572) 3816930

Mail: info@comandinasa.com

Sitio web: www.mirrapel.com

Uso terapéutico: VITAMINICO MINERAL ACIDOS GRASOS

Principio Activo: VITAMINA A, D3, E, B2, B6, C, NIACINA, COLINA, BIOTINA, INOSITOL, ZINC, AZUFRE

Especies:



Descripción:

MIRRAPEL PETS es un suplemento alimenticio

Composición	Contenido
Vitamina A	56.000 UI
Vitamina D3	5.000 UI
Vitamina E	400 UI

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

<i>Vitamina B2</i>	<i>12 mg</i>
<i>Vitamina B6</i>	<i>55 mg</i>
<i>Vitamina C</i>	<i>250 mg</i>
<i>Niacina</i>	<i>40 mg</i>
<i>Colina</i>	<i>7 g</i>
<i>Biotina</i>	<i>120 mg</i>
<i>Inositol</i>	<i>4 g</i>
<i>Zinc</i>	<i>350 mg</i>
<i>Azufre</i>	<i>800 mg</i>
<i>Selenio</i>	<i>0.25 mg</i>
<i>Lecitina</i>	<i>9.5 g</i>
<i>Acido oléico</i>	<i>2.6 %</i>
<i>Acido linoléico</i>	<i>6.2 %</i>
<i>Acido linolénico</i>	<i>1%</i>
<i>Extracto de Yucca shidigera</i>	<i>0.6 g</i>
<i>Excipientes csp</i>	<i>1.000 g</i>

- **ACCIÓN:** *Vitamínico, mineral y ácidos grasos*
- **INDICACIONES:** *Las deficiencias de ácidos grasos no saturados, o de las vitaminas y minerales presentes en **Mirrapel Pets**, pueden manifestarse con trastornos del pelo y la piel de los animales produciendo piel seca, pelo opaco y quebradizo. Controla la caída del pelo. **Mirrapel Pets** por su contenido de ácidos grasos poliinsaturados Omega 3, Omega 6 y Omega 9, contribuye a cubrir las deficiencias de ellos en la alimentación y a mejorar la salud de las mascotas. El extracto de yuca Schidigera ayuda a reducir el mal olor de la materia fecal.*

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **DOSIS:** Usa Mirrapel todos los días a partir de los 2 meses hasta su vejez. Polvo palatable que se adhiere muy bien al alimento. No es volátil. Contiene un desodorizador de origen natural que ayuda a disminuir el mal olor de la materia fecal.

Mide la dosis con una cuchara sopera según su peso, espolvoreado o mezclado con el alimento seco o humedo, según las siguientes cantidades:

Perros:

Menos de 10 kg 5 g (1/2 cucharada sopera)

Entre 10 y 15 kg 10 g (1 cucharada sopera)

Entre 15 y 25 kg 20 g (2 cucharadas soperas)

Superior a 25 kg 30 g (3 cucharadas soperas)

Hembras en Gestación o Lactancia aumentar la dosis una tercera parte

Gatos:

5 g (1/2 cucharada sopera)

Hembras en Gestación o Lactancia: 10 g (1 cucharada sopera)

Las cantidades totales pueden suministrarse en una sola vez o fraccionándolas a lo largo del día en dos o tres porciones y pueden ser modificadas a criterio del médico veterinario. Duración del suministro: Mínimo de 2 a 3 meses continuos o según indique tu médico veterinario.

- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** El suministro de ácidos grasos puede tornar suave el pelo de perros de raza de pelo de alambre. Tómelo en cuenta antes de iniciar su administración. Conservar la bolsa bien cerrada. No almacenar por encima de 30°C. No refrigerar. No congelar. Después de abierto use el producto antes de dos meses. No introduzca objetos húmedos dentro del producto. Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Polvo oral
- **PRESENTACIÓN:** Bolsa por 300 y 600 g.
- **REGISTRO:** 6796 SL

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 111. (ACEITE MINERAL) PROFARMA



Los aceites minerales son derivados del petróleo, altamente refinados, generalmente utilizados como vehículos (carrier), excipientes y lubricantes en diferentes aplicaciones industriales.

CARACTERISTICAS

El aceite es un líquido puro, claro y transparente como el agua que tiene las siguientes características:

- No tiene olor, color ni sabor.
- No contiene sustancias carbonizables.
- Tiene buena capacidad para emulsificarse.
- Es estéril, estable e inocuo.
- Es miscible con todos los productos derivados del petróleo.
- Es miscible con muchos aceites esenciales y la mayoría de los aceites, grasas y ceras animales y vegetales.
- No es gomoso ni pegajoso.
- Tiene propiedades lubricantes, de penetración y de plasticidad.
- Buen aislante eléctrico
- Inhibe la formación de espuma.
- Tiene baja tendencia a formar ácidos.
- No manchan.
- No son corrosivos.

APLICACIONES

A. INDUSTRIAS COSMETOLOGICAS.

- Aceite para niños.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- Brillantinas y productos capilares.
- Cremas: para afeitar, para protección industrial y para protección solar.
- Preparaciones de aceite para el cabello.
- Pomadas para los labios.
- Cremas faciales.

B. INDUSTRIAS FARMACEUTICAS.

- Productos medicinales-Jarabes.
- Ungüentos.
- Productos veterinarios.
- Laxantes y drogas.

C. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS.

- Panificadoras- Repostería.
- Fabricación de caramelos.
- Preservación de huevos, arroz y frutas.
- Papeles encerados, empaques.
- Concentrados para animales.
- Filtros de alimentos.
- Manufacturas de pastas alimenticias y productos dietéticos.
- Lubricantes de maquinarias alimenticias.

D. OTROS USOS.

- Preparación de productos químicos.
- Aceites y aprestos textiles.
- Fabricación de cables.
- Fabricación de polietilenos, polipropilenos y otros plásticos.
- Manufactura de pegantes.
- Papel de aluminio.
- Elaboración de repelentes para insectos.
- Lubricación de fibras naturales y sintéticas.
- Industria del cuero.

PRESENTACIÓN

Disponible para entregas:

- Granel: containers y carrotanques
- Tambor: Envases metálicos nuevos de 55 galones
- Garrafas plásticas: 5 galones.1 galon, 1 litro,500 cc.

NO REQUIERE REGISTRO INVIMA

EDUARDO MANTILLA QUINTERO

NIT 91.261.731-6

CARRERA 22 16-23 / TELEFONO 6833027

BUCARAMANGA

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 112. (HEMOLITAN PET) VIETNIL

PRODUCTO:

Vitamina	B1 1500 mg	
Vitamina	B2 1500 mg	
Vitamina	B6 1200 mg	
Vitamina	B12 15000 mcg	
Vitamina.....	K 250 mg	
Pantotenato de Calcio	1200 mg	
Ác. Nicotínico	1200 mg	
Ác. Fólico	5000 mg	
Hierro	4500 mg	
Cobalto.....	100 mg	
Cobre	500 mg	



The image shows the packaging for Hemolitan pet. On the left is a white box with red and blue accents, featuring the product name 'Hemolitan pet' in large red letters and a circular logo with a red and blue design. On the right is a white plastic bottle with a white cap, also labeled 'Hemolitan pet' and featuring the same circular logo. The box and bottle are set against a white background.

Zinc	5000 mg
Glucosa	200 g
Palatabilizante.....	10 g
Vehículo c.s.p.	1000 g



MODO DE USAR: (agite antes de usar)

Via oral o adicionado a agua o alimento de todas las pequeñas especies (caninos, felinos, mustelídeos, aves, roedores y afines).

Pequeños animales: 1 gota por Kg de peso vivo, o 1 mL para cada 10 Kg de peso corporal, a cada 12 horas, o a criterio del médico veterinario.

PRESENTACIÓN:

Presentación: Envases conteniendo 30 y 60 mL (gotas).

REGISTRO ICA 7131 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 113. (PROMOCALIER L) LAB. CALIER DE LOS ANDES



Laboratorio:



LABORATORIOS CALIER DE LOS ANDES S. A.

Cl. 20 69 B 95 Bogotá - Colombia

Teléfono: 5701393 - 4116525

Fax: 4050049

Mail: laboratorios@calierandes.com

Sitio web: www.calier.es

Uso terapéutico: VITAMINICO, AMINOACIDOS

Principio Activo: VITAMINA A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3, BIOTINA, PANTENOL, TREONINA, SERINA

Especies:



Descripción:

PROMOCALIER L es un multivitamínico

Composición	Contenido
Vitamina A	10.000.000 UI
Vitamina D3	2.000.000 UI
Vitamina K3	0.5 g
Nicotinamida	16.25 g
D-pantenol	7.5 g

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Vitamina B1	1.75 g
Vitamina B2	2.5 g
Vitamina B6	1.125 g
Vitamina B12	1.25 mg
Vitamina B15	0.5 mg
Biotina	1 mg
Inositol	2.5 g
Alanina	11.5 g
Arginina	6.1 g
Ácido aspártico	9.5 g
Fenilalanina	5.5 g
Cistina	2.1 g
Ácido glutámico	21.5 g
Glicina	9.6 g
Histidina	4.7 g
Isoleucina	6 g
Leucina	12.5 g
Lisina	9.5 g
Metionina	2.2 g
Prolina	9.5 g
Serina	7 g
Treonina	5 g
Triptófano	2 g
Tirosina	5.3 g
Valina	6.2 g
Excipientes csp	1.000 ml

- **ACCIÓN:** Bioestimulante completo
- **INDICACIONES:** En los desequilibrios y deficiencias nutritivas. En los períodos de estrés. En la muda de las aves y conejos. Para aumentar la puesta, fertilidad e incubabilidad en las aves y la viabilidad en los polluelos. En los estados de depauperación y convalecencia de los animales. En los períodos de gestación. En la lactancia. Para mejorar el rendimiento y el índice de conversión de los animales. En el síndrome del hígado graso. En los ritmos reproductivos Intensivos.
PROMOCALIER L es una fórmula donde se Incluyen las vitaminas y aminoácidos, en concentraciones adecuadas, indispensables para el correcto funcionamiento del fisiologismo orgánico. Su presentación en forma líquida evita las dificultades que pudieran aparecer con algunos tipos de bebedores automáticos.
Las vitaminas en **PROMOCALIER L** se encuentran en forma solubilizada, lo

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

mismo que los aminoácidos, los cuales están obtenidos en su forma química "L" (levógira) y libres en su casi totalidad, lo cual confiere al producto una segura biodisponibilidad a la vez que le dota de una gran facilidad de asimilación y rapidez de efectos. **PROMOCALIER L** puede considerarse, como un "bioestimulante completo".

- **DOSIS:** Aves: 1 ml/litro de agua de bebida, durante 5 días. Resto de especies: 5ml/100 kg. p.v./día durante 4 a 5 días. Renovar el agua medicada diariamente. Vía oral en el agua de bebida
- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución oral
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 20 ml, 100 ml, 1000 ml, 5 y 20 Litros.
- **REGISTRO:** 3203 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 114. (LOCION PARA CANINO) CANAMOR



Perfume canino



Perfume canino CanAmor. 150mL. Perfume con fragancia a bebé, con práctico atomizador. El aroma perdura tanto en tu perro como en las zonas de la casa que frecuenta. Suave con la piel, es ideal para acompañar las rutinas de aseo y belleza de tu peludo. Resulta útil para llevar a donde quieras por su tamaño liviano..

Beneficios Indicaciones y usos

1. Facilita la convivencia con tu mascota porque evita el mal olor y deja un agradable aroma.
2. Retira partículas de impurezas, así como microorganismos y parásitos de la piel y el pelo de tu perro.

REGISTRO ICA 2292 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 115. (LIDOCAINA) LAB. ROPSOHN



Laboratorio:



ROPSOHN LABORATORIOS LTDA

Cl. 166 45 - 80 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)6718510

Fax: +(571)6718530

Mail: ventas@ropsohnlab.com.co

Sitio web: www.ropsohnlab.com.co

Uso terapéutico: ANESTESICO

Principio Activo: LIDOCAINA

Especies:



Descripción:

RONCAINA es un anestésico

Composición	Contenido
Lidocaína clorhidrato	20 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Anestésico

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **INDICACIONES:** Anestesia superficial o tópica: Para anestesiar mucosas, debridar absesos, en heridas dolorosas, cortes superficiales, dolores en tonsilas, hocico, nariz, etc.
Anestesia por infiltración: Se utiliza en suturas superficiales, biopsias cutáneas, caudotomías, resección parcial de orejas, descornado, anestesia intraarticular, sinovial etc.
Anestesia regional: Bloqueo de los nervios sensitivos del área por inyección alrededor del tronco nervioso o bien de un plexo nervioso.
Anestesia epidural y extradural: En equinos solo se usa la anestesia epidural alta, administrando **RONCAINA** en el espacio intervertebral de la I y II vértebras coccígeas; se usa en casos de exploraciones y operaciones de pene, castraciones, laparatomías y operaciones de miembros. En bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos, se usa la anestesia extradural baja y alta administrándose **RONCAINA** entre el espacio intervertebral de la I y II vértebras coccígeas y en el caso de una anestesia extradural baja se aplica **RONCAINA** en el espacio intervertebral existente entre la terminación del sacro y la I vértebra coccígea. Se usa en intervenciones en ano, región circumanal, perineo, vagina etc.
RONCAINA se difunde fácilmente a través del tejido adiposo, tejido conjuntivo, tejido fibroso e incluso sobre edemas.
- **DOSIS:** En general la dosis se determina y varía según la extensión y duración de la anestesia requerida, de acuerdo con la siguiente tabla guía:

Tipo de anestesia	Animales grandes	Animales pequeños
Epidural alta	20 - 30 ml	5 - 10 ml
Extradural baja	20 - 30 ml	5 - 10 ml
Extradural alta	10 - 20 ml	2 - 5 ml
Por conducción	20 - 40 ml	5 - 10 ml
Por infiltración	30 - 50 ml	10 - 20 ml
Superficial	20 - 40 ml	5 - 20 ml

- Repetir la dosis si se requiere, cada 20-30 minutos aproximadamente. La dosis, frecuencia y tipo de administración pueden variar, de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **MODO DE APLICACIÓN:** *Solución inyectable.*
- **PRESENTACIÓN:** *Frasco viales por 50 ml.*
- **REGISTRO:** *2350 DB*

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON
NIT 91.224.296-2
ITEM 116. (TRANQUILAN) LAB. ZOO



Laboratorio:



LABORATORIOS ZOO LTDA

Dg. 30 C 3 A - 36 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)5665397

Fax: +(571)2887323

Mail: laboratorioszoo@laboratorioszoo.com

Sitio web: www.laboratorioszoo.com

Uso terapéutico: TRANQUILIZANTE / SEDANTE

Principio Activo: ACEPROMAZINA

Especies:



Descripción:

TRANQUILAN INYECTABLE es un tranquilizante y preanestésico

Composición	Contenido
Acepromazina maleato	10 mg

- **ACCIÓN:** Tranquilizante, preanestésico
- **INDICACIONES:** En equinos, caninos y gatos como tranquilizante y preanestésico.
Como tranquilizante:
Calma animales indóciles, nerviosos o agresivos.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Disminuye la excitabilidad, la ansiedad y el estado de alerta.

Mejora el manejo y la sujeción en procedimientos diagnósticos, clínicos y ante eutanasia.

Facilita el transporte, tratamientos, vendajes y procedimientos odontológicos que requieran indiferencia total o parcial del animal.

Como preanestésico:

Aumenta la potencia y el efecto de los barbitúricos.

Mejora la seguridad en anestesia general y neuroleptoanalgesia.

Asociado con anestesia local para procedimientos quirúrgicos (pequeña cirugía).

Reduce la incidencia de hipertermia maligna inducida en anestesia por halotano.

Potente actividad antiarrítmica, especialmente las causadas por halotano y epinefrina.

Efectos adicionales:

Antiemético: antagoniza la dopamina en el "gatillo" del vómito (zona quimiorreceptora).

Estimula la secreción de prolactina (la dopamina inhibe la secreción de prolactina).

Cardiovascular: principalmente hipotensión por bloqueo de receptores adrenérgicos.

Extrapiramidal: la dopamina actúa en los ganglios basales como modulador de la acetilcolina para el control de la postura y de los movimientos.

Interviene en la temperatura, el metabolismo basal, el balance hormonal y como antihistamínico.

- **DOSIS:** Perros: Preanestésico: 0,1 - 0,2 mg/kg de peso por vía I.V., aplicar máximo 3 mg. Tranquilizante: 0,025 - 0,2 mg/kg de peso por vía I.V., aplicar máximo 3 mg. 0,1 - 0,25 mg/kg de peso por vía I.M.
Gatos: Preanestésico: 0,11 mg/kg de peso por vía I.V., 15 minutos antes de la anestesia. Se recomienda aplicar atropina (a dosis de 0,045-0,067 mg/kg), para minimizar o prevenir los efectos vagales. Tranquilizante: 0,05 - 0,1 mg/kg vía I.M. o S.C., aplicar máximo 1 mg.
Equinos: Preanestésico: 0,02 - 0,05 mg/kg de peso por vía I.M. o I.V. Tranquilizante: 0,04 - 0,08 mg/kg por vía I.V., I.M. o S.C. Según el grado de tranquilización y la duración requerida, la dosis puede repetirse cada 6 - 8 horas.
Perros Dosis de acepromazina 0,1 - 0,2 mg/kg de peso. Dosis de Tranquilán 0,1 - 0,2 mL por cada 10 kg de peso, I.V., I.M., S.C.
Gatos Dosis de acepromazina 0,11 mg/kg de peso. Dosis de Tranquilán 0,05 - 0,1 mL por cada 5 kg de peso I.V., I.M., S.C.
Equinos Dosis de acepromazina 0,04 - 0,08 mg/kg de peso. Dosis de Tranquilán 0,5 - 1 mL por cada 120 kg de peso, I.V., I.M., S.C.
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento.
- **CONTRAINDICACIONES:** La acepromazina esta contraindicada en pacientes con tétano, hipovolemia, en estado de shock y en intoxicaciones con

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

estricnina o insecticidas organofosforados.

No se recomienda usar en caninos braquicéfalos (Pekínés, Yorkshire, Maltés, Shih Tzú, Boxer, Lhasa Apso, Pug, Bull dog, Bull mastiff), por su alta sensibilidad al efecto de hipotensión y bradicardia, principalmente en la raza Boxer.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Hipotensión, bradicardia y prolapso de la membrana nictitante en equinos y caninos. En equinos causa priapismo (protrusión) temporal, que puede permanecer hasta 2 horas, por lo cual deben tomarse las precauciones del caso para evitar lesiones del pene expuesto. La acepromazina no debe ser administrada dentro del mes siguiente a la exposición a insecticidas organofosforados.

- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Caja por 5 frascos por 10 ml
- **REGISTRO:** 1429 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 117. (IMIDOGAN) VIRBAC



Laboratorio:



VIRBAC COLOMBIA LTDA

Carrera 54 76 20 Bogotá Colombia

Teléfono: (+571)2252100 018000122100

Mail: clientescolombia@virbac.com.mx

Sitio web: <http://www.virbac.co/contactenos>

Uso terapéutico: HEMOPARASITICIDA

Principio Activo: DIPROPIONATO DE IMIDOCARB

Especies:



Descripción:

IMIDOGAN es un hemoparasitida

Composición	Contenido
Dipropionato de Imidocarb	12 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

- **ACCIÓN:** Hemoparasitida
- **INDICACIONES:** Imidogan® está indicado para el control y tratamiento de la Babesiosis y Anaplasmosis en bovinos, equinos y caninos. La Babesiosis también conocida como Piroplasmosis, tristeza, fiebre de Texas o ranilla roja, es una enfermedad que afecta a los glóbulos rojos y es transmitida por diferentes

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

géneros de garrapatas. La enfermedad es causada por hemoprotozoarios del género Babesia. La Anaplasmosis causada por Anaplasma marginale, es otra enfermedad parasitaria que afecta los glóbulos rojos de los bovinos, puede ser transmitida por garrapatas, moscas, y otros insectos hematófagos. **Imidogan®** es un Hemoparasitocida para el tratamiento y control de la Babesiosis y la Anaplasmosis.

- **DOSIS:** Bovinos: Babesiosis 1 mL. X 100 Kg.; Anaplasmosis 2.5 mL. X 100 Kg.; Babesiosis y Anaplasmosis 2.5 mL. X 100 Kg. Equinos 2mL. X 100 Kg. Caninos 0.25 mL. X 10 Kg. Vía Intramuscular o Subcutánea. Tratamiento Preventivo: Cuando los animales susceptibles son introducidos en áreas con conocida incidencia de Babesiosis, administrar Imidogan® a una dosis de 1 mL. por cada 100 Kg. de peso 5 días después de la llegada de los animales. Cuando los animales susceptibles son introducidos en áreas con conocida incidencia de Anaplasmosis, administrar **Imidogan®** a una dosis de 2.5 mL. por cada 100 Kg. de peso cuando se presentan los primeros signos de la enfermedad, esto se debe al prolongado período de incubación de la Anaplasmosis (25 a 45 días), la administración de Imidogan antes de la presentación de los signos clínicos, puede ser prematura, imposibilitando el desarrollo de la infección y la inmunidad.
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 165 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo no puede darse para el consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 10 y 100 mL.
- **REGISTRO:** 7290 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 118. (STOMORGYL 10) CARVAL DE COLOMBIA



Laboratorio:



CARVAL DE COLOMBIA

Cr. 1 58 - 41 Cali - Colombia

Teléfono: (572)6875300

Fax: (572)6875300

Sitio web: www.carval.com.co

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: METRONIDAZOL, ESPIRAMICINA

Descripción:

STOMORGYL 10 es un antimicrobiano

Composición	Por cada comprimido 600 mg
Espiramicina	750.000 UI
Metronidazol	125 mg
Excipientes csp	600 mg

- **ACCIÓN:** Antimicrobiano
- **INDICACIONES:** En perros y gatos para el tratamiento de afecciones bucodentales y faríngeas ocasionadas por Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Clostridium sp., Corynebacterium spp., Rickettsia sp., Mycoplasma sp.
- **DOSIS:** Vía oral, un comprimido por cada 10 kg de peso, lo cual equivale a 75.000 UI de espiramicina / kg de peso y 12.5 mg de metronidazol / kg de peso, cada 24 horas durante 5 a 10 días.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Comprimido oral
- **PRESENTACIÓN:** Blister por 10 comprimidos, caja por 2 blisters
- **REGISTRO:** 4296 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 119. (QUERCETOL VET) LAB. COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A.



Laboratorio:



COMPANIA CALIFORNIA S.A.

CL 17 34 64 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)7447878

Fax: +(571)7447889

Mail: mercadeo@ciacalifornia.com.co

Sitio web: www.ciacalifornia.com.co

Uso terapéutico: HEMOSTATICO

Principio Activo: ETAMSILATO

Especies:



Descripción:

QUERCETOL es un hemostático

Composición	Contenido
Etamsilato (ciclonamida)	125 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Hemostático
- **INDICACIONES:** Se indica como coadyuvante en el tratamiento y control de hemorragias traumáticas y quirúrgicas. Para el control de la hemostasia en diversos procesos patológicos, intervenciones quirúrgicas y manipulaciones obstétricas. **QUERCETOL**® como agente hemostático sistémico se utiliza en el contexto pre y postquirúrgico especialmente de urología, cirugía y odontología. **QUERCETOL**® es útil en el control de la hemorragia uterina disfuncional e perras.
QUERCETOL® Vet se indica en bovinos, equinos, porcinos, perros y gatos,

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

como coadyuvante en el tratamiento de trastornos de la coagulación y prevención de hemorragias de pequeños vasos sanguíneos. Útil como coadyuvante en hematuria esencial bovina, hematemesis, epistaxis, parvovirus, auriculohematomas, caudotomía, auriculotomía, metrorragias, elitorragias, oncotomías, intoxicación por AINEs, perforación de úlcera gástrica y duodenal, reticuloperitonitis traumática, hemorragias pos quirúrgicas.

- **DOSIS:** En bovinos, equinos, porcinos, perros y gatos, la dosis usada está en el rango de 5 a 10 mg de etamsilato /kg de peso corporal. En la práctica: Aplicar 1 a 2 mL de **QUERCETOL®** Vet por cada 25 kg de peso por vía intravenosa o intramuscular como dosis única diaria o el tratamiento puede hacerse cada 8 horas hasta que el efecto deseado sea alcanzado; pudiendo ser repetido por 2 a 3 días adicionales en orden de obtener control sobre el sangrado o a criterio del Médico Veterinario.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 10 ml.
- **REGISTRO:** 7013 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 120. (FURACINE POMADA) PISA



FÓRMULA:

Cada 100 g contienen:

Nitrofurazona	200mg
Excipiente c.b.p	100g

DESCRIPCIÓN:

FURACINE® Pomada es un efectivo antimicrobiano en forma de pomada, para usarse en heridas e infecciones cutáneas.

INDICACIONES:

Para la prevención o control de infecciones bacterianas superficiales de la piel en casos de heridas, quemadura y úlceras cutáneas.

DOSIS:

Aplicar FURACINE® pomada directamente sobre la lesión con una espátula, o poniéndola sobre una gasa para ser aplicada en la herida. El uso de vendaje es opcional. La preparación deberá permanecer sobre la lesión por lo menos durante 24 horas. El vendaje puede cambiarse varias veces al día o dejarse sobre la lesión durante un período mayor. FURACINE® pomada puede aplicarse en heridas recién suturadas ya que por ser soluble en agua, no interfiere con la cicatrización. También puede ser utilizado para evitar que los vendajes se peguen a la herida.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Cutánea.

ADVERTENCIAS:

En caso de heridas punzantes o quemaduras severas, úsese únicamente de acuerdo a las recomendaciones del Médico Veterinario.

Cuando se usa sobre abscesos, la pomada deberá aplicarse únicamente después de la incisión, ya que no penetra la piel intacta.

Si el enrojecimiento o inflamación persisten o aumentan, descontinúese la aplicación y consulte nuevamente al Médico Veterinario.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

LEYENDAS:

CONSULTE A SU MÉDICO VETERINARIO.

Su venta requiere receta médica

PRESENTACIONES:

Tubo con 85g y tarro con 453g

INDICADO PARA:

Caninos

Felinos

Equinos

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 121. (KIT DE PEQUEÑA CIRUGIA X 13 PIEZAS) MEDLIFE



Descripción

ESPECIFICACIONES GENERALES: Compuesto de:

Pinza diseccion con Garra
Pinza diseccion sin Garra
Mango para bisturi No.3
Mango para bisturi No,4
Pinza Kelly curva
Pinza Kelly Recta
Pinza Mosquito
Tijera de Mayo curva
Tijera de Mayo recta
Porta Agujas
Sonda acanalada
Indicador
Ganchos separadores

COMPONENTES: Estuche de cuero sintetico, acero inoxidable.

USOS O MODO DE EMPLEO: Kit basico para pequeñas cirugias.

PRECAUCIONES: No usar sustancias corrosivas, mantener alejado del alcance de los niños, debe ser usado por personal capacitado.

UNIDAD DE VENTA: Kit.

REGISTRO INVIMA: No requiere.

LABORATORIO: MEDLIFE

PAIS ORIGEN: COLOMBIA

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 122. (AZIUM) MSD SALUD ANIMAL MERCK & CO INC



Laboratorio:



MSD Salud Animal MERCK & CO INC

Av Kr 68 17 64 Bogotá - Colombia

Teléfono: +(57)(1)5925092

Fax: +(571)4128620

Mail: infoclientes@merck.com

Sitio web: www.msd-salud-animal.com.co

Uso terapéutico: ANTIINFLAMATORIO

Principio Activo: DEXAMETASONA

Especies:



Descripción:

AZIUM es un antiinflamatorio esteroidal

Composición	Contenido
Dexametasona	2 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Antiinflamatorio

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

- **INDICACIONES:** Para el tratamiento de condiciones inflamatorias no infecciosas de las articulaciones y tejidos relacionados. Como coadyuvante en afecciones de tipo alérgico e inflamatorio de etiología no infecciosa. En bovinos además, para el tratamiento de cetosis primaria. Como coadyuvante en el síndrome de vaca caída. Antiestrés en casos de transporte y movilización.
- **DOSIS:** Bovinos: 2.5 a 10 ml; Equinos: 1.5 a 2.5 ml; Caninos: 0.1 a 0.5 ml; Felinos: 0.1 a 0.3 ml, vía intravenosa o intramuscular.
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse para consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** No aplicar a hembras en el último tercio de gestación. Almacénese en lugar fresco, protegido de la luz. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco x 50 mL y 100 mL
- **REGISTRO:** 1994 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 123. (BIOPODAL) PREMEX



Laboratorio:



PREMEX S.A.

Autopista Sur 2 Sur 251 Medellín - Colombia

Teléfono: +(574)6041500

Fax: +(574)2551243

Mail: premex@premex.com.co

Sitio web: www.premex.com.co

Especies:



Descripción:

BIOPODAL™ es un suplemento conformado por biotina, metionina, azufre y zinc, ingredientes indispensables para las reacciones fisiológicas que promueven la formación de la queratina, componente esencial de los cascos.

Beneficios:

- Corrige y mantiene la integridad del casco.
- Mejora el casco en su espesor, dureza, resistencia y conformación.
- Actúa en forma directa en el crecimiento y fortalecimiento del casco.

Recomendaciones de uso:

- El nivel de suplementación depende del peso corporal del equino. Utilice 4 a 5 gramos por cada 100 kilogramos de peso.
- La suplementación debe ser continua y diaria durante 3 a 5 meses para mejorar la dureza del casco. Para uso preventivo: suministrar la dosis indicada en períodos de 1

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

mes cada 3 a 4 meses.

- Incluye copa dosificadora de 20 gr aproximadamente.

COMPOSICIÓN:

Composición	Contenido
Ácido valérico	6.8 mg
Ácido butírico	227.25 mg
Zinc	56.8 mg
Vehículo csp	5 g
Humedad	5%

PRESENTACIÓN: Envase plástico por 3 kg, incluye copa dosificadora de 20 g

REGISTRO ICA 6154 AL

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 124. (QUIMOTRIPSYN) LAB. VIRBAC



Laboratorio:



VIRBAC COLOMBIA LTDA

Carrera 54 76 20 Bogotá Colombia

Teléfono: (+571)2252100 018000122100

Mail: clientescolombia@virbac.com.mx

Sitio web: <http://www.virbac.co/contactenos>

Uso terapéutico: ANTIINFLAMATORIO

Principio Activo: QUIMOTRIPSINA

Especies:



Descripción:

QUIMOTRIPSYN es un antiinflamatorio de acción sistémica no corticoide

Composición	Contenido
Alfa quimotripsina	10.000 UNF
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Antiinflamatorio, fibrinolítico
- **INDICACIONES:** Inflamación de tejidos blandos de etiologías no infecciosas producidas por traumatismos o intervenciones quirúrgicas. En general está

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

indicado como coadyuvante en los procesos inflamatorios generales como: Mastitis, metritis, acrobustitis y orquitis, neumonía, bronquitis, entre otros.

- **DOSIS:** Bovinos 5 -10mL, Equinos 2.5-5 mL , Ovinos, Caprinos y Porcinos 1- 3 mL, Caninos y Felinos 1- 2 mL
Aplicar cada 12 a 24 horas. Vía intramuscular profunda.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No utilizar en animales destinados al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Manténgase fuera del alcance de los niños. Uso veterinario.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN:** Frasco ampolla por 10 mL.
- **REGISTRO:** 1625 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO


JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 125. (AMORISEN) LAB. ACOTIR

POLVOS AMORISEN

MUESTRA GRATIS



Astringente para Bovinos y Equinos
Uso Veterinario

Isabel Calderón de Jiménez
Tel.: 271 33 35 - Bogotá, D.C., Colombia
Industria Colombiana

COMPOSICION GARANTIZADA:

Cada 100 gramos de Polvos AMORISEN contienen:

Sulfato de Cobre	1,34 g.
Sulfato Ferroso	3,48 g.
Alumbre Potásico	2,19 g.
Cloruro de Amonio	2,68 g.
Sulfato de Zinc	1,30 g.
Excipiente c.s.p.	100,00 g.

Indicaciones: En bovinos y equinos como astringente. Coadyuvante en el tratamiento de laceraciones.

Administración: Tópica

Dosis: Aplicar el medicamento en la zona afectada dos veces al día, durante una semana o según criterio del Médico Veterinario.

Preparación: Disolver 100 g. de Polvos AMORISEN en 50 ml. de agua, en un recipiente no metálico, hasta formar una mezcla de consistencia pastosa.

Manera de aplicarlo: Lavar la zona afectada, tomando las precauciones antisépticas corrientes. Aplicar dos capas distintas: la primera contra el pelo, para llevar el medicamento hasta la epidermis (sin friccionar). La segunda capa, sobre la primera, bajando el pelo en sentido normal.

Duchar durante 15 minutos cada 3 ó 4 días, con un chorro suave o con una esponja para ver el resultado obtenido. Si es necesario aplicar nuevamente el tratamiento, hasta ver mejoría o según lo indique el Médico Veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Registro ICA No. 4630 - DB

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Lote No.

Almacénese en lugar seco

Vence:

Elaborado por Laboratorios Acotir

Para Isabel Calderón de Jiménez

Director Técnico: Dr. Samuel Tirado Mercado, Q.F. U. de C.
Bogotá, D.C., Colombia

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 126. (DOXICAN) PROVET



Laboratorio:



LABORATORIOS PROVET S. A.

Autopista Medellín Km 7 Cost. Occidental Parque Ind. CELTA

Teléfono: +(571)2259110

Fax: +(571)2299102

Mail: provet@laboratoriosprovet.com.co

Sitio web: www.laboratoriosprovet.com

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: DOXICICLINA

Especies:



Descripción:

DOXICAN es un antimicrobiano

Composición	Doxican 100	Doxican 200
Doxiciclina hclato	100 mg	200 mg

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Excipientes csp	1 tableta	1 tableta
-----------------	-----------	-----------

- **ACCIÓN:** Antimicrobiano
- **INDICACIONES:** En perros y gatos para el tratamiento de las infecciones causadas por: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Escherichia Coli., Pasteurella spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Lepstospira spp., Mycoplasma spp., y Ehrlichia canis. Antibiótico de amplio espectro a base de Doxiciclina, un análogo avanzado de la familia de las tetraciclinas con propiedades de mayor absorción, biodisponibilidad y actividad contra diferentes microorganismos. Ideal para tratamiento de Ehrlichia y Complejo respiratorio en caninos (tos de las perreras).
- **DOSIS:** Vía oral solo o mezclado con el alimento. En infecciones susceptibles: 10 mg/kg (en la práctica 1 tableta por cada 10 kg de peso) vía oral, cada 24 horas durante 5 días. Administrar con el alimento si se presentan disturbios gastrointestinales.. En Ehrlichiosis: 5 mg/kg vía oral, cada 12 horas, durante 7 días consecutivos, en casos agudos, y 10 mg/kg vía oral una vez al día durante 7-28 días en casos crónicos. En traqueo bronquitis infecciosa (Bordetella spp): 5 - 10 mg/kg, vía oral, dos veces al día. Otras indicaciones según criterio del médico veterinario.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No posee.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Tabletas orales
- **DOXICAN® 200:** Caja conteniendo 2 blíster por 10 tabletas cada uno. **LICENCIA DE VENTA:** Reg. I.C.A. N° 9270 MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 127. (SISTEMA ENDECTOCIDA) HOLLIDAY SCOTT S.A.



Laboratorio:



HOLLIDAY SCOTT S. A.

Int. Neyer 924 - (B1643GAT) Beccar - Buenos Aires - Argentina

Teléfono: (5411) 4732-0222

Mail: info@holliday.com.ar

Sitio web: www.holliday-scott.com

Uso terapéutico: ENDECTOPARASITICIDA

Principio Activo: IVERMECTINA

Especies:



Descripción:

SISTEMA ENDECTOCIDA es un endectocida oral

Composición	Contenido
Ivermectina	5 mg
Excipientes csp	1 Comprimido (580 mg)

- **ACCIÓN:** Antiparasitario endectocida
- **INDICACIONES:** Tratamiento de parasitosis externas como Demodicosis felina, Sarna notoédrica, Sarna otodéctica y Cheyletielosis, como también parasitosis internas a nematodos: Ascaris sp y Ancylostoma sp.
- **DOSIS:** Cheyletielosis: dosis oral curativa: 0,3 mg/kg (300 mcg/kg). Duración del tratamiento 2-3 dosis. Intervalo entre dosis: 21 - 35 días. Sarna notoédrica y sarna otodéctica: dosis oral curativa: 0,3 mg/kg (300 mcg/kg). Duración del tratamiento 2 dosis. Intervalo entre dosis: 14 días.

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

Demodicosis felina: dosis oral curativa: 0,3 mg/kg (300 mcg/kg). Duración del tratamiento hasta curación. Intervalo entre dosis: 14 días.

Ascaridiasis y Ancylostomiasis: dosis oral curativa: 0,3 mg/kg (300 mcg/kg).

Duración del tratamiento 2 dosis. Intervalo entre dosis: 15 días.

- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** No presenta contraindicaciones en esta especie. Puede producir toxicidad en humanos. En caso de ser ingerido llamar al médico o consultar a un centro toxicológico. Administrar el comprimido con o sin alimento. Se debe asegurar que el animal consuma toda la dosis.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Tableta oral
- **PRESENTACIÓN:** Caja con 3 o 6 blister de 10 tabletas cada uno
- **REGISTRO:** DB 5057-DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 128. (EQUIPO DE BURETROL) BAXTER



Descripción

ESPECIFICACIONES GENERALES: Equipo buretrol Baxter con capacidad de 150cc por unidad. Equipo para la administración volumétrica de soluciones parenterales Bureta con filtro de aire, punto de inyección para infusión intermitente, esterilizados con óxido de etileno. Para un solo uso.

COMPONENTES: PVC Atoxico.

USOS O MODO DE EMPLEO: Para administrar soluciones en forma volumétrica con filtro hidrofóbico que impide el ingreso de partículas, minimizando los riesgos de infección.

PRECAUCIONES: Utilice técnica aséptica, no debe ser almacenado a temperaturas extremas, no use el equipo si el empaque está abierto o dañado.

UNIDAD DE VENTA: Unidad.

REGISTRO INVIMA: 2005V-00718-R2

LABORATORIO: BAXTER

PAIS ORIGEN: ESTADOS UNIDOS

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

ITEM 129. (GRISEOFULVINA 250)



Laboratorio:



HOLLIDAY SCOTT S. A.

Int. Neyer 924 - (B1643GAT) Beccar - Buenos Aires - Argentina

Teléfono: (5411) 4732-0222

Mail: info@holliday.com.ar

Sitio web: www.holliday-scott.com

Uso terapéutico: ANTIMICOTICO

Principio Activo: GRISEOFULVINA

Especies:



Descripción:

GRISEOFULVINA 250 es un antimicótico

Composición	Contenido
Griseofulvina micronizada	250 mg
Excipientes csp	1 Comp

- **ACCIÓN:** Antimicótico
- **INDICACIONES:** Tiña. Dermatomicosis causadas por *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum* y *Trichophyton mentagrophytes*. Fungistático. Después de su administración por vía oral se absorbe a nivel gastrointestinal, depositándose selectivamente en la queratina neoformada del pelo, uñas y piel, pasando luego de estas capas profundas a la queratina superficial. Por lo tanto

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

la concentracion de Griseofulvina en las nuevas células de la epidermis, le proporciona actividad micostática contra los dermatofitos.

- **DOSIS:** Administrar 20-50 mg/kg dividida en 2 tomas diarias por un período no menor de 4-6 semanas, salvo en caso de Onicomycosis cuyo tratamiento debe realizarse por 6-12 meses.
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** No administrar en hembras preñadas. Se recomienda administrarlo con alimentos de alto contenido graso el cual conjuntamente con la micronización de la Griseofulvina y la toma diaria dividida, mejora la absorción y disminuye la posibilidad de vómitos. Uso veterinario, manténgase fuera del alcance de los niños
- **MODO DE APLICACIÓN:** Tabletas
- **PRESENTACIÓN:** Caja con dos blisters de 10 tabletas cada uno
- **REGISTRO:** DB 4104 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

TEM 130. (ENTEREX) VETNIL



INDICACIÓN DEL PRODUCTO

Enterex se indica como un adsorbente para toxinas y venenos en el tracto gastrointestinal de los caballos, ganado vacuno, búfalos, cabras, ovejas, cerdos, en los casos de envenenamiento, intoxicación y ayudar en diversos diarrea y gastroenteritis.

NIVELES DE GARANTÍA POR CADA 100 G

Carbon Activado 40 g

Zeolita 40g

Caolín..... 10 g

Pectina 10 g

COMPONENTES DESTACARON

Carbón activado: ha sido dueño de adsorbente, es decir, el poder de unir a las sustancias en su superficie, lo que le permite fijar las toxinas bacterianas y gases irritantes. También actúa como un revestimiento protector. Otra función es la de absorber diversas sustancias tóxicas o venenos en el tracto gastrointestinal. Sus propiedades se deben a la enorme área superficial del carbón activado, que hace que sea una “esponja dura”, el establecimiento de sustancias extrañas. Acción también tiene desinfectante y desodorizante.

Zeolita: Es un mineral de Cuba, que tiene en su constitución una clinoptilolita. Además de las propiedades similares al carbón activado, también tiene las siguientes características: acidosis metabólica anormal a través de efectos sobre la presión osmótica en la luz intestinal; adsorción: los ácidos biliares (endógena causa de la

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

diarrea), aflatoxina B (productores de micotoxinas toxicidad grave) y el exceso de glucosa (irritante), y el aumento de tránsito intestinal.

Caolín: Tiene un adsorbente y la protección, la formación de una capa protectora sobre la mucosa intestinal en, la prevención de la acción de sustancias irritantes. Acción que el carbón activado adsorbente con respecto al herbicida paraquat.

Pectina: Tiene acción protectora de la mucosa y su descomposición en el colon, realizado por bacterias, proporciona un entorno desfavorable para la flora bacteriana anormales.

CÓMO UTILIZAR

Para ser utilizado por vía oral, se diluye en agua y se administra mediante una jeringa o un tubo de catéter. Para utilizar la bolsita presentación en el agua, diluir cada sobre en 40ml. El producto también se puede añadir a la alimentación.

En los casos de diarrea y gastroenteritis:

Potros, terneros, ovinos, caprinos y cerdos: 80 ml por cada 100 kg de peso corporal, cada 8 a 12 horas.

Equinos, bovinos y búfalos adultos: 200 ml por cada 500 kg de peso corporal, cada 8 a 12 horas.

En los casos de envenenamiento e intoxicaciones:

Potros, terneros, ovinos, caprinos y cerdos: 160 ml por cada 100 kg de peso corporal cada 4-6 horas hasta la mejoría de los síntomas.

Caballos, vacas y búfalos adultos: 400 ml por cada 500 kg de peso corporal cada 4-6 horas hasta el alivio de los síntomas.

Observaciones:

1 – Más eficaz cuando se administra en la intoxicación aguda con rapidez, dentro de los 30 minutos después de la ingestión.

2-En los animales de estómago simple, la suspensión puede ser utilizado para el lavado.

Las dosis pueden modificarse de acuerdo con la orientación del médico veterinario.

PRESENTACIÓN

Caja con 10 sobres de 8g cada pantalla.

REGISTRO ICA 7737-MV

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

TEM 131. (OLD-TRANS) GABRICA

OL - TRANS



ESPECIES



APLICACION

Oral

DESCRIPCION

Suplemento vitamínico mineral energizante en polvo palatable para perros y gatos.

Suplemento vitamínico mineral energizante, condroprotector, condroreparador promotor de la colagenogénesis reconstituyente

Evita los fenómenos degenerativos osteoarticulares

- Reconstituyente
- Pre Gags
- Condroprotector
- Condoreparador
- Promotor de la Colagenogénesis

Composición:

L-Metionina:	2,5 g
Trifosfato de Adenosina (ATP):	75 mg
L-Cistina:	1 g
L-Lisina:	1,5 g
Cianocolabamina (Vitamina B12):	0,5 mg
Ácido Fólico:	25 mg
Colina citrato:	1,5 g
Calcio carbonato:	10 g
Magnesio Carbonato:	30 mg
D-Glucosa c. s. p.:	100 g

Acción:

Reconstituyente. Suplemento dietario.

Presentaciones: *Envase plástico por 80 gr y 800 gr con cuchara dosificadora.*

REGISTRO ICA 3423 DB

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

TEM 132. (HEPAVEX 200) LAB. COMERVET S.A.



Laboratorio:



COMERVET S. A.

Cr. 52 76 30, Bogotá - Colombia

Teléfono: +(571)2310611

Fax: +(571)6606982

Mail: info@comervet.com

Uso terapéutico: HEPATOPROTECTOR

Principio Activo: METIONINA, COLINA, CARNITINA, SORBITOL

Especies:



Descripción:

HEPAVEX 200 MASCOTAS es un protector hepático de uso oral

Composición	Contenido
D, L-metionina	10 g
Colina	13.98 g

ALMACEN VETERINARIO EDERAGRO

JORGE OMAR PRADA PINZON

NIT 91.224.296-2

L-carnitina	25 g
Sorbitol	200 g
Excipientes csp	1.000 ml

- **ACCIÓN:** Hepatoprotector
- **INDICACIONES:** **HEPAVEX 200® MASCOTAS** es un suplemento de aminoácidos, vitaminas y carbohidratos para perros y gatos. Optimiza las funciones hepáticas, incrementar la digestibilidad y promover la eliminación de toxinas de los animales, evitar hígado graso. La L-Carnitina es un poderoso transportador de ácidos grasos de cadena larga a través de la membrana celular, hacia las mitocondrias, donde la grasa es oxidada para producir energía, limitando la acumulación de grasa en tejidos y sangre.
- **DOSIS:** Caninos 2 ml / 10 kg de peso vivo en el agua de bebida. Felinos 1 ml / 5 kg de peso vivo en el agua de bebida
- **TIEMPO DE RETIRO:** No aplica
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Almacenar en un lugar seco y fresco protegido de la luz directa del sol. Manténgase fuera del alcance de los niños. Uso veterinario.
- **MODO DE APLICACIÓN:** Solución Oral
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 100 ml
- **REGISTRO:** 9959 SL