

COMUNIDAD APRENDICES PÉNJAMO

EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE HUEVO

FICHA: 2410323

ACTIVIDAD FORMATIVIA:

ENTREGA DE MATERIAL FOTOCOPIADO Y SOCIALIZACION DE SU CONTENIDO: “MANEJO SANITARIO DE GALLINAS PONEDORAS”

FECHA: 11/11/2021

Ponedoras: Enfermedades y parásitos

¿Cómo saber qué enfermedad tiene mi gallina? Detectar las **enfermedades** de las **gallinas** a tiempo en ocasiones es el único modo de asegurar su salud, así como que sigan produciendo. Existen un gran número **enfermedades y parásitos** que pueden afectar a las gallinas. Es fundamental aprender a reconocer sus síntomas, para detectar su aparición de forma pronta. Veremos que muchas patologías van a manifestarse a través de signos clínicos muy parecidos, por lo que es importante que contemos con un veterinario experto para poder llegar a un diagnóstico correcto. También será este el profesional adecuado para informarnos sobre las mejores medidas preventivas. Te relacionamos algunas enfermedades y parásitos:

Bronquitis infecciosa: causada por un coronavirus, el cual afecta sólo a pollos y gallinas. Se producen ruidos respiratorios incluyendo jadeos, estertores, tos, secreción nasal y ojos llorosos.

Coriza infeccioso: Esta enfermedad es producida por una bacteria llamada Haemophilus gallinarum. los síntomas presentes incluyen: estornudos, seguidos por una supuración maloliente e inflamación de los ojos y senos nasales.

Enfermedad respiratoria crónica (aerosaculitis): causada principalmente por Mycoplasma gallisepticum, aunque también se ha encontrado Escherichia coli. **L**os primeros síntomas se asemejan a los producidos por las enfermedades de New Castle y bronquitis infecciosa, tales como dificultad al respirar, mucosidad nasal y estertores de la tráquea.

Gumboro o bursitis: es causada por un birnavirus. Los brotes ocurren con más frecuencia cuando las aves tienen de 3 a 8 semanas de edad. el primer síntoma de la enfermedad de Gumboro o Bursitis es un ruido respiratorio. Otros síntomas que se pueden apreciar son decaimiento, plumas erizadas, temblores, diarreas acuosas y postración.

Influenza aviar: causada por un virus de la a familia Orthomyxovridae. Los síntomas muestran un ave con marcada depresión, plumas erizadas, inapetencia, sed excesiva, caída en la producción de huevo y diarrea acuosa. Esta última es de un color verde brillante, modificándose a casi totalmente blanca.

Enfermedad de Marek: enfermedad es causada por un virus herpes. algunos animales mueren sin presentar los síntomas característicos de la enfermedad; sin embargo, en la mayoría de los casos la afección se presenta en los nervios ciáticos, lo cual les produce cierto grado de parálisis de las patas y alas. Los animales se observan caídos con una pata estirada hacia adelante y la otra hacia atrás, y una de las alas caídas, como tratando de apoyarse en ella.

New Castle: es producida por un paramyxovirus. Los primeros síntomas son problemas respiratorios con tos, jadeo, estertores de la tráquea y un piar ronco, siguiendo luego los síntomas nerviosos característicos de esta enfermedad; en que las aves colocan su cabeza entre las patas o hacia atrás entre los hombros, moviendo la cabeza y cuello en círculos y caminando hacia atrás.

Viruela aviar: producida por el virus (Borreliota avium), trasmitida por un mosquito. En nuestro medio rural se le conoce como "bubas" y "pepilla". La viruela aviar se presenta en dos formas:

- La forma húmeda o diftérica, afecta las mucosas de la garganta, boca y lengua, provocando la formación de úlceras o falsas membranas amarillentas; y
- La forma cutánea o seca, que produce costras o granos en la cresta, barbillas y cara.

Cólera aviar: enfermedad muy contagiosa de los pollos, pavos y otras aves; causada por una bacteria llamada Pasteurella multocida. Puede presentarse en tres formas:

a. forma aguda, afecta a gran cantidad de animales y causa una mortalidad elevada. las aves dejan de comer y beber, perdiendo peso en forma rápida; pudiendo presentarse diarrea de color amarillo verdoso y una marcada caída en la producción de huevos. Puede ocurrir parálisis debido a las inflamaciones de las patas y dedos.
b. En la forma sobreaguda, produce la muerte súbita de animales aparentemente sanos.
c. puede adoptar la forma crónica, en la que la enfermedad se localiza, provocando inflamaciones en la cara y barbillas de las gallinas.

PARASITOS:

Internos: La mayoría de estos parásitos se observan a simple vista, especialmente la lombriz intestinal grande, llamada áscaris (Ascaridia galli) y la tenia o lombriz plana, conocida comúnmente como "solitaria".
Existen otras lombrices más pequeñas que a veces no se distinguen con facilidad a simple vista, como la cecal (Heterakis gallinae) y la capilar.
Como regla general se pueden desparasitar las aves a las ocho semanas de edad y repetir a las 18 semanas con algún vermífugo triple. Si se sospecha de la presencia de algún tipo de parásito en las heces, lo más recomendable es enviar muestras al laboratorio para ser analizadas y que ellos le recomienden el vermífugo a utilizar.

Protozoarios (Coccidiosis: coccidio Eimeria): Ataca principalmente el intestino delgado, los ciegos y el intestino grueso. Estos organismos destruyen las células del

tracto digestivo que normalmente son las que absorben los alimentos. Las formas agudas de la Coccidiosis producen serios daños en los tejidos, causando hemorragias y al final hasta la muerte.

Externos: ácaros, piojos, Garrapatas.

Newcastle



Colera aviar



Coriza infecciosa



Viruela aviar



laringotraqueitis



Ácaros



Control de enfermedades en gallinas ponedoras



Control de enfermedades en gallinas ponedoras

Un lote de pollonas o ponedoras puede rendir su potencial genético solamente si la influencia de enfermedades es minimizada. La aparición de diferentes enfermedades puede variar entre un efecto subclínico en el rendimiento hasta una mortalidad severa.

Las enfermedades de importancia económica varían grandemente entre lugares, pero en cada caso el desafío es identificar y controlar esas enfermedades.

1. Ingreso de personas

El movimiento del personal y del equipo dentro de la granja debe estar estrictamente controlado. Las visitas a la granja deben limitarse a aquellos que sean esenciales para su operación. Todos los visitantes y los trabajadores deben entrar solamente por un lugar central. Los visitantes deben utilizar el libro de registros para documentar sus visitas.