ORIGEN DE LOS BOVINOS







Bos indicus	Bos taurus
Pelo corto	Pelo largo
Pliegues cutáneos	Pocos pliegues cutáneos
Giba	Ausencia de giba
Piel pigmantada y elastica	Pelaje oscuro y pigmentado
Prepucio largo	Prepucio corto
Ombligo colgante	Ombligo no colgante
Ojos alargados o achinados	Ojos redondeados
Presencia de papada	Ausencia de papada
Mayor resistencia a parasitos	Menor resistencia a parasitos

TIPO DE GANADO

- TIPO LECHE



- TIPO CARNE



- TIPO DOBLE PROPOSITO



FACTORS MAXIMOS PARA ALCANZAR LA MAXIMA PRODUCCION

- Geneticamente buenos animales



- EXCELENTES PRADERAS



- SUMINISTRAR SUPLEMENTOS



- PLAN SANITARIO





DIVISION HATO GANADRO



LOTE DE APAREAMIENTO

Esta formado por vientres aptos productivamente como son: hembras paridas con mas de 2 meses, vacas horras y novillas de vientre con peso no < 320 Kg. 25-30 vacas / toro.



MONTA NATURAL

- LIBRE PERMANENTE:



- LIBRE MODIFICADA



- CONTROLADA



LOTE DE MATERNIDAD

- Esta conformado por todas las hembras próximas al parto.



MANEJO DEL PARTO

OBSERVAR EL PARTO



CURACION OMBLIGO



LIMPIAR MUCOSIDADES

LOTE DE DESTETOS

- Esta conformados por animales machos y hembras de 7 -8 meses de edad, el grupo va junto por 90 – 120 días, luego se separan en grupos diferentes.





LOTE DE NOVILLAS

- Aquí permanecen hasta que esten aptas para la reproducción 320-350, 22-24 meses





LOTE DE MACHOS

- Novillos y toretes salen para ceba o toretes de remplazo.





LOTE DE CEBA

- Duran hasta alcanzar un peso de 450 -500 Kg, con una edad + o – 3 años.





PREGUNTAS

