COLEGIO MANUELA BELTRÁN I.E.D. 1914

CONTAGIO

VIRUELA DEL MONO



@webconsultas_healthcare





SANGRE



LESIONES PIEL
(COSTRAS)



FLUIDOS
(RELACIONES SEXUALES)



GOTAS
RESPIRATORIAS
(TOS)



OBJETOS
CONTAMINADOS
(TOALLAS)




CARNE
CONTAMINADA
(MAL COCINADA)



PLACENTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

VIRUELA
HUMANA vs SÍMICA



La viruela símica es conocida desde hace más de 50 años, pero ha tomado protagonismo tras el surgimiento de un nuevo brote fuera de África. Conoce las características de esta enfermedad y sus diferencias respecto de la viruela humana.

VIRUELA HUMANA

- **Era producida por el virus *variola*** y la transmisión se daba entre personas.
- Se cree que **acompañó a la humanidad por, al menos, 3 mil años.**
- **Resultaba fatal en hasta 30% de los casos,** tan solo en el siglo XX ocasionó 300 millones de muertes.
- **Entre sus síntomas estaban:** fiebre, dolor de cabeza, lumbar y muscular, además de fatiga y pústulas en la cara y las extremidades.
- Gracias a un esfuerzo de vacunación mundial, **en 1980 fue declarada como erradicada.**

VIRUELA SÍMICA

- **La provoca el virus de la viruela símica,** transmitido al humano por primates y roedores.
- **Se detectó en personas en 1970** en la República Democrática del Congo, África.
- Los síntomas son similares a los de la viruela humana, pero **un aspecto distintivo es la inflamación de los ganglios linfáticos.**
- **La mortalidad del virus** que actualmente circula fuera de África es menor al 1%
- **Las vacunas utilizadas contra el virus *variola*** pueden prevenir la infección o atenuar los síntomas.