INFORME HOGAR AMIGO FIEL

Visitas realizadas los días: 23 de julio, 9, 16 de agosto

Se realiza atención principalmente a la población en general, además de casos puntuales que requiere un tratamiento muy exhaustivo, se procura mantener un manejo dentro del albergue por el riesgo actual de distemper, pero son remitidos a la clínica los animales que requiere otro tipo de atención.

Se encuentran en general buenas condiciones de salud y se describen a continuación patologías puntuales evaluadas y tratadas.

PANTERA: Continua con secreción nasal bilateral mucopurulenta, sin epifora, con estornudos, auscultación pulmonar con estertores leves bilaterales, está comiendo bien, ella misma se quitó la sonda esofágica antier, la herida se encuentra bien cerrada, sin secreción.

- Iniciar FLUIMIXOL SOBRES 600 MG: Diluir 1 sobre en ½ vaso de agua y administra vía oral 2 ml cada 12 horas por 15 días

GATA VIEJITA GRIS: Viene con problemas respiratorios hace varios días, la están tratando con antibiótico y he mejorado mucho. A la ev. Clínica paciente atenta al medio, auscultación cardiopulmonar a/n, sin secreción nasal, ni ocular, RT y RPP negativos.

La paciente ya se puede pasar a la gatera.

MONIN (Felino): Ven que ha perdido pero los últimos meses, presenta pelo hirsuto, enfermedad periodontal, normotérmico, auscultación cardiopulmonar a/n, condición corporal 2/5.

Se toma Perfil Prequirúrgico A.

LA MONA (Felina): Ven que ha perdido pero los últimos meses, presenta pelo hirsuto, enfermedad periodontal, normotérmico, auscultación cardiopulmonar a/n, condición corporal 2/5.

Se toma Perfil Prequirúrgico A.

TAYSON (Canino): Paciente de edad avanzada, sufre de la columna, en el momento no presenta alteraciones a la marcha, ni se ha quejado, presenta reflejo panicular positivo a todo lo largo de la columna, pero no presenta signos de dolor.

- Iniciar GLUCOSAMINA/CONDROITINA: 1 Cápsula cada 24 horas de manera indefinida.

LAIKA: Paciente que sufre de la columna, toma Tramadol diariamente, A la ev. clínica presenta reflejo panicular positivo a todo lo largo de la columna con signos de dolor leve.

- Iniciar GLUCOSAMINA/CONDROITINA: Administrar vía oral 1 cápsula cada 24 horas de manera indefinida.

TOBY: Presenta 2 masas, una a nivel de la parte posterior de la mandíbula derecha de alrededor de 3 cms de diámetro, de consistencia semiblanda, redondeada, móvil, indoloro, en tejido subcutáneo, otra masa también de 3 cms de diámetro, a nivel de arco costal izquierdo, subcutánea, de consistencia semiblanda, móvil e indolora.

Se recomienda extracción de ambas masas + patología.

PELAGRA: Hace más o menos 3 meses la operaron de ligamento cruzado de MPD, se recuperó muy bien, pero desde hace 15 días la ven que apoya mal y esta como coja de esa pata.

A la ev. clínica paciente presenta cojera intermitente de MPD, presenta crepitación a la flexion y extensión de dicho miembro con signos de dolor moderado.

Se recomienda Revisión ortopédica.

PININA: Manifiesta enfermedad respiratoria y cojeras frecuentes, a la Ev. clínica auscultación cardiopulmonar sin alteraciones, no presenta cojeras y manifiesta sx de dolor moderados a la palpación de las caderas.

- GLUCOSAMINA/CONDROITINA 1 cápula cada 24 horas de manera indefinida
- EGYSTOL 1 tableta cada 24 horas de manera indefinida.

MARTHA: Presenta dermatitis crónica, se mejora con los baños, pero vuelve y recae. A la ev. clínica presenta piel del pecho y vientre engrosada, melanizada, costrosa, prurito y al interior de las orejas lesiones similares.

- Se recomienda tomar Perfil tiroideo E (en ayunas)

TOMATE: Presenta epifora verdosa frecuentemente, le aplican gotas Ciprovet, se mejora, pero le vuelve a salir de nuevo.

A la ev. clínica presenta epifora mucopurulenta bilateral en canto medial, no se observa irritación de esclerótica o conjuntival, sin blefarospasmo.

Se recomienda cambio de tantibiótico tópico.

- TERRAMICINA UNGÜENTO OCULAR: Aplicar en cada ojo cada 12 horas por 15 días
- TEARS LAGRIMAR ARTIFICIALES: Aplicar 1 gota en cada ojo cada 12 horas por 15 días.

DANGER: Presenta epifora mucopurulenta bilateral, irritación de la esclerótica ni en mucosa palpebral, en el hocico región derecha e izquierda presenta piel engrosada, melanizada, al igual que alrededor de los ojos y al interior de los oídos,

al interior de los oídos también presenta secreción serosa y cerumen color café oscuro.

- TERRAMICINA UNGÜENTO OCULAR: Aplicar en ambos ojos cada 12 horas por 15 días
- DERMOSYN SPRAY: Aplicar con gasa o algodón en hocico y parpados cada 12 horas por 1 mes
- EPIOTIC SOLUCION OTICA: Realizar limpieza de cada oído cada 12 horas por 1 mes
- PANOLOG GOTAS OTICAS: Luego de la limpieza con el Epiotic, aplicar 4 gotas en cada oído, realizar masaje de la base de la oreja por 30 segundos, cada 12 horas por 1 mes.

COCO: Paciente de edad con multiples alteraciones en la columna, en ocaciones le dan crisis de dolor, por el momento ha estado estable, por el momento solo toma tramado, le han salido masas en el lomo.

Paciente presenta signos de dolor moderado a la palpación de toda la columna, presenta 2 masas paralelas en el lomo, de alrededor de 2 cms de diámetro, en piel, móviles, consistencia semidura e indoloras y la otra de 4 cms de diámetro ubicada cerca a la última costilla de arco costal izquierdo de 4 cms de diámetro subcutánea, móvil, de consistencia semiblanda, indolora-

- Continuar con Tramadol
- Iniciar Glucosamina/Condroitina 1 cápsula cada 24 horas de manera indefinida
- Traumeel 1 tableta cada 24 horas de manera indefinida
- Se recomienda Extracción de masas + patología.

DINO: Hace 15 días presenta lagañas, se ha manejado Ciprovet gotas, pero no mejora.

A la ev. clínica presenta irritación de la esclerótica y de la conjuntiva palpebral de ojo derecho, presenta masa de 1 mm en el parpado superior derecho la cual tiene contacto con la córnea, otra masa de 2 mm en el canto lateral de parpado inferior, epifora mucopurulenta, opacidad corneal y neovascularización, se realiza Test de Fluoresceina el cual sale negativo.

Se recomienda revisión Oftalmológica lo más pronto posible.

MARCEL: Presenta epifora mucopurulenta bilateral desde hace varios días, le aplican Ciprovet gotas, pero no mejora, pabellón auricular y parte interna de las orejas presenta resequedad, piel engrosada y prurito.

- TERRAMICINA UNGÜENTO OCULAR: Aplicar en cada ojo cada 12 horas por 20 días

- TEARS LAGRIMAS ARTIFICIALES: Aplicar 1 gota en cada ojo cada 12 horas por 20 días
- Aplicar Vaselina en la parte interna de cada oreja.