

PROTOCOLO DE VACUNACION

1. OBJETIVO: Realizar actividades de administración de cualquier inmunobiológico con el fin de inducir o transferir inmunidad artificialmente a una persona.

2. ALCANCE: Aplica las normas generales y operacionales para la aplicación de las vacunas en personas.

3. DEFINICIONES: Es la administración de cualquier inmunobiológico con el fin de inducir o transferir inmunidad artificialmente, en un lugar destinado para tal fin.

4. Responsables: Auxiliares de enfermería

5. PROCEDIMIENTO

PREPARADO DEL TERMO Y ELEMENTOS PARA VACUNACION

1.- Sacar los paquetes fríos del congelador, colocarlos sobre una superficie limpia y dejarlos ambientar o “sudar” aproximadamente, luego colocarlos dentro de los termos, compruebe que la temperatura este entre +2°C y +8°C,

2.- Revisar fecha vencimiento del biológico, características, dosis por vial, diluyente, antes de ubicarlo en el termo de trabajo diario

3.- Colocar el biológico de la jornada en 1 recipiente hermético que evite el contacto del agua con los viales e introdúzcalo en el termo con sus respectivos paquetes fríos que deben estar secos, en donde irán las vacunas que se aplicaran en la Jornada.

5.- Prepare : Papelería: Registro diario habitual y de susceptibles; Carnets de vacunación , Elementos para vacunación: Jeringas con agujas calibre 22, 23, 25, 26 respectivamente, Torundas secas, Agua destilada.

6.- Elementos para eliminación de residuos peligrosos: Bolsa roja, bolsa verde para recolección de desechos según indicación en consultorio; Guardián para eliminación de elementos corto punzantes.

7.- Elementos para lavado de manos: Gel antiséptico, detergente antiséptico, toallas de papel.

8.- *Guantes para recoger todos los desechos que hayan caído al piso y que se encuentren con material contaminado.*

6.- LAVADO DE MANOS Y USO DE GEL ANTISÉPTICO EN TERRENO.

LAVADO DE MANOS:

1.- *Retirar del pulso y los dedos todos los artículos u objetos como anillos, relojes, pulseras, etc.*

2.- *Humedecer las manos con aproximadamente 3 cc de gel antiséptico.*

3.- *Friccione hasta que el gel se evapore.*

4.- *Después de **5 a 10** aplicaciones continuas del gel antiséptico y si el sitio lo provee llevar a cabo el lavado de manos con agua y jabón respectivamente, teniendo en cuenta cada uno de los pasos para un correcto lavado de las mismas.*

5.- *Cuando sean vacunaciones domiciliarias solicitar a la persona de la casa permiso para lavarnos las manos, antes y después de cada procedimiento y en cada una de los domicilios a donde vayamos a llevar a cabo la vacunación.*

7.- MANIPULACIÓN DE LOS BIOLÓGICOS: ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE EN TERRENO.

- 1.- *Tener en cuenta siempre las normas de cadena de frío.*
- 2.- *Revisar temperatura del termo cada 2 horas.*
- 3.- *Cambiar en el día los paquetes refrigerantes cuando esté 2/3 partes descongelados.*
- 4.- *Proteja del sol el termo y durante el transporte en el vehículo, ubicarlo en lugar diferente al piso y retirarlo de fuentes de calor.*
- 5.- **GESTIÓN AMBIENTAL:** *Los viales vacíos y con sobrantes de biológicos, torundas, jeringas, agujas, jeringas, guantes, etc, se deben desechar en sus recipientes respectivos para tal fin, **POR NINGUN MOTIVO SE DESECHAN AL AIRE LIBRE ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE VACUNACION.***

8.- APLICACIÓN DE INMUNOBIOLOGICOS

- 1.- **Inducción:** *Se saluda muy amablemente a las personas que se van a vacunar, explicándole la clase de biológico que se les va a aplicar, posibles reacciones adversas y todos aquellos interrogantes que las personas formulen.*
- 2.- *Lávese las manos, en caso tal que nos encontremos en un sitio donde no haya dicho elementos para el lavado respectivo, procederemos a utilizar gel antibacterial como se indicó anteriormente y/o toallas húmedas antibacteriales*
- 3.- *Aplicar inmediatamente, en el sitio y vía de administración correspondiente (revise instrucción del Laboratorio productor del biológico: numero de aguja, ángulo de aplicación, área de aplicación), previa asepsia de la piel con algodón y agua estéril, en forma circular o de caracol de adentro hacia fuera (pintando una coma) una sola vez.*
- 4.- *Frecuencia y duración Permanente. Durante la jornada de trabajo.*

9.- GESTIÓN AMBIENTAL

1.- Deposite la aguja directamente de la jeringa en la ranura que indica el contenedor (**guardián**), Cuando esté lleno hasta la señal (3/4), tape, rotule. Para luego ser entregado a la empresa contratista, encargada de recolectar dichos elementos para su incineración.

2.- Los frascos (viales) vacíos de los inmuno biológicos y los viales con sobrantes de vacuna que se desechan, se depositaran en un contenedor plástico para tal fin, por ningún motivo se puede colocar en bolsas.

3.- En la bolsa roja se depositará: Torundas, jeringas utilizadas, guantes, tapas de vacunas, Etc.

4.- En la bolsa verde se depositará: las toallas de papel, el papel de las jeringas, los capuchones, hojas de papel, cartón, empaques de jeringas, insertos. En general material limpio no reciclable.

5.- En la bolsa gris se depositará: hojas de papel, cartón. En general material limpio reciclable.

10.- REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO

1.- Una vez inmunizado el usuario proceda a registrar con letra clara en el carnet de vacunas respective, según dosis: día, mes, año del día que fue vacunado, numero de lote, en algunos casos fecha de vencimiento de lote de la vacuna IPS vacunadora, próxima cita (día, mes, año), nombre del vacunador y entregar el carné.

2.- Registrar en el formato de registro diario de vacunación según sea el caso, registro habitual, registro de susceptibles o registro individual de vacunación que se lleva.

MANIPULACIÓN DE LOS BIOLÓGICOS: ALMACENAMIENTO AL FINAL DE LA JORNADA.

1.- En el consultorio si la temperatura del termo de trabajo en terreno se ubica entre +2 y +8 C. Y si hay viales de biológico sin abrir guardar correctamente el biológico que se encuentre en el termo para utilizarlo al día siguiente de trabajo. Tenga en cuenta la política de frascos abiertos que aplica en consultorio.

2.- El termo se lava con agua y jabón desinfectante y sin fragancia, séquelo, posteriormente llevar a cabo la desinfección del mismo y ubicarlo en el estante sin tapa para que se ventile.

3.- Los paquetes refrigerantes se lavan con agua y jabón desinfectante y sin fragancia, séquelo y verifique que tengan suficiente agua para luego ubicarlos en el congelador.