HOGAR AMIGO FIEL – MAYO 6 2019

Se realiza visita con el fin de identificar la evolución de los pacientes tratados en la visita anterior además de otros a tratar.

BENJAMIN (FELINO CRIOLLO): Se evidencia respuesta positiva al tratamiento, una vez aumente de peso puede ser integrado nuevamente en la gatera manteniéndolo en contante observación.

BOBITO (FELINO CRIOLLO): Paciente continúa con secreción ocular en ojo derecho y leve secreción en ojo izquierdo. Se recomienda continuar con tratamiento con 3ª ofteno en ambos ojos cada 8 horas y tobramicina cada 8 horas en ambos ojos. Antes de aplicar gotas, realizar limpieza con algodón y solución salina fisiológica.

El paciente está respondiendo lentamente al tratamiento, aún requiere de este, se realiza evaluación física y se establece que requiere prolongación del tratamiento.

EL CHINO (GATO CRIOLLO BLANCO CON AMARILLO): presenta secreción ocular en ojo derecho, se recomienda iniciar tratamiento con tobramicina cada 8 horas, durante 1 semana.

Responde satisfactoriamente a la medicación, se le suspende de forma definitiva.

LUCIFER (GATO NEGRO): Continua con secreción ocular mucopurulenta en ojo derecho, se recomienda realizar limpieza del ojo antes de aplicar tobramicina cada 8 horas, durante 1 semana e iniciar lagrimas artificiales, esperar 5 minutos entre cada aplicación.

El paciente no presenta evolución positiva, se recomienda continuar el tratamiento.

MAMA GRIS (FELINO CRIOLLO): Presenta herida no infecciosa en axila, se recomienda poner collar isabelino permanente y manejar crema cicatrizante en caso de no mejorar se debe debridar bordes para favorecer cicatrización.

Paciente no evoluciona de la manera esperada, se pone en consideración realizar procedimiento que permita realizar una sutura en la herida y lograr una mejor evolución de la misma.

CIELO (LABRADOR CRUCE): Presenta otitis en ambos oídos, secreción café, eritema e inflamación de ambos conductos auditivos, se inicia tratamiento con gentax otico, dos veces al día, durante 1 semana y luego1 vez al día durante 1 semana más. Antes de aplicar gentax realizar limpieza de conductos de herida de corrección de otohematoma, continúa con secreción serosa en ambos ojos, debe continuar tratamiento con gotas. Se recomienda escisión de masas de canto lateral de ambos ojos y de masa perianal.

Paciente respondió de manera positiva a tratamiento con corticoide, se encuentra en constante observación para evitar que dichas masas continúen creciendo.

CHECHI (CRIOLLA): Presenta masa a nivel esternal del lado izquierdo no dolorosa, no movible, se recomienda vigilar crecimiento si manifiesta algún tipo de dolor, se observa pérdida de masa muscular en miembros posteriores dolor a la palpación nivel lumbosacro. Se recomienda manejar traumeel 1 tableta cada 12 horas.

Paciente sin evolución en crecimiento de la masa identificada.

PALOMO: Se observa lesión por hongos en nariz que se encuentra cicatrizando bien, se recomienda continuar con tratamiento con imaverol y completar los 7 días con cefalexina.

Se suspende tratamiento por evolución satisfactoria.

ROSARIO: Presenta hernia umbilical, se recomienda corrección quirúrgica, presenta resequedad y leve secreción en ojo derecho, debe continuar con tratamiento de lágrimas artificiales 2 veces al día.

Se adiciona al tratamiento ciclosporina para contribuir a la mejoría de la resequedad en ojo derecho.

GRANADILLO: Presenta leve inflamación de ambos conductos auditivos, leve secreción color café, eritema y dolor a la limpieza, se recomienda realizar limpiezas con oticlear 2 veces al día y luego aplicar gentax otico 2 veces al día durante 1 semana.

CONCHA: Continua con dificultad para desplazarse, a la evaluación clínica presenta dolor a la palpación de la columna lumbar y lumbosacra, debe continuar tratamiento con tramadol, glucosamina y traumeel1 tableta 3 veces al día. Paciente obesa que empeora el cuadro de dolor, se recomienda realizar profilaxis.

PIPONCHA: Paciente obesa, continua con dificultad para desplazarse, a la evaluación clínica presenta dolor a la palpación de columna lumbar y lumbosacra. Debe continuar tratamiento con tramadol, glucosamina y traumeel1 tableta 3 veces al día.

CACHETES: Presenta masa grande ulcerada que compromete 2 ultimas glándulas mamarias del lado izquierdo, se recomienda extracción de masa, se recomienda iniciar cefalexina1 capsula cada 12 horas, durante 7 días, ketoprofeno 1 vez al día, durante 4 días, alternar crema traumeel y saniderm, realizar limpieza antes de aplicar cremas.

Se realizó corrección quirúrgica.

MARTA: Presenta lesión en la piel a nivel lumbar con descamación y alopecia, se recomienda realizar baños con clohexidyn cada 8 días, durante 1 mes.

MARBELLA: Masa a nivel esternal y otra a nivel de costillas del lado derecho, no dolorosas, se recomienda extracción quirúrgica.

Se realizó extracción necesaria.