| | E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio | CÓDIGO | GE-F-002 |
|---|---|---|---|
| | GE- Gestión Estratégica | VERSIÓN | 02 |
| | **ACTA DE REUNIÓN** | CREACIÓN | 2020-02-24 |
| | | REVISIÓN | 2020-08-21 |

**ACTA No.** 13 .

**NOMBRE DEL COMITÉ o REUNIÓN**

COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO

| Fecha de la reunión: | Hora de Inicio: | Hora de Terminación: |
|---|---|---|
| 05/05/2023 | 07:30 Hrs | 08:30 Hrs. |

**OBJETIVO**

-GPC Enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años del ministerio de Salud y Protección Social nacional

**TEMAS**

1. Socializar al grupo de médicos de la institución, la GPC de enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años. del ministerio. de Salud y Protección Social. nacional

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Dando continuidad al cronograma. del Comité técnico científico se inicia reunión de Comité técnico Científico con socialización de la GPC de la enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años del ministerio de Salud y protección Social nacional. a cargo de la Dra. Yennyffer Robayo, quien inicia la exposición con Biografía, principales objetivos de la charla, definiciones, epidemiología, factores de riesgo y factores protectores para EDA, seguido de. Puntos clave a tener en cuenta durante la anamnesis, Recomendaciones dadas por la GPC. se continua con los objetivos del tto según reglas de este, proceso de hidratación ideal, alimentación en el niño con EDA, Suplementación con zinc, así como manejo de la EDA según AIEPI. se especifican diagnósticos y manejo de la disenteria, Signos y Síntomas de alarma para reconsultar, se resuelven dudas e inquietudes. se aplica evaluación de adherencia del tema.

2. por parte de la Coordinación médica se da la bienvenida oficial a los Dr's Miguel Cazón y Luis G. Zambrano quienes se unen como parte del grupo de médicos de la institución, a quienes durante el proceso de contratación se les realizó la debida inducción, socialización de



Powered by CamScanner

Cronograma de turnos, se explica funcionamiento del Sistema de Información de historias clinicas (cityfsalud), registros de data epidemiologica, atención de valoraciones medico legales. se insiste en mantener buenos canales de comunicación asertiva junto con un buen ambiente laboral.



Powered by CamScanner

| | E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio | CÓDIGO | GE-F-002 |
|---|---|---|---|
| | GE- Gestión Estratégica | VERSIÓN | 02 |
| | **ACTA DE REUNIÓN** | CREACIÓN | 2020-02-24 |
| | | REVISIÓN | 2020-08-21 |

**COMPROMISOS:**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| 1. Uso adecuado de EPP's | Medicos. | |
| 2. | | |
| 3. | | |

**Los Asistentes a esta reunión firman en el formato de Asistencia No.** 13.
**Fecha y hora de la próxima reunión:**

**Realizado por:**

Dra. Yennyfer Robayo L.
C.C. 1.016.437.979
Medico General
UAN

**Firma**
**Nombre:** Yennyfer Robayo Leal.

**Aprobado por:**

**Firma**
**Nombre:**



Powered by CamScanner

7:51 57%

# Información de la llamada

Personas | Información | Actividades

Añadir a alguien

Compartir inform




Buscar a alguien en esta llamada

En la llamada

- YENNYFER ROBAYO LEAL (tú) — Anfitrión de la reunión
- YENNYFER ROB... — Anfitrión de la reuni...
- YENNYFER ROB... — Anfitrión de la reuni...
- Grismaldo Lopez
- hector valbuena
- Juan Alejandro ...
- Juliana Silva
- Maria Acevedo
- MIGUEL ANDRE...

Powered by CamScanner

8:01 71%

# Información de la llamada

Personas | Información | Actividades

Añadir a alguien

Compartir inform




Buscar a alguien en esta llamada

En la llamada

- YENNYFER ROBAYO LEAL (tú)
  Anfitrión de la reunión
- YENNYFER ROB...
  Anfitrión de la reuni...
- YENNYFER ROB...
  Anfitrión de la reuni...
- Fernando Almon...
- Grismaldo Lopez
- hector valbuena
- Juliana Silva
- Maria Acevedo
- MIGUEL ANDRE...

Powered by CamScanner

| | E.S.E HospitalNuestra Señora del Carmen de Tabio | CÓDIGO | TH-F-001 |
|---|---|---|---|
| | TH - Gestión Talento Humano | VERSIÓN | 01 |
| | **ASISTENCIA** | CREACIÓN | 2020-02-05 |
| | | REVISIÓN | 2020-02-05 |

| Organizado por: | Facilitador | Fecha | Hora Inicio | Hora Final | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| Coord. Medica | Dra. Robayo. | 05/05/2023 | 07:30 | 08:30. | 13 |

| | |
|---|---|
| **Tema:** | - GPC Enf. Diarreica aguda en menores de 5 años del Ministerio de Salud y Protección Social nacional. |
| **Objetivo:** | 1. Socializar al grupo de Médicos de la institución. la GPC de enfermedad diarreica aguda del ministerio de salud y protección Social Nacional. |

| Seleccione: | Instrucción: | Capacitación: | Reunión: | si es Reunión No. De Acta: |
|---|---|---|---|---|
| | ☐ | ✓ | ✓ | 13 |

| No. | No. Documento | Nombres y Apellidos | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1072717581 | Catalina María Moreno Torres | Medica SSO | Catalina M. |
| 2 | 1032491657 | Camila Ivonne Ramirez Duarte | Medica general | Camila Ramírez |
| 3 | 1032431551 | Hector Javier Avellaneda Sanchez | Medico General | |
| 4 | 1075665463 | Alyne Gamet Alvarez | Medico Gral | |
| 5 | 1075658161 | Iwa Ramirez | Medico General | Iwa R. |
| 6 | 1018437979 | Yennyfer Robayo Leal | Coord. Medica. | |
| 7 | 1015407882 | Ana Maria Ruiz | Pediatra | Ana Ruiz |
| 8 | | | | |
| 9 | | ASISTENTES VIRTUALES | | |
| 10 | 1065577047 | Juan Alejandro Rodriguez G. | Medico | |
| 11 | 1018414705 | Maria Paula Acuña B. | Medico. | |
| 12 | 1020819796 | Juliana Silva Gutierrez | Medico | |
| 13 | 804211389 | Yuto Foto Alvarado | Medico | |
| 14 | 1013586368 | Miguel Andres Cerzón C. | Medico | |
| 15 | 1080187459 | Luis Gismelobo Zambrano | Medico | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

Observaciones:



Powered by CamScanner

# GPC ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS




- YENNYFER ROMERO LEAL
- MÉDICO GENERAL
- E.S.E HOSPITAL NSC TABIO


1

# BIBLIOGRAFÍA

Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia

AIEPI

Cuadro de Procedimientos

2

# OBJETIVOS

- Orientar al personal medico sobre la prevención, clasificación, diagnóstico y el tratamiento farmacológico y no farmacológico de la enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños menores de cinco años.
- Diagnosticar oportunamente la enfermedad diarreica aguda, disminuyendo las complicaciones y a su vez el indice de mortalidad por su causa en menores de 5 años.

3

# DEFINICIÓN

- Aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal.
- Tiempo menor de 7 días.
- Puede estar asociado a dolor abdominal, vómito y fiebre.



4

# EPIDEMIOLOGÍA



| | | | |
|---|---|---|---|
| DIARREA VIRAL | 80 - 85% | DIARREA BACTERIANA | 15 - 10% |
| DIARREA PARASITARIA | 5% | | |


5

# FACTORES DE RIESGO PARA EDA


- Suspender o ausencia de lactancia materna de forma exclusiva en menores de 3 meses.
- Uso de biberones.
- Índices antropométricos Z-P/T, Z-T/E ó Z- P/E, por debajo de –2 DE.
- Edad menor de 1 año, principalmente menor de 6 meses
- Antecedente de bajo peso al nacer (peso menor de 2.500 gr)
- Falta rutinaria de higiene de manos del niño y de sus cuidadores
- Presencia de cualquier tipo de inmunodeficiencia .
- Nivel socioeconómico.
- Naxa de contagio

6

Powered by CamScanner





7





8




9




10





11




12


Powered by CamScanner





13





14





15




16





17





18


Powered by CamScanner




19




20




21




22




23

Powered by CamScanner

# GPC EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Evaluación de adherencia

Correo electrónico *

hector_9b@hotmail.com

NOMBRE *

HECTOR VALBUENA

IDENTIFICACIÓN *

1032421357

CARGO *

MEDICO

1. La enfermedad diarreica aguda podemos definirla como un aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal, en un tiempo no mayor de 7 días. * 2 puntos

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO





2. ¿Cuál es la principal causa etiológica de la enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años? * 2 puntos

- (●) VIRAL 80-85%
- ( ) BACTERIANA 15-10%
- ( ) PARASITARIA 5%

3. ¿Cuales son considerados como factores de riesgo para en desarrollo de la enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años?. * 2 puntos

- ( ) Suspender la lactancia materna antyes de los 6 meses de vida del menor
- ( ) Estado de desnutrición
- ( ) Nivel socioeconómico bajo
- ( ) Noxa de contagio
- (●) Todas las anteriores

4. La dosis que debe ser suministrada de sulfato de zinc en los niños con enfermedad diarreica aguda y durante cuánto tiempo es: * 2 puntos

- ( ) En menores de 6 meses: 5cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) En mayores de 6 meses: 10cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) Ninguna de las anteriores
- (●) Todas las anteriores





5. El esquema ideal de hidratación profiláctica en menores con EDA es: * 2 puntos

En menores de 2 años——— 100 - 200mL

En niños de 2 años a 10 años— 50 a 100 mL

En mayores de 10 años——— tanto como deseen

- [ ] VERDADERO
- [x] FALSO

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios



Powered by CamScanner

# GPC EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Evaluación de aprendizaje

Correo electrónico *

[redacted]

NOMBRE *

JULIO FERNANDO ALMONACID

IDENTIFICACIÓN *

[redacted]

CARGO *

MEDICO

1. La enfermedad diarreica aguda podemos definirla como un aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal, en un tiempo no mayor de 7 días. * 2 puntos

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO





2. ¿Cuál es la principal causa etiológica de la enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años? * 2 puntos

- (●) VIRAL 80-85%
- ( ) BACTERIANA 15-10%
- ( ) PARASITARIA 5%

3. ¿Cuales son considerados como factores de riesgo para en desarrollo de la enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años?. * 2 puntos

- ( ) Suspender la lactancia materna antyes de los 6 meses de vida del menor
- ( ) Estado de desnutrición
- ( ) Nivel socioeconómico bajo
- ( ) Noxa de contagio
- (●) Todas las anteriores

4. La dosis que debe ser suministrada de sulfato de zinc en los niños con enfermedad diarreica aguda y durante cuánto tiempo es: * 2 puntos

- ( ) En menores de 6 meses: 5cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) En mayores de 6 meses: 10cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) Ninguna de las anteriores
- (●) Todas las anteriores





5. El esquema ideal de hidratación profiláctica en menores con EDA es: * 2 puntos

En menores de 2 años——— 100 - 200mL

En niños de 2 años a 10 años— 50 a 100 mL

En mayores de 10 años——— tanto como deseen

- [ ] VERDADERO
- [x] FALSO

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios



Powered by CamScanner

# GPC EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Evaluación de adherencia

Correo electrónico *

[redacted]

NOMBRE *

IVON NATALIA RAMIREZ

IDENTIFICACIÓN *

[redacted]

CARGO *

MEDICO

1. La enfermedad diarreica aguda podemos definirla como un aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal, en un tiempo no mayor de 7 días. * 2 puntos

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO





2. ¿Cuál es la principal causa etiológica de la enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años? * 2 puntos

- (●) VIRAL 80-85%
- ( ) BACTERIANA 15-10%
- ( ) PARASITARIA 5%

3. ¿Cuales son considerados como factores de riesgo para en desarrollo de la enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años?. * 2 puntos

- ( ) Suspender la lactancia materna antyes de los 6 meses de vida del menor
- ( ) Estado de desnutrición
- ( ) Nivel socioeconómico bajo
- ( ) Noxa de contagio
- (●) Todas las anteriores

4. La dosis que debe ser suministrada de sulfato de zinc en los niños con enfermedad diarreica aguda y durante cuánto tiempo es: * 2 puntos

- ( ) En menores de 6 meses: 5cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) En mayores de 6 meses: 10cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) Ninguna de las anteriores
- (●) Todas las anteriores





5. El esquema ideal de hidratación profiláctica en menores con EDA es: * 2 puntos

En menores de 2 años——— 100 - 200mL

En niños de 2 años a 10 años— 50 a 100 mL

En mayores de 10 años——— tanto como deseen

- [ ] VERDADERO
- [x] FALSO

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios



Powered by CamScanner

# GPC EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Evaluación de adherencia

Correo electrónico *

mykedoctor46@hotmail.com

NOMBRE *

MYKE GOMEZ

IDENTIFICACIÓN *

1075666483

CARGO *

MEDICO

1. La enfermedad diarreica aguda podemos definirla como un aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal, en un tiempo no mayor de 7 días. * 2 puntos

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO





2. ¿Cuál es la principal causa etiológica de la enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años? * 2 puntos

- (•) VIRAL 80-85%
- ( ) BACTERIANA 15-10%
- ( ) PARASITARIA 5%

3. ¿Cuales son considerados como factores de riesgo para en desarrollo de la enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años?. * 2 puntos

- ( ) Suspender la lactancia materna antyes de los 6 meses de vida del menor
- ( ) Estado de desnutrición
- ( ) Nivel socioeconómico bajo
- ( ) Noxa de contagio
- (•) Todas las anteriores

4. La dosis que debe ser suministrada de sulfato de zinc en los niños con enfermedad diarreica aguda y durante cuánto tiempo es: * 2 puntos

- ( ) En menores de 6 meses: 5cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) En mayores de 6 meses: 10cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) Ninguna de las anteriores
- (•) Todas las anteriores





5. El esquema ideal de hidratación profiláctica en menores con EDA es: * 2 puntos

En menores de 2 años——— 100 - 200mL

En niños de 2 años a 10 años—— 50 a 100 mL

En mayores de 10 años——— tanto como deseen

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios



Powered by CamScanner

# GPC EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Evaluación de adherencia

Correo electrónico *

[redacted]

NOMBRE *

[redacted]

IDENTIFICACIÓN *

[redacted]

CARGO *

[redacted]

1. La enfermedad diarreica aguda podemos definirla como un aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal, en un tiempo no mayor de 7 días. * 2 puntos

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO





2. ¿Cuál es la principal causa etiológica de la enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años? * 2 puntos

- (●) VIRAL 80-85%
- ( ) BACTERIANA 15-10%
- ( ) PARASITARIA 5%

3. ¿Cuales son considerados como factores de riesgo para en desarrollo de la enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años?. * 2 puntos

- ( ) Suspender la lactancia materna antyes de los 6 meses de vida del menor
- ( ) Estado de desnutrición
- ( ) Nivel socioeconómico bajo
- ( ) Noxa de contagio
- (●) Todas las anteriores

4. La dosis que debe ser suministrada de sulfato de zinc en los niños con enfermedad diarreica aguda y durante cuánto tiempo es: * 2 puntos

- ( ) En menores de 6 meses: 5cc cada 12 horas por 14 días
- ( ) En mayores de 6 meses: 10cc cada 12 horas por 14 días
- ( ) Ninguna de las anteriores
- (●) Todas las anteriores





5. El esquema ideal de hidratación profiláctica en menores con EDA es: * 2 puntos

En menores de 2 años——— 100 - 200mL

En niños de 2 años a 10 años— 50 a 100 mL

En mayores de 10 años——— tanto como deseen

- [ ] VERDADERO
- [x] FALSO

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios



Powered by CamScanner

# GPC EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Evaluación de adherencia

Correo electrónico *

alej1225@hotmail.com

NOMBRE *

JUAN ALEJANDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ

IDENTIFICACIÓN *

1065573047

CARGO *

MEDICO

1. La enfermedad diarreica aguda podemos definirla como un aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal, en un tiempo no mayor de 7 días. * 2 puntos

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO





2. ¿Cuál es la principal causa etiológica de la enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años? * 2 puntos

- (●) VIRAL 80-85%
- ( ) BACTERIANA 15-10%
- ( ) PARASITARIA 5%

3. ¿Cuales son considerados como factores de riesgo para en desarrollo de la enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años?. * 2 puntos

- ( ) Suspender la lactancia materna antyes de los 6 meses de vida del menor
- ( ) Estado de desnutrición
- ( ) Nivel socioeconómico bajo
- ( ) Noxa de contagio
- (●) Todas las anteriores

4. La dosis que debe ser suministrada de sulfato de zinc en los niños con enfermedad diarreica aguda y durante cuánto tiempo es: * 2 puntos

- ( ) En menores de 6 meses: 5cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) En mayores de 6 meses: 10cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) Ninguna de las anteriores
- (●) Todas las anteriores





5. El esquema ideal de hidratación profiláctica en menores con EDA es: * 2 puntos

En menores de 2 años——— 100 - 200mL

En niños de 2 años a 10 años— 50 a 100 mL

En mayores de 10 años——— tanto como deseen

- [ ] VERDADERO
- [x] FALSO

Google no creó ni aprobó este contenido

Google Formularios



Powered by CamScanner

# GPC EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Evaluación de adherencia

Correo electrónico *

y.mbayo@hotmail.com

NOMBRE *

YENNYFER ROBAYO LEAL

IDENTIFICACIÓN *

CARGO *

MEDICO

1. La enfermedad diarreica aguda podemos definirla como un aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal, en un tiempo no mayor de 7 días. * 2 puntos

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO





2. ¿Cuál es la principal causa etiológica de la enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años? * 2 puntos

- (●) VIRAL 80-85%
- ( ) BACTERIANA 15-10%
- ( ) PARASITARIA 5%

3. ¿Cuales son considerados como factores de riesgo para en desarrollo de la enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años?. * 2 puntos

- ( ) Suspender la lactancia materna antyes de los 6 meses de vida del menor
- ( ) Estado de desnutrición
- ( ) Nivel socioeconómico bajo
- ( ) Noxa de contagio
- (●) Todas las anteriores

4. La dosis que debe ser suministrada de sulfato de zinc en los niños con enfermedad diarreica aguda y durante cuánto tiempo es: * 2 puntos

- ( ) En menores de 6 meses: 5cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) En mayores de 6 meses: 10cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) Ninguna de las anteriores
- (●) Todas las anteriores





5. El esquema ideal de hidratación profiláctica en menores con EDA es: * 2 puntos

En menores de 2 años——— 100 - 200mL

En niños de 2 años a 10 años— 50 a 100 mL

En mayores de 10 años——— tanto como deseen

- [ ] VERDADERO
- [x] FALSO

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios



Powered by CamScanner

# GPC EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Evaluación de adherencia

Correo electrónico *

miguandres@hotmail.com

NOMBRE *

MIGUEL ANDRES GARZON CELY

IDENTIFICACIÓN *

CARGO *

MEDICO

1. La enfermedad diarreica aguda podemos definirla como un aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal, en un tiempo no mayor de 7 días. * 2 puntos

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO





5. El esquema ideal de hidratación profiláctica en menores con EDA es: * 2 puntos

En menores de 2 años——— 100 - 200mL

En niños de 2 años a 10 años—— 50 a 100 mL

En mayores de 10 años——— tanto como deseen

- [ ] VERDADERO
- [x] FALSO

Google no creó ni aprobó este contenido

Google Formularios



2. ¿Cuál es la principal causa etiológica de la enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años? * 2 puntos

- (•) VIRAL 80-85%
- ( ) BACTERIANA 15-10%
- ( ) PARASITARIA 5%

3. ¿Cuales son considerados como factores de riesgo para en desarrollo de la enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años?. * 2 puntos

- ( ) Suspender la lactancia materna antyes de los 6 meses de vida del menor
- ( ) Estado de desnutrición
- ( ) Nivel socioeconómico bajo
- ( ) Noxa de contagio
- (•) Todas las anteriores

4. La dosis que debe ser suministrada de sulfato de zinc en los niños con enfermedad diarreica aguda y durante cuánto tiempo es: * 2 puntos

- ( ) En menores de 6 meses: 5cc cada 12 horas por 14 días
- ( ) En mayores de 6 meses: 10cc cada 12 horas por 14 días
- ( ) Ninguna de las anteriores
- (•) Todas las anteriores

Powered by CamScanner

# GPC EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Evaluación de adherencia

Correo electrónico *

griamaldolopez@yahoo.com

NOMBRE *

LUIS ZAMBRANO

IDENTIFICACIÓN *

1080187459

CARGO *

MEDICO

1. La enfermedad diarreica aguda podemos definirla como un aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal, en un tiempo no mayor de 7 días. * 2 puntos

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO





2. ¿Cuál es la principal causa etiológica de la enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años? * 2 puntos

- (●) VIRAL 80-85%
- ( ) BACTERIANA 15-10%
- ( ) PARASITARIA 5%

3. ¿Cuales son considerados como factores de riesgo para en desarrollo de la enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años?. * 2 puntos

- ( ) Suspender la lactancia materna antyes de los 6 meses de vida del menor
- ( ) Estado de desnutrición
- ( ) Nivel socioeconómico bajo
- ( ) Noxa de contagio
- (●) Todas las anteriores

4. La dosis que debe ser suministrada de sulfato de zinc en los niños con enfermedad diarreica aguda y durante cuánto tiempo es: * 2 puntos

- ( ) En menores de 6 meses: 5cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) En mayores de 6 meses: 10cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) Ninguna de las anteriores
- (●) Todas las anteriores





5. El esquema ideal de hidratación profiláctica en menores con EDA es: * 2 puntos

En menores de 2 años——— 100 - 200mL

En niños de 2 años a 10 años— 50 a 100 mL

En mayores de 10 años——— tanto como deseen

- [ ] VERDADERO
- [x] FALSO

Google no creó ni aprobó este contenido

Google Formularios



Powered by CamScanner

# GPC EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Evaluación de adherencia

Correo electrónico *

camimorenoto@unal.edu.co

NOMBRE *

CATALINA MORENO TORRES

IDENTIFICACIÓN *

1072717581

CARGO *

MEDICO

1. La enfermedad diarreica aguda podemos definirla como un aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal, en un tiempo no mayor de 7 días. * 2 puntos

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO





2. ¿Cuál es la principal causa etiológica de la enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años? * 2 puntos

- (•) VIRAL 80-85%
- ( ) BACTERIANA 15-10%
- ( ) PARASITARIA 5%

3. ¿Cuales son considerados como factores de riesgo para en desarrollo de la enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años?. * 2 puntos

- ( ) Suspender la lactancia materna antyes de los 6 meses de vida del menor
- ( ) Estado de desnutrición
- ( ) Nivel socioeconómico bajo
- ( ) Noxa de contagio
- (•) Todas las anteriores

4. La dosis que debe ser suministrada de sulfato de zinc en los niños con enfermedad diarreica aguda y durante cuánto tiempo es: * 2 puntos

- ( ) En menores de 6 meses: 5cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) En mayores de 6 meses: 10cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) Ninguna de las anteriores
- (•) Todas las anteriores





5. El esquema ideal de hidratación profiláctica en menores con EDA es: * 2 puntos

En menores de 2 años——— 100 - 200mL

En niños de 2 años a 10 años—— 50 a 100 mL

En mayores de 10 años——— tanto como deseen

- [ ] VERDADERO
- [x] FALSO

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios



Powered by CamScanner

# GPC EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Evaluación de adherencia

Correo electrónico *

camilaramirez1392@hotmail.com

NOMBRE *

CAMILA RAMIREZ

IDENTIFICACIÓN *

1032451657

CARGO *

MEDICO

1. La enfermedad diarreica aguda podemos definirla como un aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal, en un tiempo no mayor de 7 días. * 2 puntos

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO





2. ¿Cuál es la principal causa etiológica de la enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años? * 2 puntos

- (•) VIRAL 80-85%
- ( ) BACTERIANA 15-10%
- ( ) PARASITARIA 5%

3. ¿Cuales son considerados como factores de riesgo para en desarrollo de la enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años?. * 2 puntos

- ( ) Suspender la lactancia materna antyes de los 6 meses de vida del menor
- ( ) Estado de desnutrición
- ( ) Nivel socioeconómico bajo
- ( ) Noxa de contagio
- (•) Todas las anteriores

4. La dosis que debe ser suministrada de sulfato de zinc en los niños con enfermedad diarreica aguda y durante cuánto tiempo es: * 2 puntos

- ( ) En menores de 6 meses: 5cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) En mayores de 6 meses: 10cc cada 12 horas por 14 dias
- ( ) Ninguna de las anteriores
- (•) Todas las anteriores





5. El esquema ideal de hidratación profiláctica en menores con EDA es: * 2 puntos

En menores de 2 años——— 100 - 200mL

En niños de 2 años a 10 años— 50 a 100 mL

En mayores de 10 años——— tanto como deseen

- [ ] VERDADERO
- [x] FALSO

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios



Powered by CamScanner

# GPC EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Evaluación de adherencia

Correo electrónico *

pedanaruiz@gmail.com

NOMBRE *

ANA MARIA RUIZ

IDENTIFICACIÓN *

1015407882

CARGO *

PEDIATRA

1. La enfermedad diarreica aguda podemos definirla como un aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal, en un tiempo no mayor de 7 días. * 2 puntos

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO





2. ¿Cuál es la principal causa etiológica de la enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años? * 2 puntos

- (●) VIRAL 80-85%
- ( ) BACTERIANA 15-10%
- ( ) PARASITARIA 5%

3. ¿Cuales son considerados como factores de riesgo para en desarrollo de la enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años?. * 2 puntos

- ( ) Suspender la lactancia materna antyes de los 6 meses de vida del menor
- ( ) Estado de desnutrición
- ( ) Nivel socioeconómico bajo
- ( ) Noxa de contagio
- (●) Todas las anteriores

4. La dosis que debe ser suministrada de sulfato de zinc en los niños con enfermedad diarreica aguda y durante cuánto tiempo es: * 2 puntos

- ( ) En menores de 6 meses: 5cc cada 12 horas por 14 días
- ( ) En mayores de 6 meses: 10cc cada 12 horas por 14 días
- ( ) Ninguna de las anteriores
- (●) Todas las anteriores





5. El esquema ideal de hidratación profiláctica en menores con EDA es: * 2 puntos

En menores de 2 años——— 100 - 200mL

En niños de 2 años a 10 años— 50 a 100 mL

En mayores de 10 años——— tanto como deseen

- [ ] VERDADERO
- [x] FALSO

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios



Powered by CamScanner

# GPC EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Evaluación de adherencia

Correo electrónico *

MPAULAACEVEDO@GMAIL.COM

NOMBRE *

MARIA PAULA ACEVEDO BELEÑO

IDENTIFICACIÓN *

1018494705

CARGO *

MEDICO

1. La enfermedad diarreica aguda podemos definirla como un aumento en la frecuencia de las deposiciones en 24 horas (3 o más) y/o disminución de la consistencia habitual de la materia fecal, en un tiempo no mayor de 7 días. * 2 puntos

- [x] VERDADERO
- [ ] FALSO





2. ¿Cuál es la principal causa etiológica de la enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años? * 2 puntos

- (●) VIRAL 80-85%
- ( ) BACTERIANA 15-10%
- ( ) PARASITARIA 5%

3. ¿Cuales son considerados como factores de riesgo para en desarrollo de la enfermedad diarreica aguda en el menor de 5 años?. * 2 puntos

- ( ) Suspender la lactancia materna antyes de los 6 meses de vida del menor
- ( ) Estado de desnutrición
- ( ) Nivel socioeconómico bajo
- ( ) Noxa de contagio
- (●) Todas las anteriores

4. La dosis que debe ser suministrada de sulfato de zinc en los niños con enfermedad diarreica aguda y durante cuánto tiempo es: * 2 puntos

- ( ) En menores de 6 meses: 5cc cada 12 horas por 14 días
- ( ) En mayores de 6 meses: 10cc cada 12 horas por 14 días
- ( ) Ninguna de las anteriores
- (●) Todas las anteriores





5. El esquema ideal de hidratación profiláctica en menores con EDA es: * 2 puntos

En menores de 2 años——— 100 - 200mL

En niños de 2 años a 10 años— 50 a 100 mL

En mayores de 10 años——— tanto como deseen

- [ ] VERDADERO
- [x] FALSO

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios



Powered by CamScanner