



SÍNDROME NEFRÓTICO Y NEFRÍTICO.

Presentado por:
Jenifer Jajpy
María Mónica Noguera

Presentado a:
Nurfay Mina Valencia

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Técnico en Enfermería
Ficha: 2561222
Mayo 2023.


Definición
Triada
Signos y síntomas
Contenido
Causas
Tratamiento
Factores de riesgo
Posibles complicaciones
Medios diagnósticos
Video
Cuidados de enfermería




Definición

SINDROME NEFROTICO


SINDROME NEFRITICO

SINDROME NEFROTICO

El síndrome nefrótico es un trastorno renal que hace que el cuerpo excrete demasiadas proteínas en la orina.



SINDROME NEFRÍTICO



El síndrome nefrótico generalmente se debe a daños en los racimos de vasos sanguíneos diminutos de los riñones que filtran los desechos y el exceso de agua de la sangre.

LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL SÍNDROME NEFRÓTICO

- Edema grave, en particular alrededor de los ojos y en los tobillos y los pies
- Orina con espuma, resultado del exceso de proteínas en la orina
- Aumento de peso debido a la retención de líquidos
- Fatiga
- Pérdida del apetito



LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL SÍNDROME NEFRITICO




- Sangre en la orina (orina de aspecto oscuro, de color té o turbia)
- Oliguria
- Edema de cara, órbitas, piernas, brazos, manos, pies, abdomen u otras zonas
- Presión arterial alta

CAUSAS

SINDROME NEFROTICO


- Enfermedad renal diabética
- Nefropatía membranosa
- Lupus eritematoso sistémico
- Amiloidosis



SINDROME NEFRÍTICO

- Síndrome urémico hemolítico
- Púrpura de Henoch-Schönlein
- Nefropatía por IgA
- Glomerulonefritis posestreptocócica


FACTORES DE RIESGO



- Enfermedad renal diabética
- Nefropatía de cambios mínimos
- Nefropatía membranosa.
- Lupus eritematoso sistémico
- Amiloidosis
- Por medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos y los fármacos utilizados para combatir infecciones.
- Las infecciones: VIH, la hepatitis B, la hepatitis C y la malaria.
- Coágulos sanguíneos.

POSIBLES COMPLICACIONES

- Coágulos sanguíneos.
- Niveles altos de colesterol y triglicéridos en sangre.
- Mala nutrición.
- Presión arterial alta.
- Lesión renal aguda.
- Enfermedad renal crónica.
- Infecciones.



MEDIOS DIAGNÓSTICOS

- Examen físico
- Proteinuria en orina de 24 horas
- Índice proteínas urinarias/creatinina mayor de 2mg/dl
- Creatinina y BUN
- Niveles de albúmina
- Perfil lipídico
- Cuadro hemático
- Electrolitos
- Ecografía renal
- Otras veces se necesita una biopsia renal para confirmar el tipo de síndrome nefrótico




TRATAMIENTO

Farmacológico

- Albúmina amp.
- Furosemida
- Prednisolona oral
- Hipolipemiantes:simvastatina
- Suplemento de vitamina D Vitamina D 2000 U/día y calcio 500 mg al día



Síndrome Nefrítico



Triada del síndrome nefritico

TRIADA DEL SÍNDROME NEFRÍTICO

Aplicación:

Los signos/síntomas de la **Triada del Síndrome Nefrítico** nos sirven para sospechar un posible diagnóstico de **síndrome nefrítico**.




HEMATURIA



HIPERTENSIÓN ARTERIAL



EDEMA



https://www.youtube.com/watch?v=QLGy_4Hpe1Q

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Control de signos vitales cada 4 horas
- Aplicar escalas de valoración de riesgo (bradén, dawton, eva)
- Realizar Medidas de higiene y confort vigilar edematizacion.
- Acompañar en la deambulación
- Control de líquidos administrados y eliminados
- Vigilar características de la orina
- Mantener barandas de la cama arriba
- Informar cambios



GRACIAS



GC-F-004v.08

Ciclo vital
Enfermedades prevalentes de la infancia
Meningitis

PRESENTADO A:
Nurfay Mina Valencia
Lucia Jiménez


PRESENTADO POR:
Leidy Fory

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Sede Samaria
Técnico en Enfermería
2561222

@SENAComunica
www.sena.edu.co

MENINGITIS

Es la inflamación de los tejidos que recubren el cerebro y la médula espinal.



Origen de la meningitis

Bacteriana

- Se origina por las bacterias que ingresan al torrente sanguíneo y se trasladan hasta el cerebro y la médula espinal.


La causa puede ser una infección de oído o de los senos paranasales, una fractura de cráneo.

viral

- Por lo general, la meningitis viral es leve y a menudo desaparece por sí sola. La causa de la mayoría de los casos es un grupo de virus conocidos como enterovirus.
- El enterovirus es un virus que provoca síntomas similares a los de la influenza.


Micótica

- Se puede producir después de que una infección micótica se propaga desde alguna parte del cuerpo al cerebro o a la médula espinal.
- La meningitis micótica no se contagia de una persona a otra.



Parasitaria

- Generalmente, las personas se infectan cuando ingieren alimentos contaminados con estos parásitos. La meningitis parasitaria no se transmite entre personas.
- puede deberse a una infección por tenia en el cerebro.



Factores de riesgo



Signos y Síntomas

Los síntomas de la meningitis varían según la edad.



Primera infancia

- Fiebre
- somnolencia
- Rechazo a la alimentación


Adolescencia

- Cefalea
- Confusión
- Rigidez en el cuello
- Signo de Brudzinski y Kerning
- Convulsiones





Medios Diagnósticos



- Punción lumbar
- Hemocultivos
- Diagnóstico por imágenes





Tratamiento

- **Las vacunas antimeningocócica conjugada tetravalente**
- **Forma Farmacéutica**

Suspensión inyectable

- **Presentación**

1 Fco 0.5 ml, 1 Dosis



- **Antibióticos**

Penicilina

Rifampicina 300 mg

Cuidados de enfermería

Meningitis bacteriana

- Tomar signos vitales c/4hr
- Aplicar escalas (EVA, Glasgow, Dowton)
- Mantener aislamiento de contacto y aéreo
- Verificar tolerancia a la alimentación
- Acompañante permanente
- Mantener restricción de visitas
- Brindar educación a fliar uso de EPP
- Mantener barandas arriba
- Informar cambios



Web grafía

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/meningitis#:~:text=La%20meningitis%20es%20la%20inflamaci%C3%B3n,infecciones%20se%20transmite%20entre%20personas.

https://youtu.be/Taqxxe3pvQY

GRACIAS