Coberturas

A 9 de julio del año 2023 las coberturas de vacunación en la población de menor de un año, un año y cinco años de acuerdo a las metas administrativas asignadas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social presentan un cumplimiento entre el 44 y el 47%, sin embargo, la cobertura ideal debe estar sobre el 49.8%.
En población menor de un año 70659 (vacunados 33.242) 47.0%, de un año 71913 (vacunados 31513) 43.8%, población de 18 meses con primer refuerzo de triple viral 71913 (vacunados 31334) 43.6% y población de cinco años con refuerzo de DPT 89323 (vacunados 39302) 44.0%.


Alertas Epidemiológicas

Durante los primeros meses del 2023, se registraron brotes de dengue de magnitud importante con una mayor transmisión en estos meses en América Central y el Caribe. Respecto al número de casos de dengue grave reportados en 2023, el mayor número de casos se observó en los siguientes países: Brasil con 654 casos, Colombia con 652 casos, Perú con 597, Bolivia con 590 casis y México con 573 casos. Adicionalmente, en el mismo periodo, se notificaron un total de 876 muertes en la Región (tasa de letalidad [TL]: 0,042%). Fuente: Organización Panamericana de la Salud – OPS 05 de Julio 2023.

Frente Sarampión hay una alerta en región de las Américas a semana epidemiológica 26 se han conformado 21 casos, por fuente de información se identificaron 14 casos en EEUU y 7 en Canadá.

Estrategias que desarrollaremos en la semana

La Secretaría de Educación como aliado permanente para garantizar la salud integral de los niños, niñas y adolescentes reconoce como primera práctica de cuidado la vacunación, es por esto que ha venido reforzando las medidas que permitan contar con esquemas adecuados en la población estudiantil, es así como dará la bienvenida al regreso a clases verificando los paz y salvos de vacunación y/o los carné de vacunas actualizados. Es importante señalar que cualquiera de los dos soportes son válidos para poder obtener la información requerida.
Esta estrategia “A Vacunar al Multiverso Educativo” surge del trabajo que se ha venido realizando de manera articulada y constante entre esta secretaria y el sector educativo desde el área de Bienestar Estudiantil y Cobertura, con el objetivo de identificar a la población que aún no han completado el esquema de vacunación y/o actualizar su antecedente vacunal; el avance de la población vacunada podrá ser verificada por medio de las publicaciones que se hacen en la página institucional SaluData.



Por lo anterior, Bogotá no para y continua su funcionamiento e intensifica sus actividades, con mayor énfasis entre la semana del 21 al 29 en conjunto con los sectores SDIS e ICBF; haciendo presencia en puntos de alto impacto con horarios flexibles que permitan que los padres madres y cuidadores puedan acudir, se cuenta con más de 200 puntos de vacunación que pueden ser consultados en la página web www.saludcapital.gov.co en esta podrá ubicar el punto más cercano, la dirección y horarios disponibles.

Que vacunas se están aplicando

Los biológicos que se ofertaran en los puntos de vacunación corresponde a Polio, Pentavalente, Triple Viral, Fiebre Amarilla, VPH, Sarampión – Rubeola, Tosferina, Janssen, Sinovac; entre otras…

Cambios en el esquema permanente de vacunación

Toda la población que cumple **18 meses** se le administrará el **refuerzo** de la **triple viral**, vacuna que antes se aplicaba a los **5 años**. Es por ello que si su hij@ está entre los 18 meses y 5 años se acerquen a los puntos de vacunación para recibir este refuerzo.

Mensajes de cuidado integral

Los virus respiratorios que se encuentran circulando (Virus Respiratorio Sincitial, influenza AH3, Adenovirus e Influenza AH1N1), los cuales son causantes de problemas respiratorios en los niñ@s menores de 5 años quienes requieren la intensificación de las medidas de bioseguridad que han demostrado ser muy efectivas; entre las que podemos referenciar son lavado de manos frecuente, el aislamiento de niñ@s con síntomas respiratorios, los cuales deben usar el tapabocas si tienen más de 2 años, evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios y tener al día los esquemas de vacunación si son mayores de 3 años. También se debe reforzar la limpieza de las superficies de uso frecuente, donde muchos de estos virus pueden permanecer por horas y ser contagiados a través de las manos que entren en contacto con ellas.