LINK PHARMA S.A.S

FICHA TÉCNICA

BUPIVACAINA 5 mg/mL + EPINEFRINA 5 mcg/mL AMPOLLA X 10 mL

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE DEL PRODUCTO	BUPIVACAINA + EPINEFRINA 5mg + 5 mcg/mL SOLUCIÓN INYECTABLE
CONCENTRACION	BUPIVACAINA 5 mg/mL EPINEFRINA 5 mcg/mL
CONCENTRACION PRESENTACION COMERCIAL	BUPIVACAINA 50 mg/10mL EPINEFRINA 50 mcg/10mL
FORMA FARMACÉUTICA	SOLUCIÓN INYECTABLE
PRINCIPIO ACTIVO	BUPIVACAINA + EPINEFRINA
VÍA DE ADMINISTRACIÓN	EPIDURAL, INTRAARTICULAR, INTRAMUSCULAR, PERINEURAL, SUBCUTANEA E INFILTRACIÓN
VIDA ÚTIL	DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO DEL LOTE IMPORTADO
No. DE REGISTRO SANITARIO	MEDICAMENTO VITAL NO DISPONIBLE
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CAJA PLEGADIZA X 10 AMPOLLAS C/U DE 10 mL
MATERIAL DE ENVASE	AMPOLLA DE VIDRIO AMBAR DE 10 mL
MATERIAL DE EMPAQUE	PROPALCOTE DE 320 g
PESO POR UNIDAD COMERCIAL	23 g
CÓDIGO DE BARRAS EAN 13	7709600588286
TITULAR DEL REGISTRO DE IMPORTACIÓN	LINK PHARMA S.A.S
FABRICANTE	KWALITY PHARMACEUTICALS LTD
CLASIFICACIÓN ATC	N01BB51
SISTEMA ORGÁNICO	SISTEMA NERVIOSO
GRUPO FARMACOLÓGICO	ANESTESICOS
SUBGRUPO FARMACOLÓGICO	ANESTESICOS LOCALES
SUBGRUPO QUÍMICO	AMIDAS
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	AMBIENTE
CÓDIGO IUM	2B1025061000100
INDICACIÓN DEL PRODUCTO	
ANESTESICO LOCAL CON VASOCONSTRICTOR	
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS	
HIPERSENSIBILIDAD A LA BUPIVACAINA Y OTROS ANESTÉSICOS LOCALES DE TIPO AMIDA Y DEMÁS COMPONENTES, ENFERMEDADES CARDIACAS, ANESTESIA REGIONAL INTRAVENOSA, BLOQUEO PARACERVICAL EN OBSTETRICIA, ANESTESIA EPIDURAL O CAUDAL, EVITAR EL USO CONCOMITANTE CON ALCALOIDES DEL ERGOT. ADMINÍSTRESE CON PRECAUCIÓN A PACIENTES CON EPILEPSIA, FALLA EN LA CONDUCCIÓN CARDIACA, SHOCK, DAÑO HEPÁTICO, MIASTENIA GRAVIS, PACIENTES QUE ESTÉN RECIBIENDO IMAO, ANTIDEPRESIVOS TIPO TRIPTILINA. CONTIENE METILPARABENO, PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS POSIBLEMENTE RETARDADAS. CONTIENE METABISULFITO, PUEDE CAUSAR REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD, ESPECIALMENTE EN ASMÁTICOS.	

Elaborado por:
Margarita Rosa Salcedo Sanabria
Representante Legal
LINK PHARMA S.A.S