Responda las preguntas 1-7 marcando una X la(s) respuesta(s) correcta(s).

1. Cuál(es) de los siguientes medicamentos son inhibidores de la ECA usados en el tratamiento de la hipertensión arterial.
a. Prazosín.
b. Verapamil.
c. Captopril.
d. Nifedipina.
e. a y d.

2. El propanolol es un B bloqueador utilizado en tratamiento de angina de pecho e hipertensión arterial; está contraindicado por su mecanismo de acción en pacientes que presentan la(s) entidad(es) patológica(s).
a. Hepatitis.
b. Isquemia del miocardio.
c. Asma bronquial.
d. Insuficiencia renal.
e. b y c.

3. Cuál(es) de los siguientes medicamentos son antagonista del calcio.
a. Enalapril.
b. Verapamil.
c. Captopril.
d. Nifedipina.
e. b y d.

4. La reperfusión mediante trombólisis coronaria se puede realizar con el o los siguientes medicamentos:

a. Estreptoquinasa.
b. Estreptomicina.
c. Uteroquinasa.
d. b y c.
e. Ninguna de las anteriores.

5. Un índice para estimar la severidad de la hipertensión arterial es la retinopatía que según el grado I se caracteriza por:
a. Papiledema.
b. Cruces arteriovenosos.
c. Exudados.
d. Constricción arteriolar.
e. Ninguna de las anteriores.

6. El o los diuréticos que actúan en el asa de Henle son:

a. Furosemida.
b. Bumetanida.
c. Indapamida.
d. b y c.
e. a y b.

7. Cuál(es) de los siguientes medicamentos son bloqueadores Alfa adrenérgicos:
a. Quinapril.
b. Prazosín.
c. Clonidina.
d. Alfa metil Dopa.
e. Ninguna de las anteriores.

Coloque en el paréntesis de los numerales 11-16 la letra de la columna II que corresponda al enunciado de la columna I.

11. Dinitrato de Isosorbide	( ) a. Bloqueadores B adrenérgicos
12. Activador de Plaminógeno	( ) b. Antagonistas del calcio
13. Infarto pared lateral ventrículo izquierdo (Rama anterior descendente)	( ) c. Arteria coronaria izquierda
14. Infarto cara anterior ventrículo izquierdo	( ) d. Diurético de Asa
15. Diltiacem	( ) e. Vasodilatador coronario
16. Clortalidona	( ) f. Arteria coronaria izquierda
	g. Trombolítico
	h. Diurético Tiazida