

	PON INTOXICACIONES	PON-0420
		Versión 1
		Fecha 22/09/2022

PON INTOXICACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objetivos: Controlar y contener el derrame de sustancias producido evitando que se pueda causar consecuencias mayores. En caso de intoxicación alimentaria, atender prioritariamente al afectado y dar la mejor atención posible. ▪ Responsables: funcionarios, brigadistas ▪ Ayuda externa: línea ARL POSITIVA Centro Regulador de Urgencias de la Secretaría de Salud teléfono 125) ▪ Recursos: Jabón en polvo, agua, camilla, elementos de primeros auxilios (botiquín) ▪ Riesgos asociados: contaminación 	
PROCEDIMIENTO	
¿Quién?	¿Qué Hacer?
Brigadistas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evite el pánico ▪ Utilice elementos de protección funcionarios para manipulación de productos químicos ▪ Retirar del área al afecto para evitar que se siga contaminando ▪ Evaluación completa y rápida de la víctima ▪ Si está salpicado o empapado retire la ropa incluyendo reloj, zapatos, pulseras. ▪ Lave durante 15 minutos completamente al afectado con agua deshelada o tibia (no caliente) y jabón. ▪ Lave el cuero cabelludo, y debajo de las uñas, si la afectación es por productos químicos. Una vez lavado debe secarse y colocarse ropa seca. ▪ Inmediatamente consulta hoja de seguridad del producto y siga las instrucciones <p>En caso de presentar síntomas de malestar realizar traslado de manera inmediata para atención médica.</p> <p>Si horas después demuestra síntomas consultar a su médico si:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ La diarrea dura más de dos a tres días. ☞ Se presenta sangre en las heces. ☞ Está tomando diuréticos y tiene diarrea, náuseas o vómitos. ☞ Tiene diarrea y es incapaz de tomar líquidos debido a náuseas o vómitos. ☞ Tiene fiebre superior a 38° C <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proceda a trasladarla al centro médico más cercano, cuando: <ul style="list-style-type: none"> ☞ El sangrado es excesivo o las heces son de color marrón o negro. ☞ Presenta falta de aliento o dificultad para respirar. ☞ Presenta cualquier síntoma neurológico como debilidad, visión doble, dificultad para hablar o parálisis. ☞ Presenta signos de deshidratación (sed, vértigo, mareo o desmayo). ☞ Tiene dificultad para deglutir. ☞ Su corazón se acelera, late con violencia o salta. <p>En todo caso siempre el paciente debe ser atendido por un médico.</p>