



ALBA MARINA GOMEZ TORRES ▾



[Página Principal](#) > [Mis cursos](#) > [CDE-VT-DiagnsticoClinicoDengue-2020 \(Extd\)](#) > [Módulo 4](#) > [Cuestionario 3](#)

Comenzado el	martes, 12 de septiembre de 2023, 15:52
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 12 de septiembre de 2023, 16:01
Tiempo empleado	8 minutos 36 segundos
Puntos	9,00/10,00
Calificación	90,00 de 100,00

Comentario -

¡Felicitaciones! Ha aprobado el Quiz del módulo.

Por favor regrese a la página principal del curso para continuar con el siguiente módulo.

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La presencia de odinofagia, así como la hiperemia de faringe y conjuntivas son manifestaciones muy frecuentes en las infecciones por dengue.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La odinofagia, hiperemia de faringe y de conjuntivas son manifestaciones clínicas infrecuentes en las infecciones por dengue.

La respuesta correcta es 'Falso'



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para realizar un adecuado diagnóstico diferencial en un caso sospechoso de dengue es necesario tomar en cuenta el contexto epidemiológico del lugar y de ser posible establecer un nexo epidemiológico.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

El contexto epidemiológico de la localidad es un elemento clave para establecer un mejor diagnóstico diferencial con dengue. Establecer un nexo epidemiológico aumenta la probabilidad de estar ante un caso de infección por dengue.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la enfermedad del dengue ¿Cuál de los siguientes enunciados es el correcto?

Seleccione una:

- ☐ a. Es una enfermedad sistémica, pero no dinámica
- ☐ b. No es una enfermedad sistémica, pero sí es dinámica
- ☒ c. Es una enfermedad sistémica y dinámica ✓
- ☐ d. No es una enfermedad sistémica ni dinámica

Your answer is correct.

El dengue es enfermedad infecciosa, sistémica y dinámica.

La respuesta correcta es: Es una enfermedad sistémica y dinámica



Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes no es una manifestación clínica de gravedad en dengue?

Seleccione una:

- ☐ a. Disminución de la presión pulso a $\leq 20\text{mmHg}$
- ☐ b. Sangrados del sistema nervioso central
- ☒ c. Prueba de torniquete positiva (+) ✓
- ☐ d. Llenado capilar prolongado (mayor de 2 segundos)

Your answer is correct.

La disminución de la presión de pulso a 20mmHg o menos, sangrado del sistema nervioso central, el llenado capilar mayor de dos segundos son manifestaciones de gravedad en dengue. En cambio, una prueba de torniquete positiva indica fragilidad capilar y no es considerado como una manifestación de gravedad.

La respuesta correcta es: Prueba de torniquete positiva (+)

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La presencia de leucopenia y trombocitopenia es uno de los hallazgos más frecuentes en las infecciones por dengue:

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La primera anomalía del hemograma es una disminución progresiva del recuento total de glóbulos blancos (leucopenia), seguido de una rápida disminución de plaquetas (trombocitopenia). La leucopenia forma parte de los criterios de definición de caso sospechoso de dengue.

La respuesta correcta es 'Verdadero'



Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El evento fisiopatológico más frecuente de la fase crítica es la extravasación plasmática.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Durante la fase crítica de la enfermedad ocurre la fuga plasmática. Esto es el evento fisiopatológico más frecuente en esta fase y es debido a un daño transitorio que se produce al endotelio.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las manifestaciones hemorrágicas del dengue?

Seleccione una:

- ☐ a. Sangrados en los sitios de venupunción
- ☐ b. Epistaxis, gingivorragias
- ☐ c. Hematemesis, metrorragias, hematurias
- ☒ d. Las opciones *a, b* y *c* son correctas ✓

Your answer is correct.

Las manifestaciones hemorrágicas del dengue incluyen: sangrados en los sitios de venupunción, epistaxis, gingivorragias, hematemesis, metrorragias, hematuria, así como sangrados en piel.

La respuesta correcta es: Las opciones *a, b* y *c* son correctas



Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la fase febril del dengue ocurre una bradicardia relativa.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

En las infecciones por dengue la bradicardia relativa es común durante la fase febril, ya que la fiebre no eleva sustancialmente la frecuencia cardíaca.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los factores o condiciones especiales que pueden aumentar el riesgo de gravedad en dengue?

Seleccione una:

- ☐ a. Menores de 1 año y mayores de 65 años
- ☐ b. Pacientes embarazadas
- ☐ c. Abandono social
- ☒ d. Las opciones *a*, *b* y *c* son correctas ✓

Your answer is correct.

Las particularidades fisiológicas e inmunológicas de los menores de un año, los mayores de 65 años, así como de las embarazadas son factores de riesgo de gravedad en dengue. Adicionalmente, las personas que sufren de abandono social pueden no recibir o buscar atención médica oportunamente, lo que aumenta el riesgo de agravar por esta enfermedad.

La respuesta correcta es: Las opciones *a*, *b* y *c* son correctas



Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para establecer un diagnóstico diferencial en un caso sospechoso de dengue es necesario que el médico haga una adecuada anamnesis y examen físico.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Una adecuada anamnesis y examen físico son el primer paso en la evaluación general de un paciente con sospecha de dengue. Esto brindará al personal de salud a cargo de la atención del caso información relevante para establecer el diagnóstico clínico de dengue o de otra patología.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

