INFORME AMIGO FIEL

08/11/2019

CANINOS

ROSARIO: paciente atenta al medio, activa, presenta historial de problemas en columna vertebral y oculares; a la evaluación clínica física se evidencia mucosas rosadas/húmedas/brillantes, tll 3 segundos, presenta leve dolor a la palpación de la columna vertebral a nivel lumbar, se evidencia resequedad en ojo derecho, sin presencia de secreción. Se recomienda seguir con tratamiento oftalmológico: Ciclosporina bid, Tears lagrimas artificiales bid y administrar Tramadol vía subcutánea sid.

DESCA: paciente atenta al medio, hipodinámica, tiene historial de problemas de columna, a la palpación se evidencia dolor a nivel cervical, también presenta dolor en articulación de rodilla y dificultad para incorporarse. Se recomienda seguir con tratamiento de Tramadol bid y si presenta crisis de dolor administrar Ketoprofeno (Ankofen) 4 gotas cada 24 horas durante 4 días; se recomienda realizar exámenes de sangre, perfil básico y tiroides.

MILTO: paciente atento al medio, activo, presenta historial de factura de cadera, a la evaluación clínica física se evidencia mucosas rosadas/húmedas/brillantes, tll 2 segundos, no presenta dolor abdominal, no presenta dolor a la palpación de columna ni de cadera, normotérmico, se incorpora sin dificultad, no presenta alteración en la marcha.

MUÑECA: paciente adulta, presenta dificultad para incorporarse y para caminar, mucosas rosadas/húmedas/brillantes, tll 3 segundos, ganglios linfáticos no reactivos, normotérmica, presenta dolor a la palpación de columna a nivel toracolumbar y a nivel de la cadera, también se evidencia severo dolor abdominal a la palpación. Se indica administrar Ketoprofeno (Ankofen) 5 gotas cada 24 horas durante 4 días y seguir con el tratamiento de Tramadol bid, se recomienda realizar limpieza otica 3 veces a la semana.

LAIKA: paciente con historial de problemas de columna; a la evaluación clínica física presenta mucosas rosadas/húmedas/brillantes, tll 3 segundo, no se evidencia ganglios linfáticos reactivos, no se evidencia dolor abdominal. Se indica suspender terapia con Tramadol y revisión en 15 días.

TOÑA: paciente presenta lesión en parpado superior del ojo derecho, no hay presencia de secreción. Se recomienda realizar limpieza ocular 2 veces al día con brillo mascotas y aplicar 1 gota de Ocuflox 2 veces al día durante 7 días en ojo derecho.

COCO: paciente con historial de problema de columna. A la evaluación clínica física se evidencian mucosas rosadas/húmedas/brillantes, tll 3 segundos, se evidencia dificultad para incorporarse al igual que a la palpación de columna, no presenta dolor en articulaciones de rodilla, no se evidencia dolor a la palpación abdominal, se evidencia leve presencia de gas abdominal a la palpación. Se indica rebajar la frecuencia de Tramadol a una vez al día.

TATA: paciente presenta mucosas rosadas/húmedas/brillantes, tll 2 segundos, no presenta dolor abdominal, auscultación cardiopulmonar sin alteración. Presenta masa redonda de consistencia blanda a nivel del hombro izquierdo. Se recomienda realiza perfil básico para programar extracción de masa. No se evidencia más masas en otras zonas.

CUATRO: paciente epiléptico, temperamento nervioso, no presenta crisis hace mucho tiempo, presenta pupilas responsivas, reflejo de amenaza positivo, mucosas rosadas/húmedas/brillantes, tll 2 segundos, normotérmico, auscultación cardiovascular sin alteración. Se recomienda continuar con el tratamiento ¾ tableta Fenobarbital cada 12 horas hasta nueva indicación.

DULCE: paciente atenta al medio, temperamento dócil, presenta abundante secreción ocular bilateral, se recomienda realiza limpieza ocular con brillo mascotas 2 veces al día y aplicar Oftalmisyn 1 gota en cada ojo 2 veces al día durante 8 días. Se recomienda realiza perfil básico y examen de tiroides.

MARTHA: paciente de temperamento dócil, no presenta dolor abdominal, normotérmica, mucosas rosadas/húmedas/brillantes, tll 2 segundos, no hay reactividad en ganglios linfáticos, presenta lesiones alopécicas en piel a nivel del costado izquierdo, no presenta prurito ni zonas eritematosas. se recomienda realizar baños dos veces a la semana con dermovet.

MAMÁ SEGOVIA: paciente presenta lesiones en la piel que posiblemente son compatibles con ácaros, se recomienda realiza 3 veces a la semana baños con shampoo medicado y realiza limpiezas con clorhexidina y después aplicar Dermosyn en zonas afectadas, (a nivel del cuello y costados), 2 veces al día hasta nueva indicación.

CASA BLANCA: paciente activa, mucosas rosadas/húmedas/ brillantes, tll 2 segundos, presenta episodios de tos, no presenta secreción nasal, reflejo tusígeno positivo, palmopercutor negativo, a la auscultación pulmonar no se evidencian sonidos repiratotios anormales, no presenta estertores ni estridores. Se recomienda realizar puff con Beclometasona cada 8 horas durante 7 días y administrar amoxisol 1.8ml totales via subcutánea cada 48 horas 3 dosis totales.

LINA: paciente adulta con historia de retiro de higroma, no presenta secreción ni inflamación en los mismos. Mucosas rosadas/húmedas/brillantes, tll 2 segundos, no presenta dolor abdominal, normotérmica, auscultación cardiopulmonar sin alteración.

MESA: paciente con temperamento nervioso, reportan que anteriormente tuvo crisis de dolor pensaban que era de columna o de cadera; a la palpación de las mismas no se evidencia dolor. Se recomiendo suspender Tramadol y estar en observación para determinar si se vuelve a utilizar, no presenta dolor para incorporarse ni dolor a la extensión y flexión de los miembros.

LEA: paciente con temperamento dócil, anteriormente se le hizo examen de tiroides y esta tratada, pero cada vez la ven más aumentada de peso. Se recomienda realizar nuevamente examen de tiroides para ajustar dosis de medicamento. Presenta parásitos en las heces,

se recomienda administrar vía oral 7ml totales de Fenbendazol una vez al día durante 5 días.

MIQUE: paciente con temperamento dócil, presenta masa en miembro anterior izquierdo a nivel interdigital, reportan que ha mejorado en cuanto a apariencia y a tamaño, no hay secreción ni dolor a la manipulación de la misma. Se recomienda realiza limpiezas con clorhexidina y aplicar Dermosyn una vez al día hasta nueva indicación.

MARBELLA: paciente con temperamento dócil, anteriormente presentaba abscesos a nivel del dorso, se evidencia masa a nivel del costado derecho asociada a un lipoma, de consistencia blanda y redonda, no presenta dolor a la manipulación y reportan que no ha tenido crecimiento de la misma.

PERICO: paciente con temperamento dócil, presenta lesión a nivel del cuello, presenta alopecia, no hay presencia de eritema, no presenta secreción, posiblemente asociada con ácaros. Se recomienda baños con jabón medicado dos veces a la semana y aplicar clorhexidina más Dermosyn dos veces al día en zonas afectadas hasta nueva indicación.

LUNA: paciente con temperamento dócil, reporta el paseador que ha presentado heces blandas, presenta mucosas rosadas/húmedas/brillantes, tll 2 segundos, no presenta dolor a la palpación abdominal, hay presencia de gases en abdomen evidenciados por medio de la palpación. Se recomienda dar Pepsamar 1.5 ml cada 12 horas durante 7 días y Metronidazol 3.2 ml totales cada 12 horas durante 7 días.

FELINOS

BENJAMIN: temperamento dócil, se evidencia dificultad para respirar, no presenta secreción nasal ni ocular, auscultación cardiopulmonar sin alteración, mucosas rosadas/húmedas/brillantes, tll 2 segundos, no presenta dolor abdominal, reflejo tusígeno y palmopercutor negativos. Se recomienda seguir con el tratamiento instaurado hasta finalizarlo.

MONO: paciente presenta lesión alopécica a nivel del dorso, no presenta secreción, se evidencia eritematosa, se recomienda rasurar zona, realizar limpiezas con clorhexidina y luego aplicar Dermosyn dos veces al días hasta nuevo aviso.

Recomendación: realizar pesaje semanal de felinos que presentan baja condición corporal para realiza seguimiento.

Manuela Marulanda Tabares

Medica veterinaria zootecnista

TP: 39741