# TYLOX




**Laboratorio:**

**INSTITUTO COLOMBIANO FARMACEUTICO" ICOFARMA LTDA"**
Cr. 21 70 A - 39 Bogotá - Colombia
Teléfono: +(571)2554985
Fax: +(571)3471604
Sitio web: www.icofarma.com

**Uso terapéutico:** ANTIMICROBIANO

**Principio Activo:** TILOSINA

**Especies:**


**Descripción:**

**TYLOX** es un antibiótico

| Composición | Contenido |
|---|---|
| Tilosina | 200 mg |
| Excipientes csp | 1 ml |

- **ACCIÓN**: Antibiótico
- **INDICACIONES**: Neumonía, difteria, metritis, mastitis aguda, artritis, erisipela, disentería, pododermatitis necrótica, micoplasmosis porcina. Especies: Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves. Máxima tolerancia, farmacodinamia, estabilidad y eficacia. Inhibe la síntesis proteica por parte de la bacteria causándole la muerte. Alta biodisponibilidad y difusión. Antibiótico de elección en las enfermedades respiratorias e infecciones podales.
- **DOSIS**: 1mL/20 kg, de 3 a 5 días. Vía intramuscular.
- **TIEMPO DE RETIRO**: Bovinos: los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 8 días después de finalizado el tratamiento. Porcinos: los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento. Ovinos, caprinos y aves: los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado no debe darse al consumo humano.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES**: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No utilice este antibiótico en equinos. No mezclar con sulfonamidas ni con otras soluciones inyectables. No exceder el tratamiento por mas de 5 días, en caso de no observar recuperación del animal, reconsidere el diagnóstico y por ende el tratamiento.
- **MODO DE APLICACIÓN**: Solución inyectable.
- **PRESENTACIÓN**: Frascos por 20, 100 y 250 mL.
- **REGISTRO**: 6829 MV

# CHAPETAS DE IDENTIFICACION




Chapetas de identificación para cerdos RUI; todas para cerdos en la etapa de ceba, distribuidor autorizado en la zona para su venta – LLANOCAMPO.

CHAPETAS PARA IDENTIFICACION DE CERDOS PARA TRANSPORTE, UNICAMNETE AUTORIZADOS PORKCOLOMBIA.

# DEXAPEN




**Laboratorio:**

**ROPSOHN LABORATORIOS LTDA**
Cl. 166 45 - 80 Bogotá - Colombia
Teléfono: +(571)6718510
Fax: +(571)6718530
Mail: ventas@ropsohnlab.com.co
Sitio web: www.ropsohnlab.com.co

**Uso terapéutico:** ANTIMICROBIANO

**Principio Activo:** PENICILINA PROCAINICA, PENICILINA POTASICA, ESTREPTOMICINA, DEXAMETASONA

**Especies:**

**Descripción:**

**DEXAPEN** es una combinación antibiótica y antiinflamatoria

| Composición | Contenido |
|---|---|
| Penicilina G procaínica | 100.000 UI |
| Penicilina G potásica | 100.000 UI |
| Estreptomicina | 250 mg |
| Dexametasona | 0.7 mcg |
| Agua destilada csp | 1 ml |

- **ACCIÓN**: Antibiótico, antiinflamatorio

- **INDICACIONES**: Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. equinos, porcinos y caninos: Mastitis, neumonías, bronquitis, traqueobronquitis, procesos piógenos, peritonitis, vaginitis, metritis, nefritis aguda, poliartritis infecciosa, adenitis, balanopostitis, orquitis, acrobustitis, enteritis, pododermatitis, artritis infecciosa, infecciones cutáneas, etc. Las Penicilinas inhiben las enzimas responsables de la formación de la pared celular de la bacteria. Inhibe el desarrollo de Peptidoglican en la pared celular, que es el que da fortaleza a la célula y resiste la presión osmótica intracelular. La bacteria al carecer de pared es incapaz de resistir los cambios osmóticos intracelulares y los mecanismos de defensa del organismo, provocando así lisis de la bacteria; por lo anterior, el mecanismo se considera bactericida.

- **DOSIS**: **Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos**: Aplicar 5 ml por cada 100 Kg de peso. **Caninos**: Aplicar 1-2 ml por cada 5 Kg de peso. La duración del tratamiento es de 3-5 días, o según criterio del Médico Veterinario. Frasco x 10 ml: Reconstituir el contenido del frasco con agua destilada hasta alcanzar un volumen de 10 ml (7.5 ml de agua destilada). Frasco x 20 ml: Reconstituir el contenido del frasco con agua destilada hasta alcanzar un volumen de 20 ml (15 ml de agua destilada). Aplicar por vía intramuscular profunda.

- **TIEMPO DE RETIRO**: No sacrificar los animales destinados para consumo humano, hasta 30 días después de la última aplicación. No dar la leche para consumo humano durante el tratamiento y 3 días después de finalizado éste.

- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No aplicar a hembras en el último tercio de la gestación.
- **MODO DE APLICACIÓN**: Polvo para reconstituír.
- **PRESENTACIÓN**: Frasco x 10 ml (2'000.000 UI) y 20 ml (4'000.000 UI) con agua destilada en Ampoulepack.
- **REGISTRO**: 1838 DB

# CURAGAN NL




**Laboratorio:**

**ELI LILLY INTERAMERICA, INC**
Transversal 18 No. 96-41 Piso 6 Bogotá - Colombia
Teléfono: +(571)6024200
Fax: +(571)6024259
Sitio web: www.elanco.com

**Uso terapéutico:** ANTISEPTICO / DESINFECTANTE

**Principio Activo:** CIPERMETRINA, VIOLETA DE GENCIANA

**Especies:**



**Descripción:**

**CURAGAN NL** es un larvicida y antiséptico para uso externo

| Composición | Contenido |
|---|---|
| Cipermetrina high cis | 1.5 g |
| Violeta de genciana | 0.5 g |
| Excipientes csp | 100 ml |

- **ACCIÓN**: Larvicida, antiséptico

- **INDICACIONES**: Larvicida y Antiséptico para uso externo. Controla miasis y facilita el tratamiento de heridas en los animales domésticos. Usos: Control de miasis. Control de infestaciones de moscas y efecto antiséptico en heridas quirúrgicas como castraciones, cortes de cola. Tratamiento en heridas de la piel, de pezuñas, cascos, pezones, curaciones de ombligo, onfalitis. Infecciones bacterianas secundarias en lesiones vesiculares, pododermatitis. Escoriaciones y úlceras de la piel. Uso en bovinos, equinos, porcinos, caninos, caprinos y ovinos.

- **DOSIS**: Dirija la válvula hacia el sitio afectado aproximadamente 20 cm de distancia y presiónela rociando el producto hasta cubrir totalmente el área de piel o mucosa afectada.

- **TIEMPO DE RETIRO**: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 48 horas después de finalizado el tratamiento.

- **CONTRAINDICACIONES:** No almacenar este producto junto con alimentos. Evitar el contacto con los ojos. No

  perforar ni arrojar al fuego el envase vacío. Manténgase en un lugar fresco y seco. Manténgase fuera del alcance de los niños. Uso veterinario

- **MODO DE APLICACIÓN**: Aerosol
- **PRESENTACIÓN**: Envase metálico, aerosol por 375 mL
- **REGISTRO**: 6372 MV

# TINTA PARA TATUAR




TINTA PARA TATUAR FRASCO X 50

# PASTILLAS DE CLORO



PASTILLA DE CLORO POR KILOGRAMO

# KENOGAN




**Laboratorio:**

**EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS " VECOL"**
Av. El Dorado 82 - 93 Bogotá - Colombia
Teléfono: +(571)4254800
Fax: +(571)4254835
Mail: vecol@vecol.com.co
Sitio web: www.vecol.com.co

**Uso terapéutico:** ANTIINFLAMATORIO

**Principio Activo:** KETOPROFENO

**Especies:**

**Descripción:**

**KENOGAN** es un antiinflamatorio, analgésico, antipirético

| Composición | Contenido |
|---|---|
| Ketoprofeno | 100 mg |
| Excipientes csp | 1 ml |

- **ACCIÓN**: Antiinflamatorio, analgésico, antipirético
- **INDICACIONES**: Indicado como analgésico, antiinflamatorio, en alteraciones no infecciosas de los sistemas osteoarticular y músculo esquelético. En bovinos y porcinos como Coadyuvante en el tratamiento de mastitis bacteriana aguda, junto con la terapia antibiótica necesaria. En Porcinos como antipirético. En Equinos para aliviar el dolor visceral asociado con cólicos.
- **DOSIS**: Bovinos y Porcinos: 3 mg de Ketoprofeno / kg de peso vivo, es decir 3 ml / 100 kg de peso vivo durante 1 a 3 días consecutivos para Bovinos y única administración para porcinos vía Intramuscular o Intravenosa. Equinos: 2 mg de Ketoprofeno / kg de peso vivo, equivalente a 1 ml / 45 kg de peso vivo durante 3 a 5 días consecutivos vía Intravenosa. Caninos y Gatos: 2 mg de ketoprofeno / kg de peso vivo, es decir 0,5 ml / 25 kg de peso vivo durante 1 a 3 días consecutivos vía Intramuscular o Intravenosa en caninos y vía subcutánea en gatos.
- **TIEMPO DE RETIRO**: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento. No tiene tiempo de retiro en leche.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES**: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No administrar en pacientes con falla renal o hepática. No administrar en animales con úlceras gástricas y/o intestinales. No administrar en animales que presenten sensibilidad al principio activo. No administrar con otros antiinflamatorios no esteroides ni con fármacos anticoagulantes. Manténgase en lugar fresco y seco. Evite las temperaturas bajas.
- **MODO DE APLICACIÓN**: Solución inyectable
- **PRESENTACIÓN**: Frasco por 10, 50 y 100 ml
- **REGISTRO**: 8247 MV

# MARCADOR DE PIEL HOLSTEIN




MARCADOR DE PIEL HOLSTEIN