DESCRIPCION	Jabón líquido tópicoantiséptico
COMPOSICION	Cada 100 mL de QUIRUCIDAL NF contienen: Clorhexidina digluconato (Solución al 20%) equivalente a ...4,0 g de Clorhexidina digluconato Cetrimida ..... 1,0 g
ESPECIFICACIONES TECNICAS	**DESCRIPCION:** Líquido viscoso traslúcido, color verde esmeralda, ligero olor alcohólico, libre de partículas, grumos o materia extraña en suspensión. **pH:** 5,3 - 6,7 **GRAVEDAD ESPECÍFICA:** 1,025 – 1,038 **VISCOSIDAD:** 1800 – 3200 cps **SOLUBILIDAD:** Soluble en agua, parcialmente soluble en alcohol. **INFLAMABILIDAD:** Ninguna **MICROBIOLOGIA:** Recuento total de Mesófilos aerobios.....<200 UFC/mL Recuento total de Mohos y levaduras.....<20 UFC/mL Patógenos.....Ausentes
INDICACIONES DE USO	Jabón antiséptico de uso externo, indicado para: Limpieza y antisepsia de piel. Preparación prequirúrgica de piel y procedimientos generales. Lavado de manos en áreas críticas. La compatibilidad de la clorhexidina con los tensioactivos catiónicos se ha aprovechado para combinarla con al Cetrimida, que potencializa sus efectos antimicrobianos y ejerce una potente acción bactericida contra formas vegetativas Gram-positivas, Gram-negativas, protozoarios, hongos y virus. Añade además el efecto de detergencia, o propiedad de limpieza, características ventajosas en el tratamiento inicial de quemaduras y para remover la contaminación de las manos.
PRECAUCIONES DE USO	Uso externo. Retire el producto con suficiente agua una vez efectuada la limpieza, para prevenir reacciones adversas por acumulación de residuos del jabón (dermatitis). Si se observa cualquier reacción adversa suspenda su uso y acuda al médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.
CONTRAINDICACIONES	El producto sólo debe ser usado vía tópica. Evítese el contacto con los ojos, oídos, boca y mucosas. No debe ser utilizado en el tratamiento pre-operatorio de la cara o cabeza. El mal uso del producto puede causar serios y permanentes daños en los ojos si se da el contacto de residuos del producto con ellos durante un procedimiento quirúrgico; si esto llegara a ocurrir, se debe lavar de

COPIA NO CONTROLADA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

	inmediato y con abundante agua el área afectada. Clorhexidina al 4% no debe usarse en personas sensibles a la clorhexidina o a los componentes del producto, se puede presentar irritación, hipersensibilidad o reacciones alérgicas generalizadas con clorhexidina o con los productos que la contengan, especialmente en las áreas de los genitales. Si estas reacciones adversas ocurren, suspenda inmediatamente su uso y consulte a su médico. El uso repetido y prolongado de Cetrimida puede ocasionar hipersensibilidad cuando es usado en altas concentraciones. No poner en contacto con los ojos, zonas cerebrales, meninges, oído medio y cavidades del cuerpo, en general. Clorhexidina 4% jabón no deberá mezclarse con hipocloritos, jabones o detergentes, ni con otros jabones quirúrgicos, tales como los yodados. Embarazo y lactancia: No se conocen efectos nocivos cuando este medicamento es usado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Su uso está indicado solo si los beneficios potenciales son superiores a los riesgos para el feto. Se desconoce si la clorhexidina se excreta a través de la leche materna. Después de la exposición de los ojos a la Clorhexidina se han observado serias lesiones cuando el fármaco ha penetrado y permanecido en el ojo. Los efectos oculares incluyen edema de la córnea, serias lesiones del endotelio corneal, atrofia de iris, aplastamiento de la cámara anterior y aumento de la presión intraocular. En casos de perforación de la membrana timpánica, tomar precauciones para evitar la exposición de los tejidos del oído interno a la clorhexidina. Puede producirse una pérdida del oído si la clorhexidina permanece en contacto con el oído medio. La clorhexidina usada como antiséptico por vía tópica no debe usarse en pacientes con enfermedades de la piel o heridas que afectan a capas no superficiales de la piel. Este medicamento no debe utilizarse si el paciente es alérgico a alguno de sus componentes Sobre textiles y en contacto con derivados clorados la clorhexidina puede producir una mancha indeleble marrón.
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2019M-0019084
CLASIFICACION DEL RIESGO (RES. 4725 / 05), DISP. MED.	No aplica: Es un medicamento
BIODEGRADABILIDAD	No disponible
VIDA DE ANAQUEL	Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación
VIDA UTIL DESPUES DE APERTURA	90 días en condiciones óptimas de manejo y almacenamiento. En sistema cerrado (bolsa) vida útil: Hasta la fecha de vencimiento.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en su envase original. Manténgase en un lugar protegido de la luz.
PRESENTACION	Galón x 3750 mL; Bolsa x 1000 mL; 500 mL; Frasco x 1000 mL; 500 mL; 120 mL; 60 mL; 15 mL; Sachets x 5 mL

COPIA NO CONTROLADA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD