FICHA TÉCNICA
DUODERM® EXTRA THIN APÓSITO EXTRA DELGADO CGF®
PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR

PRODUCTO	
Nombre Genérico	**Apósito Extra Delgado CGF®**
Nombre Comercial	**DuoDerm® Extra Thin Apósito Extra Delgado CGF®**
Descripción	Son altamente flexibles, con fórmula del gel controlada, diseñados para utilizarse en heridas secas o ligeramente exudativas. Los apósitos Duoderm® Extra Delgados son particularmente convenientes en áreas sometidas a fricción, así como en áreas contorneables, como el codo, los talones, etc. Duoderm® Extra Delgado interactúa con la humedad de la herida formando una masa suave que permite retirar el apósito sin que se produzca daño alguno en los tejidos recién formados. Contribuye a proteger la herida contra contaminación bacteriana y externa.
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Inc. – Estados Unidos
Composición del Producto	Gelatina, Carboximetilcelulosa de Sodio, Pectina, Poli-isobutileno LMMH, Caucho de Butilo, Caucho Estireno-Isopreno-Estireno, Tetrakis Metano, Ester de Pentaeritritol Rosina A y Aceite Mineral soportados en una Película de Poliuretano. Papel de liberación en silicona y lengüeta de liberación PET
Características y Acciones del Producto	**Oclusivo**: DuoDerm® Extra Thin CGF® es impermeable a los líquidos, los gases y los microorganismos incluidos los virus del SIDA y la Hepatitis, reduciendo los riesgos de invasión bacteriana y viral.[4] Retiene el exudado y mantiene el medio ambiente húmedo óptimo para el proceso de cicatrización. **Mantiene el Ph ligeramente Acido** (5,0 – 6,0): reduce los riesgos de infección, por mayor actividad de los macrófagos en el control del crecimiento bacteriano. **Absorción de Exudado**: las sustancias hidrocoloides tienen capacidad de absorber y controlar el exudado, permitiendo cambios de apósito entre 1 y máximo 7 días. **Impermeable a los Líquidos**: reduce los riesgos de contaminación de la lesión en pacientes y mejora la calidad de vida, ya que le permite realizar el baño general en ducha sin necesidad de un cubrimiento adicional.
Usos	Tratamiento de úlceras dérmicas superficiales, secas o ligeramente exudativas, heridas postquirúrgicas, apósito protector
Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. • Valorar el lecho de la lesión (condiciones de la herida) y la piel circundante • Limpiar el lecho de la lesión y la piel circundante con solución salina normal, sin utilizar soluciones antisépticas. Secar bien la piel perilesional para asegurar la adhesividad del apósito a la piel sana. • Remover la mayor cantidad de tejido necrótico posible antes de iniciar la terapia • Elegir un tamaño de apósito que sobrepase por lo menos 3 cm, el tamaño de la lesión. • Cambiar el apósito cuando se filtre por alguno de sus bordes. • Explicar al paciente las características del drenaje que se encuentra al retirar el apósito.

	• No utilizar el apósito en combinación con otros productos para el cuidado de las heridas no probados clínicamente por ConvaTec® y sin autorización médica.
Soporte Científico	1. Harding K, Cutting K, Price P The cost- effectiveness of wound managemet protocols of care. Br J Nursing. 2000 (suppl) Vol 9, No19 2. Kernstein M D, German E, Van Rijswijk L, Lyder CH, Phillips T, Xakells G Golden K Harrington C. Disease Management and Health Outcomes 2001;9(11):651-663 3. Flam,E. Raab, L. Dressing Surface Fiction Against besheets and Adhesion Forces of Dressing to Sking. Poster Presented at Advanced Wound Care Symposium, 1991. 4. Bowler, P.J., Delargy, H., Prince, D., Fondberg, L. The Viral Barriel Properties of Some Occlusive Dressings and Their Role in Infection Control. Wounds. 1993; 5 (1): 1-8
Registro Sanitario:	INVIMA 2013DM-0001793R1 VIGENCIA: ABRIL 30 DE 2023
Presentaciones:	Apósitos Cja x 10 de 10x10 cm – 15x15 cm - 5x10cm Cja x 20 de 5x20 cm -

FORMATO DE CALIFICACIÓN
APOSITO DUODERM® CGF® EXTRA DELGADO

Calificación de 1 a 5 5= Excelente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LA INSTITUCION

CONCEPTO TÉCNICO					
Oclusividad del apósito	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Adhesividad:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Facilidad de Aplicación y Remoción:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Reducción de la Frecuencia de Cambios de Apósito:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Capacidad de Formación de Tejido de Epitelización:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Adaptabilidad a zonas irregulares	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Impermeabilidad de la capa externa	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Comodidad para el Paciente	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Presentación:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Calidad:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Empaque:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Servicio de Asesoría Profesional:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					

Versión 01
Vigente desde: 08-07-2013
CO-FIC-GCR-019