METSULFURON METIL 60% WG-DVA

Registro Nacional ICA No. 555
Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.

GENERALIDADES

Tipo de Producto:	Herbicida Agrícola
Formulación:	Gránulos Dispersables -WG
Ingrediente Activo:	Metsulfuron Metil
Concentración:	600 g/kg
Categoría Toxicológica:	III – Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Potreros
Presentación Disponible:	1 kg

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

METSULFURON METIL 60 % WG-DVA, es un herbicida selectivo perteneciente al grupo de las sulfonilúreas que presenta acción sistémica. Es absorbido por las raíces o por el follaje de las plantas tratadas que mueren despues de 3 o 4 semanas. En hojas anchas, las plantas presentan falta de crecimiento, nervaduras rojas y los puntos de crecimiento muertos, aunque las hojas basales permanezcan verdes. El mecanismo de acción de este herbicida es la inhibición de la enzima Acetolactato sintasa (ALS) provocando que no se sinteticen los aminoácidos valina, leucina e isoleucina, por lo que la planta no puede producir proteínas y muere.

Las malezas no presentarán síntomas iniciales de fitotoxicidad, pero su actividad y competencia con el cultivo es nula. El control es más efectivo en malezas en crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Metsulfuron Metil.....600 g/kg

methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

METSULFURON METIL 60 % WG-DVA, se aplica en postemergencia al cultivo y a las malezas en crecimiento activo. Rotar las aplicaciones con herbicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico, dentro de un programa de manejo integrado de malezas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

RECOMENDACIONES DE USO

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis	P.C.	P.R.
Potreros	Bledo (*Amaranthus dubius*), Helecho (*Pteridium aquilinum*), Mortiño (*Clidemia hirta*), Mortiño blanco (*Clidemia rubra*), Escoba (*Sida rhombifolia*), Lechosa (*Euphorbia heterophylla*), Batatilla (*Ipomoea sp.*), Dormidera (*Mimosa pigra*), Verdolaga (*Portulaca oleracea*), Pega-pega (*Desmodium tortuosum*), Venturosa (*Lantana camara*), Lechosa (*Euphorbia heterophylla*), Botón blanco (*Eclipta alba*), Chilinchil (*Cassia tora*).	15 g/ha	N.A.	4 horas

P.C: Periodo de Carencia: Intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar guantes.

N.A.: No Aplica.

Agregue agua al tanque de mezcla hasta 1/2 de su capacidad. Vierta el producto directamente al tanque y mezcle bien mediante agitación mecánica o hidráulica, complete con el volumen deseado de agua, manteniendo una agitación constante. Use de 200 a 400 L de agua por hectárea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados en arroz. Sin embargo, es recomendable efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.

No fitotóxico a las dosis recomendadas en la etiqueta. Hacer pruebas de fitotoxicidad a pequeña escala con nuevas variedades o híbridos vegetales.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Marca Comercial	NUTRIMON® Productivo en su cultivo
Grado	**15-4-23-4**
Composición garantizada	Nitrógeno Total (N) 15.0 % Nitrógeno Amoniacal (N) 8.7 % Nitrógeno Nítrico (N) 6.3 % Fósforo asimilable (P_2O_5) 4.0 % Potasio soluble en agua (K_2O) 23.0 % Magnesio (MgO) 4.0 % Azufre Total (S) 2.0 % Boro (B) 0.1 % Cobre (Cu) 0.04 % Zinc (Zn) 0.1 %
Registro de Venta ICA	3331
Tipo de abono	Fertilizante complejo granulado N-P-K para aplicación al suelo.
Empaque	Bultos de 50 kilos.
Aplicaciones	Fertilizante complejo granulado con relación N-P-K cercana a 4-1-6-1(MgO)-0.5(S) altamente soluble, que permite una dosificación nutricional balanceada, especialmente apropiada para el cultivo del banano. También puede ser adecuado para la fertilización de mantenimiento en cultivos frutales perennes, tales como cítricos (naranja, tangelo, mandarina y limón) y caducifólios (manzana, duraznero, peral, ciruelo y mango). Además es apropiado para café en producción y palma aceitera.

DOGO 75.7 SG - DVA

Gránulos solubles - SG

Herbicida agrícola
Reg. Nal. ICA No. 1813
Titular del registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Ingrediente activo:
Glifosato 730 g/kg
Equivalente a 757 g/kg de sal monoamónica de Glifosato
N-(phosphonomethyl)glycine
Ingredientes aditivos c.s.p. 1 kg

DOGO 75.7 SG – DVA es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente a las malezas y acción sistémica. Penetra por las hojas y se mueve dentro de las partes aéreas y subterráneas de las malezas causando su muerte entre los 7 y 15 días despues del tratamiento. Glifosato es absorbido a través del follaje y se transloca a través de la planta. El producto se concentra en los tejidos meristemáticos. Las malezas expuestas a glifosato inicialmente presentan detención del crecimiento, pierden la coloración verdosa, luego sus tejidos se aprecian rugosos o malformados y posteriormente se tornan necróticos; finalmente las plantas mueren.

El producto no es volátil. Para evitar daños a cultivos vecinos, se recomienda hacer una aplicación dirigida utilizando pantalla protectora.

Cultivo	Plaga	Dosis	P.C.	P.R.
Potreros	Cadillo (Cenchrus echinatus L.) Pega-pega (Setaria verticillata) Pata de gallina (Eleusine indica) Falsa caminadora (Ischaemum rugosum) Chipaca (Bidens pilosa)	1.5 kg /ha Una aplicación por ciclo	21 días	0 horas
P.C.: Periodo de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. P.R.: Periodo de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.				

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplique una vez por ciclo de cultivo o cosecha. Rotar con herbicidas de diferente mecanismo de acción para evitar el desarrollo de malezas resistentes a este ingrediente activo. Aplicar a la pradera cuando se desee renovar o de manera focalizada, evitando dañar las áreas aledañas, pues el producto no es selectivo. Se debe garantizar un buen cubrimiento de la aspersión ya que el herbicida se inactiva en el suelo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Para la preparación de la mezcla, adicione el producto a una cantidad de agua equivalente a ¼ del volumen de mezcla a preparar y agite hasta formar una suspensión homogénea, luego vierta esta mezcla al tanque manteniendo la agitación y proceda a realizar la aplicación. Utilice el equipo adecuado, correctamente calibrado con el fin de obtener un cubrimiento uniforme de la aspersión. Durante la aplicación mantenga la mezcla en agitación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Realizar pruebas previas. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas, con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas de fitotoxicidad previas a la aplicación masiva.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS".

PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITA RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).

CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.

CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, PROBABLE CANCERÍGENO

SE PROHÍBE LA UTILIZACIÓN DE ESTE ENVASE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA EL CONSUMO.

Este herbicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "no coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".

Durante las aplicaciones terrestres "utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas" además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para plaguicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta".

Inhalación: Traslade a la persona afectada lejos del área contaminada y llévela a un lugar bien ventilado. Manténgala en reposo y bien abrigada. Busque atención médica.

En caso de contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa y calzado contaminado. Lavar la zona afectada con jabón y mucha agua.

En caso de contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución, de 15 a 20 minutos. Retirar las lentillas. Mantenga los párpados abiertos mientras se lava.

En caso de intoxicación oral suministre al paciente grandes cantidades de agua. NO INDUZCA AL VÓMITO. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 01 800 09 16012 fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la normatividad local vigente en materia de residuos peligrosos tipo plaguicida. No utilice el mismo equipo de fumigación, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

“Respetar franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua o cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación. Inactive los residuos y desechos lavándolos con una solución de hidróxido de sodio (soda cáustica) al 5%, o con solución de carbonato de sodio de 7 a 10% de concentración.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

PRESENTACIONES: 1, 4, 5 o 10 kg

Aftogán 2ml



Vacuna oleosa concentrada para prevenir la Fiebre Aftosa en bovinos. Suspensión bivalente del virus de la Fiebre Aftosa elaborada con los subtipos A24 Cruzeiro y O1 Campos cultivados en células BHK (Riñón de Hámster Lactante) en suspensión, inactivados con BEI y emulsionados en adyuvante oleoso. Indicada para la inmunización activa contra la Fiebre Aftosa en bovinos sanos.

Dosis y vía de administración: Aplicar exclusivamente a bovinos, 2 ml por vía intramuscular (I. M.), en el anca o tabla del cuello, o subcutánea (S. C.), en la tabla del cuello, en la región pre o pos escapular (delante o detrás de la “paleta”) o en la fosa isquiorrectal (FIR). Se recomienda vacunar ternero(a)s desde los tres meses de edad. Utilizando aguja estéril y/o limpia para cada animal.

ADVERTENCIA: Por ser un producto biológico, pueden aparecer individuos alérgicos al mismo. Se recomienda disponer de un botiquín de emergencias conteniendo: un antihistamínico (ALERVEC®), un antiinflamatorio (FLUNIXINA) y un broncodilatador.

Presentación: Frascos por 10, 25 y 50 dosis.

Registro ICA No.3414 DB

Especie / Cultivo:	
Dosis y Vía de Administración	Aplicar exclusivamente a bovinos, 2 ml por vía intramuscular (I. M.), en el anca o tabla del cuello, o subcutánea (S. C.), en la tabla del cuello, en la región pre o pos escapular (delante o detrás de la “paleta”) o en la fosa isquiorrectal (FIR). Se recomienda vacunar ternero(a)s desde los tres meses de edad. Utilizando aguja estéril y/o limpia para cada animal. ADVERTENCIA: Por ser un producto biológico, pueden aparecer individuos alérgicos al mismo. Se recomienda disponer de un botiquín de emergencias conteniendo: un antihistamínico (ALERVEC), un antiinflamatorio (62) y un broncodilatador.

Presentación	Frascos por 10, 25 y 50 dosis.
Registro ICA No.	3414 DB

BRUCELLA ABORTUS RB51® BECERRAS



Vacuna contra la brucelosis bovina.

SAGARPA B-0273-233

Solución inyectable

Vacuna contra la brucelosis bovina

FÓRMULA: Vacuna contra Brucella abortus.

INDICACIONES Y VENTAJAS: Para la inmunización de becerras sanas de la especie bovina en la prevención de infecciones y abortos causadas por Brucella abortus. Única elaborada a partir de cepas rugosas, vivas y estables, que inducen una sólida respuesta inmune protectora. Permite un adecuado control diagnóstico. La vacunación con la cepa RB51® permite hacer diagnóstico a través de serología en animales sospechosos, sin falsos positivos, ya que las inmunoglobulinas generadas por vacunación son distintas generadas por la enfermedad aguda. Administrarse en hembras de entre 4 y 12 meses de edad.

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Administrar 2 ml vía subcutánea. Rehidratar usando solamente el diluente para RB51® proporcionado con esta vacuna liofilizada. Agítese bien antes de usar y manténgase en constante agitación durante su uso para asegurar la correcta cantidad de microorganismos inoculados. En caso de inoculación accidental en humanos consulte a su médico.

ADVERTENCIAS: Consérvese entre 2 y 7°C protegida de la luz solar. Incinere los envases vacíos. No se administre a bovinos machos ni hembras adultas. El periodo de retiro deberá ser de 12 semanas en animales destinados a consumo humano.

RECOMENDACIONES: Una vez rehidratada la vacuna, el contenido deberá ser utilizado dentro de los siguientes 60 minutos.

PRESENTACIÓN: Frasco con 25 dosis.

Curagan® NL

LARVICIDA ANTISÉPTICO
AEROSOL TÓPICO



COMPOSICIÓN
Cada 100 mL contienen:

Cipermetrina High Cis	1.25 g
Piperonil butóxido	1 g
Violeta de metilo	0.5 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

DESCRIPCIÓN
Larvicida, antiséptico con base en cipermetrina y violeta de metilo con propelente que no daña la capa de ozono.

INDICACIONES
Larvicida y antiséptico para gusaneras (miasis) y heridas, afecciones locales en general como son las lesiones podales y de los pezones, úlceras, abscesos, escoriaciones de la piel y heridas en general.

USOS
- Por su acción larvicida, ayuda a la desinfección y cicatrización de las heridas y controla de manera eficaz las gusaneras o miasis.
- Asepsias en cirugías: castraciones, cesáreas, cortes de cola.
- Heridas, infecciones microbianas, de pezuñas, pezones, onfaloflebitis.
- Infecciones bacterianas secundarias en lesiones de fiebre aftosa y estomatitis vesicular, sabañon, pododermatitis.
- Escoriaciones y úlceras de la piel, mataduras.
- Uso en bovinos, equinos, porcinos, caninos, caprinos y ovinos.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Dirija la válvula hacia el sitio afectado, a unos 20 cm de distancia y presiónela rociando el producto hasta cubrir totalmente el área de piel o mucosa afectada.

PRECAUCIONES
No almacenar este producto junto con alimentos. Evitar el contacto con los ojos. No perforar ni arrojar al fuego el envase vacío. Manténgase en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN
Envase metálico, aerosol por 375 mL.

TINTA STONE PARA TATUAR × 3 OZ.

Línea Veterinaria - Sistemas de identificación

Ficha No. 165 V.1

DESCRIPCIÓN

Tinta para tatuar animales, con el fin de facilitar su identificación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Colores: negro y verde

ATRIBUTOS

*Indeleble.
*No genera reacción física.
*Liquido.
*Color: negro o verde.
*Olor: sin olor.
*Solubilidad: insoluble en agua.



1.Recomendaciones de uso

Aplicar el tatuaje en la parte que va a ser marcada, teniendo cuidado de ejercer una presión suficiente para asegurar perforaciones perfectas. Frotar la **TINTA STONE** y el tatuaje hasta el fondo de las perforaciones hasta que cada agujero por separado se llene.

2. Recomendaciones de almacenamiento

* No la exponga a temperaturas excesivas.
* Mantenga la tapa bien ajustada para evitar que se seque.

3. Recomendaciones de seguridad

Piel: No irrita si se usa normalmente.
Ojos: Puede causar irritación menor.
Ingestión: Ingestión accidental puede causar irritación. Consulte al médico en el menor tiempo posible.
Inhalación: Efecto desconocido.

GUSANTROL NF UNGUENTO



Laboratorio:
Chalver
Laboratorios
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. SALUD ANIMAL

Uso terapéutico: ECTOPARASITICIDA

Principio Activo: TRICLORPHON, METRIFONATO, FENOL, ACEITE DE PINO

Especies:



Descripción:

GUSANTROL NF *es un ectoparasiticida*

Composición	Contenido
Triclorfón	3 g
Fenol	1 g
Aceite de pino	-
Excipientes csp	100 g

- ***ACCIÓN****: Ectoparasiticida, repelente y cicatrizante*
- ***INDICACIONES****: Está indicado en Bovinos, Equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos: En el tratamiento y control de las gusaneras y nuche (Tórsalo) producidos por larvas de moscas, como: Cochliomyia hominivorax, Chrysomyia spp, Dermatobia hominis, Lucilia spp,*

Sarcophaga carnaria y Oestrus ovis, controla las sarnas y tiene acción repelente, desinfectante y cicatrizante. En el tratamiento de la escabiosis.

- ***DOSIS**: Aplique una vez al día, con paleta o espátula en las zonas afectadas por gusaneras, nuches o sarnas; sobre las heridas y ulceraciones de la piel, después de castrar, descornar, marcar y sobre el ombligo de los recién nacidos, en el control del gusano de la nariz de las ovejas aplicar alrededor de las fosas nasales. Puede repetirse hasta la curación completa.*

- ***TIEMPO DE RETIRO**: No sacrificar animales cuya carne se destine al consumo humano hasta transcurridos 14 días del último tratamiento. En animales en producción láctea aplicar después del ordeño*

- ***CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No debe almacenarse junto con los alimentos. Debe conservarse en su envase original debidamente identificado. Evite la ingestión del producto. Lávese con abundante agua y jabón la parte del cuerpo que haya estado en contacto directo. No contamine fuentes de agua con el envase, destrúyalo después de usar su contenido. **Gusantrol® NF** ungüento está clasificado como medianamente tóxico para el hombre y los animales. Pero es muy tóxico para los insectos, peces y aves.*
- ***MODO DE APLICACIÓN**: Ungüento*
- ***PRESENTACIÓN**: Envase plástico por 60 g, 220 g y 400 g.*
- ***REGISTRO**: 3954 DB*

FICHA TECNICA POMADA ALFA

Laboratorio:

LABORATORIOS ZOO S.A.S.

Uso terapéutico: CICATRIZANTE

Principio Activo: OXIDO DE ZINC, ACEITE DE PINO, ACIDO FENICO

Especies:



Descripción:

ALFA 3 CREMA *es cicatrizante, secante, desinfectante y repelente de insectos*

Composición	***Contenido***
Ácido fénico	*1.5 g*
Óxido de zinc	*7 g*
Aceite de pino	*2 g*
Excipientes csp	*100 g*

- ***ACCIÓN****: Cicatrizante, secante, desinfectante y repelente de insectos*
- ***INDICACIONES****: En bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos y caninos como cicatrizante, antiséptico, secante y repelente de insectos. Desinfección, secado y estimulación de la cicatrización en todo tipo de heridas. Actúa como repelente de insectos, impide el desarrollo de miasis (gusaneras). Útil en desgarres de la piel, heridas y grietas en glándula mamaria (ubres y pezones), úlceras causadas por sillas y arneses, infecciones del ombligo (onfalitis), caudectomías (corte de cola en ovejas), y en heridas quirúrgicas, para lograr una cicatrización rápida sin infección. Alfa-3 mezclado con productos insecticidas de uso tópico que contengan coumafós, diazinón, metrifonato y diclorvós es útil para el tratamiento de las miasis (gusaneras).*
- ***DOSIS****: Aplicar una cantidad suficiente para cubrir el área afectada con una capa uniforme de crema.*
  Aplicar uniformemente sobre la herida, 3 - 5 veces al día, durante 7 días seguidos como mínimo. En caso de heridas contaminadas: lavar la zona afectada con jabón o soluciones antisépticas, secar y aplicar AlfaA-3 hasta la cicatrización de la herida.
- ***TIEMPO DE RETIRO****: No posee*
- ***CONTRAINDICACIONES:*** *Cuando se utilice en glándula mamaria, aplicar después del ordeño. No aplicar en gatos. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.*
- ***MODO DE APLICACIÓN****: Crema tópica*
- ***PRESENTACIÓN****: Tubo colapsible por 30 mL Frasco plástico por 250 mL.*
- ***REGISTRO****: 1869 DB*

Baycox® 5%

Coccidicida
Suspensión Oral

Bovinos - Porcinos



Registro ICA No. 6914-MV	**Vida Útil:** 60 Meses	**Fabricante:** Bayer KVP Pharma - Alemania
Presentaciones de Venta:	Caja x 1 Frasco de 250 mL Caja x 1 Frasco de 500 mL	
Concepto Toxicológico: No Aplica	**Licencia Ambiental:** No Aplica	
Composición garantizada:	Cada mL contiene: Toltrazuril(1-[3-metil-4(4'-trifluorometiltiofenoxi)fenil]-3-metil-1,3,5-triazina-2-4-6-(1H,3H,5H)Trionina.....50 mg Excipientes c.s.p..... 1 mL	
Indicaciones:	En porcinos: Para el control y tratamiento de signos clínicos de coccidiosis en lechones neonatales causada por Isospora suis. En terneros: para el control y tratamiento de signos clínicos de coccidiosis causada por Eimeria bovis, Eimeria zuernii y Eimeria alabamensis.	
Recomendaciones de uso:	Esta recomendado para la prevención y el tratamiento de la coccidiosis en animales jóvenes. Para un mejor resultado los animales deben ser medicados de manera preventiva antes de que se presenten los signos clínicos. En la práctica se recomienda que los cerdos sean tratados entre los días 3 - 5 después del nacimiento. En terneros se recomienda hacer tratamiento antes de reagrupar los terneros. Este esquema de tratamiento preventivo permite proteger el intestino de la infección y disminuye la liberación de ooquistes al ambiente. En el caso de tratamientos clínicos de diarreas, se recomienda previamente confirmación diagnostica de la presencia de coccidios en las heces.	
Dosificación y modo de administración:	**AGITAR BIEN ANTES DE USAR** El tratamiento debe realizarse en forma individual. **Porcinos:** Cada lechón debe ser tratado en el día 3 - 5 de vida con una dosis oral única de 20 mg de toltrazuril/Kg de peso equivalente a 0,4 mL de suspensión oral por kilo de peso. **Terneros de hasta 9 meses:** Cada ternero debe ser tratado con una dosis oral única de 15 mg de toltrazuril/Kg de peso equivalente a 3,0 mL de suspensión oral por 10 kilos de peso. Para obtener un máximo beneficio, los animales deberían ser tratados antes de la aparición de signos clínicos.	

Contraindicaciones:	**Efectos secundarios:** No se han descrito. **Interacciones con otros medicamentos:** No se han descrito. **Sobredosis:** No se han descrito. Una sobredosis de tres veces es bien tolerada por lechones y terneros sanos.
Precauciones:	Después de abierto el envase para la primera administración, usar el producto dentro de 3 meses. Descartar el material sin usar después de este periodo de tiempo. Precauciones especiales para desechar los productos no utilizados o los residuos: Cualquier medicamento veterinario no utilizado o residuo derivado de este medicamento veterinario debe desecharse según las normativas locales. Colombia: No reutilizar los envases vacíos, deshacerse de los envases vacíos y sus residuos acorde a la normatividad ambiental vigente de gestión integral de residuos. En caso de derrame del producto en humanos, sobre la piel y ojos, lavar dichas superficies con abundante agua. **Venta bajo receta/prescripción del Médico Veterinario.**

Tiempo de retiro:	Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta: Cerdos: 77 días Bovinos: 63 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a vacasen producción de leche para el consumo humano.
Condiciones de almacenamiento:	Consérvese entre 15℃ y 30℃, en un lugar seco, protegido de l os rayos directos del sol y donde no se contamine con olores fuertes.
Material de empaque:	Caja de cartón blanca, con 1 frasco plástico. Presentación de 250 mL tiene tapa dispensadora, el de 500 mL tiene tapa de rosca.

Ubrolexin®

Suspensión intramamaria

Descripción
Combinación antibiótica intramamaria sinérgica y de amplio espectro, para el tratamiento de mamitis de vacas en lactación.

Características
Contiene Xelerin® combinación sinérgica de cefalexina y kanamicina.
Eficacia bactericida de amplio espectro.

Beneficios
Amplia y duradera supresión del crecimiento bacteriano de los principales patógenos de la mamitis.
Completa eficacia con una menor proporción de antibiótico.

Ventajas
Efectivo y práctico tratamiento.
Sólo dos administraciones con un intervalo de 24 horas.

Especies de destino
Bovino (vacas lecheras en lactación).

Indicaciones
Tratamiento de mastitis clínicas en vacas lecheras en lactación causadas por bacterias susceptibles a la asociación de cefalexina y kanamicina como *Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis y Escherichia coli.*

Posología y administración
Para uso intramamario. Tratar el/los cuarto(s) infectado(s) dos veces, con un intervalo de 24 horas entre tratamientos. Utilizar el contenido de una jeringa (que contiene 200 mg de cefalexina como monohidrato y 100.000 U.I. de kanamicina como monosulfato) por cuarto y tratamiento.

- Acción sinérgica de Xelerin®
- Eficacia bactericida
- Amplio espectro de acción

Precauciones
El producto sólo debe utilizarse para el tratamiento de la mastitis clínica. El uso debe estar basado en la susceptibilidad probada de las bacterias aisladas del animal. Si no es posible, la terapia debería estar basada en información epidemiológica local (a nivel regional y de la granja) sobre la susceptibilidad de las bacterias y teniendo en cuenta las políticas antimicrobianas nacionales.

Tiempo de espera
Carne: 10 días.
Leche: 5 días.

Presentación
20 jeringas de 10 g (12 ml), incluyendo 20 toallitas para pezón.



Boehringer Ingelheim

Ir al Índice

VOLVER CONTENIDO

NOVARTIS

Belamyl-R®

INYECTABLE - ANTIANÉMICO ERITROPOYÉTICO



COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:

Tiamina	10 mg
Riboflavina	3 mg
Nicotinamida	100 mg
Vitamina B12	50 µg

INDICACIONES

Antianémico, reconstituyente, coadyuvante en el tratamiento y convalescencia de enfermedades por parásitos internos y hemoparásitos.

En todas las especies de animales domésticos, en casos de anemias, enflaquecimiento, debilidad, retraso en el crecimiento, hemorragias y como coadyuvante nicotinamida contra otras enfermedades.

La tiamina, riboflavina y nicotinamida son componentes de una o varias coenzimas que desempeñan un importante papel en el metabolismo del animal, en la biotransformación de alimento en energía y en el mantenimiento de los tejidos del cuerpo. La vitamina B_{12} tiene propiedades antianémicas, por lo tanto se recomienda en la prevención y tratamiento de anemias y en deficiencia de vitaminas del complejo B.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

DOSIFICACIÓN

Animales grandes: 10 mL.
Animales medianos: 5 a 8 mL.
Animales pequeños: 1 a 3 mL.
Diario o en días alternos, hasta 5 - 10 dosis (20 dosis en casos graves).

TIEMPO DE RETIRO

No tiene.

PRESENTACIÓN

Frasco por 10, 30, 50, 100, 250 y 500 mL.

YODEX



YODEX es un microbicida yodofóro con base en yodo controlado, en cuya composición intervienen ingredientes que le confieren óptima estabilidad, acción detergente, propiedades anticorrosivas, con agentes tensos activos no iónicos, que prolongan y conservan su efecto antimicrobiano, por lo cual resulta ideal para la desinfección y limpieza a fondo de instalaciones y equipos, tales como: Granjas avícolas, incubadoras, comederos y bebederos, establos porquerizas, caballerizas, vehículos de transporte y plantas procesadores de lácteos y alimentos.

INDICACIONES
Desinfectante de uso externo. Actúa contra microorganismos, gram+, gram-, virus, hongos, esporas, algas y levaduras, destruyendo microbios, termófilos, mesófilos y criófilos
MECANISMOS DE ACCION

El Yodo es un elemento altamente reactivo, lo cual lo hace un excelente germicida. La forma activa desinfectante del Yodo es mediante dos mecanismos de acción, que incluyen la inactivación de algunas enzimas y la coagulación de proteínas. Destruye todo tipo de bacterias en forma no selectiva, incluyendo esporas, también es efectivo contra hongos, virus y protozoarios; Frente a los virus destruye la cápsula de protección viral ya sea por coagulación de proteínas o por bloqueo de la actividad enzimática.
RECOMENDACIONES:

- Si la solución pierde el color característico, redosificar para mantener su poder desinfectante.
- Almacene en un sitio seco y protegido de la luz.
- Mantenga fuera del alcance de niños.

Nitrógeno Líquido

Denominación: Nitrógeno (N_2)

Pureza: ≥ 99,995 %

Normativa: ISO 14175 - N1- N

Forma de suministro:
- Para pequeños consumos: en recipientes criogénicos desde 60 a 600 litros.
- Para grandes consumos: se instalan en el cliente los depósitos de nitrógeno líquido con su equipo correspondiente, que se llenan mediante cisternas criogénicas.

Factores de conversión:

m³ gas (1 bar y 15 °C)	litros gas licuado (en equilibrio a 1 bar)	kg
1	1,448	1,170
0,691	1	0,808
0,855	1,238	1

Clasificación de Transporte / ADR: Clase 2,3° A N° ONU 1977

Características: El nitrógeno es un gas incoloro e inodoro, formando parte del aire atmosférico en un 78,09% vol.
El nitrógeno líquido glasifica a temperatura ambiente.

Fórmula química:	N_2	
Masa molecular:	28,013 g/mol	
Punto triple:	Temperatura:	63,2 K (-210,0 °C)
	Presión:	125,3 mbar
	Calor latente de fusión:	25,8 kJ/kg
Punto de ebullición a 1013 mbar:	Temperatura:	77,4 °K (-195,8 °C)
	Calor latente de ebullición:	199 KJ/kg
Punto crítico:	Temperatura:	126,2 °K (-147,1 °C)
	Presión:	34,0 bar
	Densidad:	0,314 kg/litro
Estado gaseoso a 1 bar y 15 °C:	Densidad relativa al aire:	0,967

Fenbendazol 25%




Suspensión oral que contiene Fenbendazol micronizado, Indicada en bovinos, ovinos y caprinos para controlar las infestaciones por parásitos gastrointestinales y pulmonares como Haemonchus sp, Ostertagia sp, Cooperia sp, Nematodirus sp, Oesophagostomum sp, Strongyloides sp, Dictyocaulus sp, Trichostrongylus sp, y Moniezia sp, entre otros. En porcinos para: Oesophagostomum sp, y Trichuris sp. En equinos: grandes estróngilos: S. edentatus, S. equinus, S. vulgar; pequeños estróngilos: Cyathostomum sp, Cylococylus sp, Cylicostephanus sp, Triodontaphorus sp y Oxyuris equi., Neoascaris sp y Oxyurus sp. En caninos para: Trichuris sp, Capillaria sp, y Ascaris sp.

Dosis y vía de administración: Uso oral en todas las especies y/o intrarruminal en bovinos, ovinos y caprinos. La frecuencia de administración depende del Médico Veterinario tratante: Administrar a bovinos, ovinos y caprinos: 1 ml de producto / 50 kg de peso vivo. A equinos: 1 ml de producto por cada 33 kg de peso vivo. A caninos: 1 ml de producto por cada 5 kg de peso vivo. A porcinos: 1,5 ml de producto por cada 50 kg de peso vivo. Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano

Presentación: Frascos por 120 y 500 ml. Garrafas por 2000 ml. Jeringas por 12 ml.

Registro ICA No. 6398 MV

Especie / Cultivo:	
Dosis y Vía de Administración	Uso oral en todas las especies y/o intrarruminal en bovinos, ovinos y caprinos. La frecuencia de administración depende del Médico Veterinario tratante: Administrar a bovinos, ovinos y caprinos: 1 ml de producto / 50 kg de peso vivo. A equinos: 1 ml de producto por cada 33 kg de peso vivo. A caninos: 1 ml de producto por cada 5 kg de peso vivo. A porcinos: 1,5 ml de producto por cada 50 kg de peso vivo. Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano
Presentación	Frascos por 120 y 500 ml. Garrafas por 2000 ml. Jeringas por 12 ml.
Registro ICA No.	6398 MV

GANADERO 2000

INDICACIONES:
Suplemento energético. Suministrar a bovinos y equinos adultos, como complemento a los pastos y forrajes a razón de 0.5 a 1.0 Kg, por cada 100 Kg. de peso vivo/día, repartido en dos porciones; o de acuerdo con las recomendaciones de su asesor técnico, Médico Veterinario o Zootecnista.

INGREDIENTES:
Salvado de maíz, salvado de trigo, melaza, carbonato de calcio, BHT (Betahidroxitolueno).

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

PROTEÍNA	10% mín.
FIBRA	10% máx.
GRASA	5% mín.
CENIZAS	11% máx.
HUMEDAD	12% máx.

ADVERTENCIA:
Mantener el producto en un sitio seco sobre estibas, nunca en contacto con el suelo y arrumes máximo de 12 bultos. Se requiere inspección frecuente; si el producto entra en descomposición es peligroso darlo a los animales.

Registro ICA No. 6899 AL

Lote No.

Peso neto: (al empacar) 40 Kilos

Fecha de Fabricación:

Vencimiento: 60 días a partir de la fecha de fabricación

FICHA TECNICA MELAZA



DESCRIPCIÓN:

Líquido viscoso de origen vegetal, de color marrón oscuro, procedente de la concentración de los caldos de producción de azucar de caña de azucar. De calidad alimentaria, sus propiedades como fertilizante son muy interesantes.

Totalmente soluble en agua.

COMPOSICIÓN: valores expresados en % peso/peso sobre muestra húmeda:

pH.....	5.0	
C. E. (mS/cm).....	31.5	
DENSIDAD (Kg/l).....	1.4	
HUMEDAD (%).....	26.0	(a 110ºC)
CENIZAS (%).....	12.30	(Por calcinación 550ºC)
MATERIA ORGÁNICA (%).....	61.7	(Por calcinación 550ºC)
EXTRACTO HUMICO TOTAL (%)	56.5	
NITRÓGENO TOTAL (%N).....	1.3	
FOSFORO TOTAL (% P_2O_5).....	0.5	
POTASIO TOTAL (% K_2O).....	4.0	

MODO DE ACCIÓN La melaza por su alto contenido en carbohidratos y minerales se emplea principalmente como suplemento alimenticio en rumiantes y su contenido de azucares solubles promueven un rápido desarrollo de las bacterias microorganismos de suelo, La acción principal es como adherente, pero también tiene carácter neutralizador. La melaza al aplicar por sistema de riego en los suelos hay un aumento de la presión osmótica por cierta sustancia como la sacarosa que es bastante efectiva para disminuir poblaciones de nematodos de suelo.

ALMACENAMIENTO Manténgase en lugares frescos, secos y ventilados. Alejados de fuentes de ignición, calor y luz solar directa. La melaza no debe calentarse a temperaturas superiores a 40 ºC. Peligro de descomposición, autocalentamiento, formación de espuma y gas.

VIDA UTIL El producto mantiene sus propiedades durante 12 meses a partir de su fecha de producción.

FICHA TÉCNICA LIMA TRIANGULAR CON MANGO BIMATERIAL



Modelo:Triangular regular
Tipo: Lima
Dimensiones:
Ancho (Cm)
3 cm
Profundidad (Cm)
1.4 cm
Alto (Cm)
32 cm
Observaciones: Producto no es inoxidable.
Tipo de perfil: Biselado
Material del mango: Plástico
Advertencia de uso: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer indicaciones del producto antes de utilizar (si lo tuviera), para obtener un buen desempeño del producto. Utilizar los equipos de seguridad adecuados. Usar la herramienta para el trabajo que fue diseñado.
Medida: 8"
Tipo de uso: Profesional
Recomendaciones de uso: Mantener el producto en un lugar limpio y ventilado, lejos de humedad. Almacenar la herramienta lubricada, si es por largo tiempo. Respetar las capacidades optimas de uso. Elegir el tipo de herramienta adecuada asegurara un mejor desempeño de la herramienta y facilitara su labo

FICHA TÉCNICA MACHETE



DESCRIPCIÓN: Corte de matorrales, rastrojos, ramas pequeñas, caña de azúcar y café. Troquelados en una sola pieza en acero hasta el final de la cacha para generar golpes firmes sin vibración. Tratado térmicamente para dar durabilidad al afilado y lámina flexible que brinda resistencia a la hoja.

US0: cortar, rozar y desyerbar arboles, potreros, arbustos y cultivos.


DIMENSIONES:

Ancho (mm)	25
Largo (mm)	700
Alto (mm)	58.99

MATERIAL: Acero Inoxidable

RECOMENDACIONES: Cortarás las maleza o las ramas sin que se deforme. Hoja de acero de alto carbono y cromo. Tratada térmicamente. No se desgasta y aguantará mucho tiempo. Hoja laminada y preafilada con perfil cónico para un mejor corte. Este machete lleva un mango de madera barnizado, ligero y de tacto muy suave.

FICHA TÉCNICA CUCHILLA PARA GUADAÑADORA



DESCRIPCIÓN:

- Sin preocupación al desgaste y deformación por su fabricación en una sola pieza.
- Bisel preafilado, no se parte, peso adecuado que facilita el trabajo.
- Fabricadas en acero de alta calidad.

- **DIMENSIONES** (LARGO, ANCHO Y ALTO): 350 x 88 x 0 mm
- **PESO:** 0 g
- **USOS:**
  - Ideal para montar en máquina guadañadora para corte de matorrales, rastrojo, ramas pequeñas.
  - Para corte de matorrales, rastrojos y ramas pequeñas.
  - Hoja balanceada y afilada. > Máxima resistencia al impacto y al mellado.
  - Para afilar o reparar las mellas, usar limas bellota.
  - Evitar usar esmeril, afecta la dureza de la cuchilla.

FICHA TECNICA CANDADO DE ALTA SEGUIRDAD



DESCRIPCIÓN GENERAL: Candado con cerradura endurecida, argolla resistente a cortes, que protege contra ataques con sierras y herramientas de corte, bocallave que protege de ataques con taladro y contra ataques de ganzúas. Candado rectangular tipo anticizalla con cuerpo y cilindro en latón, barra en acero reforzado y tres llaves en latón. Para proteger y dar seguridad a todo tipo de objetos y propiedades.

CARACTERISTICAS:

- Cuerpo y cilindro en latón macizo
- Tres (3) llaves en latón
- Aro en acero templado
- Alta resistencia en ambientes agresivos
- Cuerpo de hierro en una sola pieza, con acabado pulido
- Cilindro de latón sólido, diseño especial de disco o plaqueta, con miles de combinaciones a prueba de ganzúa
- Gancho anti-robo con un recubrimiento especial que permite resistir actos vandálicos (golpes, cortes de segueta, corta pernos y perforaciones)
- Seguro tipo doble balín de acero resistente al forcejeo con palanca y martillo
- Nivel de máxima seguridad
- Llave Anti-ganzúa
- Mecanismo interno resistente a la corrosión
- Grillete con coraza para mayor seguridad
- Seguro preventivo que impide retirar la llave para evitar dejar el candado abierto

FICHA TECNICA PINZA PARA ALAMBRE



ESPECIFICACIONES

Largo total	11" (279,4 mm)
Longitud de mordaza	25 mm
Dureza de mordazas	55 - 65 HRc
Peso	685 g
Empaque	Tarjeta

CARACTERÍSTICAS

- Cabeza fabricada en acero al cromo vanadio 2 veces más resistentes al desgaste que las de acero al carbono.
- Acabado niquelado gris, 3 veces más resistente a la corrosión.
- Punta con cabeza estriada para martillar.
- Mordazas en la parte inferior para estirar o torcer alambre.
- Tenaza con mordazas y uña removedora de grapas.
- Con huecos en los costados para corte de alambre.
- Mango de vinil de alto desempeño, en color negro con naranja, con cubierta antiderrapante.

USOS

• Especial para colocar alambre de púas.
• Para cortar, estirar o torcer alambre.

FICHA TECNICA PUNTILLA ACERADA DE 3 PULGADAS



DESCRIPCIÓN:
Elemento de fijación de acero fabricado con altos estándares de calidad y materias primas que garantizan un óptimo desempeño de resistencia y fijación para aplicaciones sobre madera, en sectores como la construcción, la ebanistería, zapatería, etc. Fabricadas con acero de bajo carbono. Cabeza estriada. Punta de diamante con y sin cabeza, clavo vareta y clavo para techo de zinc.

VENTAJAS:

- No se dobla ni se parte (mayor dureza y resistencia).
- Menor ángulo de punta que facilita el uso del producto (más puntiaguda).
- Excelente capacidad de fijación. Acabados perfectos que garantizan un buen desempeño y mínimo desperdicio.
- Disponible en diversos tipos y tamaños para gran variedad de usos.

USOS:

- Construcción.
- Carpinterías / Ebanisterías.
- Zapaterías.
- Fabricación de estibas, guacales, bolsas, canoas y establos.
- Fijación de todo tipo de estructuras y postes de madera.
- Industrial.

ESPECIFICACIONES:

Referencia (pulgadas)	Longitud de la puntilla nominal (mm)	Diámetro de la cabeza (mm)	Diámetro del vástago (mm)	Resistencia (kgf/mm^2)	Longitud mínima de la punta (mm)
3"	76	7,5	3,86	75-90	3,4

FICHA TÉCNICA FLOTADOR PARA TANQUE O BEBEDERO DE BOVINOS



DESCRIPCIÓN: Se puede instalar en cualquier tanque para controlar su nivel. Tiene platinas para fijarse en el borde de canecas, bebederos de ganado, tanques, etc. Con válvulas de acople rápido se pueden automatizar en el campo las entradas de agua a bebederos y tener acceso a disponer de agua en sitios muy lejanos. Presión máxima sin escape 50 P.S.I. la cual equivale a 35 metros de altura de presión. Garantizamos una Presión de Trabajo de 40 P.S.I. La apertura es instantánea cuando el nivel baja 2mm aproximadamente, con lo que garantiza un llenado casi permanente así estén 5 o más animales bebiendo al mismo tiempo.

Válvula flotadora para control del agua en los bebederos. Inserto de pvc, para manguera de media. Tiempo de sellado: 1 minuto, 30 segundos, De 6 a 7 litros.

FICHA TECNICA ACEITE 2 TIEMPOS



Descripción de producto

Mobil Super Moto 2T es un aceite de alto rendimiento utilizado en la lubricación de motocicletas y otros equipos que utilizan motores de dos tiempos a gasolina con sistema automático de lubricación o de mezcla del aceite con el combustible. Mobil Super Moto 2T está pre-diluido para asegurar una rápida mezcla con el combustible. Utilice la proporción de mezcla recomendada por el fabricante. Atienda siempre las recomendaciones del manual del usuario.

Propiedades y Beneficios

Mobil Super Moto 2T combina aceites minerales de alta calidad con un robusto sistema de aditivos que proporciona una buena limpieza y desempeño superior al motor. Sus principales propiedades y beneficios incluyen:

- Buena protección al desgaste
- Ayuda a prolongar la vida del motor
- Estabilidad térmica y a la oxidación y control de los depósitos
- Ayuda a mantener el motor más limpio, evitando la carbonación excesiva de bujías y válvulas, reduciendo el atascamiento de pistones y anillos, a la vez que asegura protección contra los problemas debidos a la pre-ignición.
- Buena protección a la corrosión Ayuda a prolongar la vida del motor en ambientes con alta humedad y/o en paradas de equipo prolongadas.
- Reducción de la pre-ignición Incrementa la eficiencia de la combustión alargando la vida de los pistones.

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Super Moto 2T cumple o excede las siguientes especificaciones:

API	TC
ISO	L - EGB
JASO	FB

SAE GRADO 1

Características típicas

Mobil Super Moto 2T	
Viscosidad, ASTM D 445	
cSt @ 40º C	59.2
cSt @ 100º C	8.5
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	115
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	0.09
Punto de fluidez, ºC, ASTM D 97	-9
Punto de inflamación, ºC, ASTM D 93	88.5
Densidad @15º C kg/l, ASTM D 4052	0.877

FICHA TECNICA CAPA DE CAUCHO



DESCRIPCIÓN Poncho termosellado impermeable. Protege al usuario del contacto del agua como la lluvia y otras actividades que demanden el uso de prendas impermeables con mayor libertad de movimiento.

APLICACIONES Protege a los usuarios en actividades que demanden resistencia al agua y salpicadura de químicos en bajas concentraciones.

MATERIALES Tela Flexible de PVC. M

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Poseen una capa exterior de tela flexible de PVC, la cual es resistente y hace que estas prendas sean flexibles y confortables. Cuenta con capucha con cordón de ajuste para la protección de área de la cabeza. Broches plásticos en los lados laterales y cremallera en el cuello para mayor comodidad. Costuras con sistema de termosellado, impiden filtraciones, cristalizaciones y rayaduras en las uniones. Espesor 0.28 mm ± 5%. Dimensiones: 125 cm x 100 cm.

ADVERTENCIA: El punzonado con espinas o puntillas propicia el rasgado de la prenda. Lacas, tintas, limpiadores fuertes, abrasivos como polvos, esponjas de alambre, cepillo de cerdas, detergentes y solventes como tíner, acetona, Mek, etc., pueden ser muy efectivos para retirar manchas, pero causan daño inmediato y deterioran el material.

FICHA TECNICA GUANTES ENCAUCHETADOS



DESCRIPCIÓN: Guantes que incorporan avances de ingeniería hilados tejidos de punto, junto con la tecnología de inversión. Estas tecnologías permiten producir guantes livianos, de montaje flexible que proporcionan mayor cubrimiento, agarre y protección en las manos.

CARACTERISTICAS: Fibra de poliéster de alto desempeño.
Recubrimiento de nitrilo ideal para trabajos en contacto con aceites.
Puño elastizado reforzado, con mayor recubrimiento en el dorso de la mano.
Poliéster ideal para la transpiración de la piel.
Composición: 40% poliéster - 60% nitrilo.

APLICACIONES:3

Metalmecánica
Automotriz
Aserraderos
Construcción

Industria en general

FICHA TECNICA: FAJA SEGURIDAD LUMBAR



DESCRIPCION: Faja de tejido elástico con bandas antideslizantes en su interior Tiradores elásticos regulables con 40mm de ancho Higiénica, segura y lavable Elásticos ventilados para mayor confort y vida útil Ballenas (6), en parte posterior, cubiertas con cinta antideslizante para evitar su desplazamiento Gran superficie de ajuste en el cuerpo principal Promueve la buena postura e inhibe el estrés en regiones lumbares Concentra el calor para suavizar lesiones existentes y actúa como guía para adoptar posiciones apropiadas durante la actividad física

TALLAS: S - M - L – XL – XXL – XXXL

USOS: Seguridad industrial Construcción Transporte de mercaderías Deportes Conducción de vehículos Oficina Traslado de elementos pesados Zonas frías, cámaras frigoríficas debido a su cuerpo cerrado.

Características de desempeño: ¬ Es un material más flexible y de mayor durabilidad. ¬ Le brinda un mayor confort debido al ancho. Una faja más delgada genera molestias y dolor en los puntos de flexión del cuerpo y una más ancha intensifica la transpiración.

FICHA TECNICA GUANTES DESECHABLES



Beneficios y Cualidades:

- Ambidiestro
- Sin Polvo
- No estéril
- Desechable
- 100% nitrilo
- Su textura en los dedos brinda excelente sensibilidad táctil y agarre.
- Excelente confort y ajuste del producto a la mano.
- Tres veces mas resistentes que el caucho natural o vinilo, garantizando que los guantes no se cortan con facilidad.
- Fabricados con una capa de 4 milésimas de pulgada.
- No presentan riesgo de contaminación de polvo.

Uso:

- El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Este producto no está diseñado para el uso con productos químicos fuertes que requieran guantes de uso pesado. Algunas de las aplicaciones más comunes son:

  - Manufactura en general
  - Inspección y seguridad
  - Manipulación de alimentos
  - Manufactura y manipulación de alta precisión y componentes electrónicos
  - Limpieza y mantenimiento
  - Cosmetología, estética y belleza
  - Laboratorios y farmacias

Desempeño:

Antes de Usar	Resistencia a la tensión	16 MPa
	Elongación	500 %
Con Uso	Resistencia a la tensión	14 MPa
	Elongación	500 %

Talla	Ancho	Largo	Empaque
S	85 mm	240 mm	Caja x 100 unidades
M	95 mm	240 mm	Caja x 100 unidades
L	106 mm	240 mm	Caja x 100 unidades

Recomendaciones:

- Reemplace el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado.
- En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico.
- Mantener alejado de fuego, chispas y otras fuentes de ignición.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

FICHA TECNICA ALAMBRE CERCA ELÉCTRICA CALIBRE 14 MOTTO



ALAMBRE CERCA ELÉCTRICA R- 1070 CALIBRE 14 MOTTO (1000M) MARCA ELECTRA

Alambre especial para cerca eléctrica de alta tensión y durabilidad en condiciones extremas, Resistente a la corrosión, Calibre 14 con un rendimiento de 35 metros por Kg, Presentación de 25kg.

FICHA TECNICA IMPULSOR CERCA ELÉCTRICA BRAHMA 135 HECTÁREAS 100 KM 110V



Descripción:

- Voltaje de Entra (v): 110 Vac
- Energía (Joules): 4.5

- Alcance (Km): 100
- Cobertura (Ha): 135
- Pulsos por minuto: 55 – 60

FICHA TECNICA AISLADOR PRINCIPIO FIN



Descripción: El aislador se utiliza al inicio y al final de cada tramo de la cerca eléctrica garantizando el aislamiento de corriente.

FICHA TECNICA AISLADOR PRINCIPIO FIN PERA



- Aislador para cerca Eléctrica inicio fin; ideal para instalarlos en postes de madera o metálicos, para las esquinas, los inicios y los finales del cercado electrificado.
  El paquete contiene 50 piezas de aislador.
  Fabricado con polipropileno de alta calidad, con filtro UV.
  Especificaciones técnicas:
  Material: polipropileno, resistencia a los rayos UV
  Tensión nominal: 18.000 Voltios
  Resistencia a la tracción
  Límite elástico: 36 (MN/m²)
  Carga de rotura: 36 (MN/m²)
  Medidas una pieza: 6.9x3.5x2.5 centímetros, Peso: 31.1 gramos
  Medidas 50 piezas: 30x27x19.5 centímetros, Peso: 1.55 kilos

FICHA TECNICA AISLADOR PIVOTE PLANO



Descripción: Aislador de paso para postes intermedios con facilidad de instalación para aislar las líneas positivas del estacón. Utilizar con clavo de 3 pulgadas; no es recomendado para cercas vivas (árboles), ni cambios de nivel brusco.



Aislador Para Cerca Eléctrica Poste Varilla X 25 Pcs Lhaura



Aislador Para Cerca Eléctrica Poste Varilla X 25 pcs Lhaura
Fabricado con polímero de etileno de alta resistencia al impacto, con aditivo estabilizador UV que los hace muy resistente a la radiación solar ultra violeta, evitando el 100 por ciento de las pérdidas de corriente a tierra, pues la resistencia UV evita la degradación del polímero, haciéndolo un material totalmente aislante.
Para cercado fijo o móvil, se puede instalar en postes o varillas de un diámetro no mayor a 13 milímetros.

1. Modelo: APVL
2. Cantidad de Aisladores: 25 Unidades.
3. Color del producto: Naranja.
4. Diámetro del agujero donde se ubica la varilla: 13 milímetros.
5. Estos aisladores sirven hasta para una varilla de media pulgada
6. Material: Polímero de etileno de alta resistencia, resistencia a los rayos UV.
7. Tensión nominal: 18.000 voltios.
8. Resistencia a la tracción: Límite elástico: 36 (MN/m²) - Carga de rotura: 36 (MN/m²)
9. Medidas una pieza: 6.5x5.5x4.2 centímetros Peso: 22.5 gramos.
10. Medidas de todo el paquete: 35x19x9centímetros Peso: 570 gramos.
11. Garantía por defectos de fábrica: 6 meses.

FICHA TECNICA MANGUERA AISLADORA PARA CERCA ELÉCTRICA 8MM X 50 METROS



Manguera aislada Nl 8X50 metros
ideal para instalación del cercado
Utilizado como aislador de paso, cable de alta conductividad. Es especial para cercado electrificado con calidad profesional, fabricado con materia prima de calidad filtro UV.
Características técnicas
Diámetro interior 5 mm
Grosor de pared 3 mm
Diámetro total 8 mm
Resistencia mín./máx. a la temperatura -40 hasta 90 °C
Material Polipropileno con proteción UV
Resistencia mín. a la temperatura -40 °C
Resistencia máx. a la temperatura 90 °C
Medidas una pieza: 33.5x33.5x9.5 centímetros Peso: 1.70 kilos
Contenido del paquete:
1 pcs de manguera aisladora de 50 metros

FICHA TECNICA MANIGUETA PARA PARA CERCA ELÉCTRICA



Descripción: Utilizado para abrir y cerrar portillos, aísla y al mismo tiempo conduce electricidad. También sirve en cercos móviles. Cuerpo resistente, tiene doble elongación. Tiene protección UV.