Cuáles son los datos y análisis de los programas de monitoreo de biodiversidad de los años 2018 2019 para mamíferos, anfibios, reptiles y aves

Desde el grupo de monitoreo de la SDA, se reportan 41 especies de aves 14 de ellas migratorias y una en categoría de casi amenazada, y una en peligro, 1 anfibio y un mamífero.

Tabla 1. Avifauna migratoria y en categoría de amenaza en el PEDH Tibanica, durante los años 2018 al 2019

Especie	***Nombre común***
Gallinago nobilis	Becasina Paramuna*
Tringa solitaria	Andarríos Solitario
Tringa melanoleuca	Patiamarillo Grande
Riparia riparia	Golondrina Ribereña
Tyrannus tyrannus	Siriri Norteño
Spatula discors	Barraquete Aliazul
Vireo olivaceus	Verderón Ojirrojo
Petrochelidon pyrrhonota	Golondrina Alfarera
Tringa flavipes	Patiamarillo Chico
Contopus virens	Pibí Oriental
Setophaga fusca	Reinita Gorjinaranja
Leiothlypis peregrina	Reinita de Tennessee
Contopus sp.	Pibi
Empidonax traillii	Atrapamoscas Saucero
Piranga olivacea	Piranga Alinegra
Rallus semiplumbeus	Tingua bogotana**

(*) Especie en categoría de Casi amenazada. (**) Especie en categoría de peligro.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

			
Nombre científico	*Sturnella magna* (Chirlobirlo)	**Nombre científico**	*Chrysomus icterocephalus* (Monjita bogotana)
Fecha	05 de febrero	**Fecha**	05 de febrero
			
Nombre científico	*Tringa solitaria* (Andarríos solitario)	**Nombre científico**	*Spatula discors* (Pato canadiense)
Fecha	05 de febrero	**Fecha**	05 de febrero

Cuál es el plan de manejo y avance de acciones en los años 2017, 2018 y 2019 en el Humedal Tibanica para el control de especies de aves parasita y/o invasoras, entre otras, que representan riesgo para otras especies propias de los humedales, (ejemplo. Chamón común *Molothrus bonariensis*)

Se ha realizado el monitoreo durante los años 2017 a 2020 en general, registramos muy pocas interacciones de los chamones con individuos de otras especies. Para corroborar que exista alguna interacción, se debe seguir monitoreando el primer semestre del año, ya que esto coincide con la época de reproducción reportada para los chamones entre mediados de febrero y julio (Hilty & Brown 1986) ni con la de su hospedero principal, C. icterocephalus, entre abril y julio (Naranjo 1995).

Villaneda y Rosselli en el 2011 concluyen que existe estabilidad en las poblaciones de aves hospederas (A.B.O. datos no publ.), esto puede hacer pensar que el Chamón Parásito (aún) no representa una amenaza significativa para la supervivencia de la mayoría de especies típicas de estos hábitats que han sufrido su parasitismo. Esto en la actualidad según los datos de obtenidos del monitoreo se mantiene debido a que las poblaciones de *Molothrus bonariensis* aumentaron de 2017 a 2018 de 17 individuos a 54 y desde ahí se mantiene estable para el Humedal Tibanica

Individuos de *Molothrus bonariensis* Grupo de monitoreo SDA	Año
17	2017
54	2018
59	2019