



EVIDENCIAS CURSO PRIMEROS AUXILIOS

Sesiones virtuales






Buscar (Cmd+Opt+E)
15:03
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
RN
CR
BG
SR
RO
MC
EO
CL
LH
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
En esta reunión (21)
Viviana Andrea Parra Palomino
Organizador
Angie Vanessa Pinz... (Externo)
Brayan Xavier Espi... (Externo)
Brenda Zuleima Sal... (Externo)
cesar leon (No comprobado)
CHRISTIAN ALIRIO SILVA RIV...
David Nicolas Pere... (Externo)


FRACTURA ABIERTA
Se caracteriza por que lesionan los tejidos blandos, el mayor riesgo que se puede presentar es la hemorragia.
Al desplazarse el hueso, se pueden afectar los vasos sanguíneos produciendo sangrado, el cual debe de ser controlado para evitar una descompensación mayor del paciente.
Las fracturas pueden ser:
• Fractura de tallo verde: Es una fractura incompleta, el hueso no se rompe completamente. Esta fractura se da en niños.
•Fractura transversal
Es una fractura en un ángulo recto res- pecto al eje del hueso.
•Fractura oblicua
Es una fractura en la que la ruptura forma un ángulo respecto al eje de la médula.
•Fractura conminuta
Es una fractura en la que el hueso se rompe en varios pedazos.
Gráfica 2
Fuente: (Rememes, 2016)

Sesiones Presenciales



