Ophalac	DIRECCION TECNICA ESPECIFICACIONES TECNICA DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION	
	DIFENHIDRAMINA HCl 50 mg CAPSULAS	**2021**

FORMA FARMACEUTICA	: ***Cápsulas***		***VIA DE ADMINISTRACION:***	**Oral**
PRINCIPIO ACTIVO	: ***DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO***		***REGISTRO SANITARIO:***	**INVIMA 2023M-0001535-R2**
CONCENTRACIÓN	: ***50***	***mg/cáp***	***F.VIGENCIA REG:***	**Vigente**
CONDICION DE VENTA	: RX	**Con formula médica**	***TIEMPO DE VIDA UTIL:***	**2** Años
CODIGO ATC	: R06AA02		***TITULAR***	**OPHALAC S.A.**

PRESENTACIONES COMERCIALES	CODIGOS DE BARRAS	CUM	IUM
DIFENHIDRAMINA HCL CAP 50 mg X 250 CAP	7707035580950	19929219-4	
DIFENHIDRAMINA HCL CAP 50 mg X 50 CAP	7707035580943	19929219-2	

PRODUCTO



DIMENSIONES Y PESOS	PRESENTACIONES		
PRODUCTO TERMINADO	**DIFENHIDRAMINA HCL CAP 50 mg X 250 CAP**	**DIFENHIDRAMINA HCL CAP 50 mg X 50 CAP**	
ALTURA (cm)	**18,7**	**8,4**	
FRENTE (cm)	**0**	**0**	
FONDO (cm)	**180,1**	**38,8**	
VOLUMEN (cm3)	**8,4**	**4,2**	
PESO (g)	**180**	**38,8**	
EMBALAJES			
ALTURA (cm)	**18,7**	**17,2**	
FRENTE (cm)	**57,3**	**54,2**	
FONDO (cm)	**41**	**38,2**	
VOLUMEN (m3)	**0,439**	**0,356**	
PESO (Kg)	**6,86**	**5,52**	
No de UNIDADES	**36**	**128**	
APILE MAXIMO			

Ophalac	**DIRECCION TECNICA** **ESPECIFICACIONES TECNICA DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION**	
	DIFENHIDRAMINA HCl 50 mg CAPSULAS	**2021**

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Bodegas/Almacenes

El producto debe ser almacenado a temperaturas inferiores a los 30° C y humedad relativa inferior al 75% . Almacenar siempre sobre estiba, no exceder la altura de estibado recomendada. La estantería debe estar separada mínimo 50 cm de la pared y alejada del techo. Se debe llevar un registro diario de humedad y temperatura de las bodegas de almacenamiento. Almacenar siempre garantizando que los estuches con producto queden depositados sobre la base, especialmente para las formas farmacéuticas líquidas.

Estantería punto de venta

Los productos farmacéuticos deben ser ubicados en estanterías alejadas de la luz directa del sol y a temperaturas inferiores a los 30° C y humedad relativa inferior al 75%. Almacenar siempre garantizando que los estuches con producto queden depositados sobre la base, especialmente para las formas farmacéuticas líquidas.

DISTRIBUCION

La distribución desde las bodegas y almacenes y/o surtido de la estantería de los locales de venta, deben hacerse considerando las normas ***PEPS: Primero en expirar, primero en salir.*** Cuando en un embalaje queden espacios libres, se deberá colocar material de relleno, que evite los daños en el transporte. Identificar los embalajes que contienen material de vidrio, con rotulo de frágil

CARGUE Y TRANSPORTE

Emplear servicios de transporte que cumpla con las normas de seguridad e higiene para el transporte de medicamentos. No lanzar los embalajes y/o productos, para evitar las caídas y rompimientos. Respetar las cantidades recomendadas para estibado, con el fin de conservar los embalajes y estuches. No exceder el peso recomendado por tamaño de corrugado. Respetar las normas y procedimientos establecidas para el transporte de medicamentos.

RIESGOS EN LA MANIPULACION DEL PRODUCTO

Los productos farmacéuticos envasados y conservados en el empaque original, no ofrecen ningún riesgo para su manipulación; se recomienda emplear la dotación de seguridad establecida por la ARL, para el tipo de área y labor desempeñada con el producto.

MANEJO DE RUPTURAS Y DERRAMES

La ruptura del sistema de cierre y/o envase primario, imposibilita el uso del producto, por lo tanto se debe retirar la unidad afectada, del área de almacenamiento o superficie y depositarla en el área de almacenamiento de residuos para su disposición final.

Cuando se presente derrame total o parcial del contenido del producto, se deben aplicar todas las medidas de seguridad establecidas: uso de protección personal: bata, gorro, tapabocas, gafas y guantes, además del uso de paletas de recolección, material absorbente, bolsas para recolección, rótulos de identificación y canecas para recolección de desechos. En caso de contacto directo con: piel, ojos: lavar con abundante agua y jabón

Las áreas expuestas a derrames luego de recoger el producto vertido con material absorbente, deben ser lavadas con abundante agua y jabón. Drenar el exceso de agua y secar para evitar accidentes.

INTOXICACION

En caso de intoxicación accidental, por favor llevar a la persona a un centro atención medica, informar al médico el nombre del producto, el nombre genérico, la concentración y la cantidad estimada ingerida

El producto envasado y empacado ofrece una baja probabilidad de causar alergias a las personas sensibles, pero en el caso de presentarse se recomienda lavar las manos o áreas expuestas con abundante agua y jabón. Si las manifestaciones de alergia no desaparecen consultar con el médico

NOTIFICACION DE AVERIAS

Toda notificación de avería detectada en la recepción de productos, deberá ser notificada por escrito dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del pedido.