BUDEK PLUS® 200/6mcg

TIPO DE PRODUCTO	MEDICAMENTO
PRINCIPIO ACTIVO	BUDESONIDA 0,20mg FORMOTEROL FUMARATO 0,00600mg
FORMA FARMACEUTICA	POLVO PARA INHALACIÓN (EN CÁSPULA DURA)
VIA DE ADMINISTRACIÓN	INHALACIÓN
PRESENTACION COMERCIAL	CAJA DE CARTÓN CON UN 1 FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CONTIENE 60 CÁPSULAS CON AGENTE DESECANTE + UN DISPOSITIVO INHALADOR.
CÓDIGO DE BARRAS (EAN 13)	8 436043 011765



INFORMACIÓN SANITARIA

REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2021M-0016993-R1	**TIPO DE REGISTRO**	IMPORTAR Y VENDER
VIGENCIA DEL REGISTRO	03/12/2026	**VIDA ÚTIL**	24 MESES
TITULAR DEL REGISTRO	EXELTIS S.A.S.	**NOMBRE DEL FABRICANTE**	LABORATORIOS LICONSA S.A
CÓDIGO CUM	020080149-03	**CÓDIGO ATC**	R03AK07

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES DE EMPAQUE PRODUCTO TERMINADO			**DIMENSIONES DE LA CAJA CORRUGADA DE EMBALAJE**		
ANCHO (mm)	**ALTO (mm)**	**LARGO (mm)**	**ANCHO (cm)**	**ALTO (cm)**	**LARGO (cm)**
50	85	60	30	35	30

NUMERO DE UNIDADES POR TENDIDO	**NUMERO DE UNIDADES EMBALADAS POR CAJA CORRUGADA**
9	60
PESO NETO DEL PRODUCTO (g)	**PESO BRUTO DEL PRODUCTO (g)**
25	53

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura menor de 30°C
MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE	Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

OTROS

PARTIDA ARANCELARIA	3004.32.19.00
INDICACIONES Y/O USOS	Asma: indicado para el tratamiento regular del asma, cuando es conveniente utilizar una combinación (un corticosteroide y un agonista b de acción prolongada inhalados) en: pacientes que no han logrado un control adecuado con corticosteroides inhalados y agonistas B2 de acción

	corta inhalados "según las necesidades" o pacientes que han logrado un control adecuado con corticosteroides y agonistas b2 de acción prolongada inhalados. enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): tratamiento sintomático de pacientes con EPOC severa (vefl < 50% del valor normal previsto) y antecedentes de exacerbaciones repetidas, que presentan síntomas significativos pese a un tratamiento regular con broncodilatadores de acción prolongada.
ADVERTENCIAS	Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la Budesonida, al Formoterol o a la lactosa inhalada. se recomienda reducir la dosis paulatinamente al suspender el tratamiento. el tratamiento no debe comenzarse durante una exacerbación. precauciones y advertencias: administrar con precaución a los pacientes con tirotoxicosis, feocromocitoma, diabetes mellitus, hipopotasemia no tratada y cardiomiopatía obstructiva hipertrófica, estenosis aortica subvalvular idiopática, hipertensión severa, aneurisma y otros trastornos cardiovasculares tales como: cardiopatía isquémica, arritmias o insuficiencia cardíaca severa. debe tenerse precaución al tratarse pacientes con una prolongación del intervalo qtc. el tratamiento concomitante con derivados xantínicos, esteroides y diuréticos puede potenciar el efecto hipopotasémico por lo que deben vigilarse las concentraciones séricas de potasio durante el tratamiento del asma severa aguda. debe evitarse el tratamiento concomitante con el ketoconazol u otros potentes inhibidores de la enzima cyp3a. aumento del riesgo de exacerbaciones severas y de muerte relacionada con consumo como monoterapia en el tratamiento del asma. el uso de un laba solo, sin el uso de un medicamento para el control del asma a largo plazo, tal como un corticosteroide inhalado, está contraindicado en el tratamiento del asma. el uso sistémico y tópico de corticosteroides puede producir alteraciones visuales. si un paciente presenta síntomas como visión borrosa u otras alteraciones visuales, debe consultar con un oftalmólogo, para evaluar la presencia de cataratas, o enfermedades raras como coriorretinopatía serosa central (CRSC).