ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

| CIUDAD | FECHA | VIGENCIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá D.C. | 2024-02-16 | DESDE : | 2011-08-18 | HASTA: | INDEFINIDO |

DE ACUERDO CON LOS DECRETOS Nº 2141/92, 1071/15, 4765/08 Y LA RESOLUCIÓN DEL ICA N° 1056 DE 1996

SE CONCEDE LICENCIA DE VENTA **8702-BV**

A: **CZ VACCINES S.A.U.**

PARA VENDER EN EL TERRITORIO NACIONAL EL PRODUCTO DENOMINADO

## CZV TUBERCULINA PPD BOVINA

**CON UNA COMPOSICIÓN GARANTIZADA DE:**

| | |
|---|---|
| Cada mL de solución inyectable estéril contiene:<br>Derivado proteico purificado (PPD) de cultivo de Mycobacterium bovis, cepa AN-5 25.000 U.I. | Excipientes: (Fenol, glicerina) c.s.p. 1 mL. |

| | |
|---|---|
| Periodo de validez : | 24 meses. |
| Laboratorio Productor : | CZ VACCINES S.A.U. |
| País de origen : | España. |
| Especie(s) : | Bovinos. |
| Importador : | LABORATORIO MÉDICO VETERINARIO LMV S.A.S. |

**INDICACIONES**

Para el diagnóstico de la tuberculosis bovina mediante la prueba de intrademotuberculinización sencilla que requiere una única inoculación de PPD bovina, o comparativa, que implica intradermotuberculinización simultánea de PPD aviar y PPD bovina en dosis únicas.

**PRECAUCIONES**

Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Aplicación exclusiva por el Médico Veterinario. La prueba no debe repetirse hasta que hayan transcurrido al menos cuarenta y dos (42) días desde la última aplicación. El contenido residual no utilizado después de abierto el vial debe desecharse. Tiempo de retiro: cero (0) días. Conservar entre 2ºC y 8ºC. No congelar.

**EMPAQUES O ENVASES**

Viales de vidrio tipo I por 5 mL (50 dosis). Caja que contiene 10 viales de vidrio tipo I por 5 mL.

Viviana Sofía Zamora Pineda

DIRECTOR TÉCNICO DE INOCUIDAD DE INSUMOS VETERINARIOS

Preparó:ASP

Revisó: Aida Ivette Rojas Sabogal

FORMA 3-092 A V.3

P.F. e I.

FORMA 3-092A