ACTA N°

FECHA: Bogotá, Septiembre 12 de 2024.

HORA: 4:30pm

LUGAR: Jardín Infantil San Pablo Manitos Unidas

TEMA: Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia

ASISTENTES: talento humano

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Socialización sobre medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia, con el talento humano

DESARROLLO:
Siendo las 4:30 se da inicio a la socialización de medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia, con el talento humano, a cargo de la profesional Yeimmy torres, líder del componente, el cual tuvo como objetivo, dar a conocer las medidas para prevenir asfixia en los niños y las niñas de la unidad operativa san pablo manitos unidas.

Para tener en cuenta: es importante cuidar que los participantes utilicen juguetes acordes con su edad y que no introduzcan en su boca, oídos o nariz, juguetes u objetos pequeños (se recomienda que los objetos no tengan un tamaño menor al cartón del rollo de papel higiénico). También se deben mantener bolsas plásticas lejos de su alcance.

¿Cuáles son las asfixias mecánicas? Asfixia producida por un mecanismo que impide la ventilación pulmonar. Este mecanismo puede ser interno (por cuerpos extraños o por sumersión) o externo (ahorcamiento, estrangulación, aplastamiento, sofocación facial, sepultamiento).

¿Qué es la asfixia y cuáles son sus causas? La asfixia se presenta cuando alguien no puede respirar porque la garganta o la tráquea (vía aérea) están bloqueadas con alimento, un juguete u otros objetos. Las vías respiratorias de una persona que se está asfixiando pueden estar bloqueadas provocando que no llegue suficiente oxígeno a los pulmones.

Powered by CamScanner

¿Cómo actuar ante un caso de asfixia?

SI LA PERSONA SE DESAMAYA O PIERDE EL CONOCIMIENTO:

- Bájela al suelo.
- Llame al número local de emergencias o solicítele a alguien que lo haga.
- Comience a realizar RCP.
- Si observa algo que está obstruyendo las vías respiratorias y este objeto está suelto, trate de retirarlo.

Como prevenir: Mantener fuera de su alcance objetos pequeños como partes de juguetes, globos (no permitas que jueguen con globos desinflados en la boca) monedas, pelotas de látex, alfileres, pilas (sobre todo redondas) bolsas de plástico, llaveros, etc.

Medidas preventivas

- Aprenda las técnicas de reanimación cardiopulmonar (CPR,
- Tenga en cuenta que los globos son un riesgo de asfixia para los niños hasta de 8 años de edad.
- Evite dar los alimentos de la lista anterior a niños menores de 4 años de edad.
- Insista en que los niños coman en la mesa, o por lo menos sentados.
- Nunca deben correr, caminar, jugar o acostarse con comida en la boca.
- Corte los alimentos para bebés y niños pequeños en trozos no más
- grandes de media pulgada y enséñeles a masticar bien la comida.
- Supervise a los bebés y niños pequeños mientras comen.
- Esté pendiente de las acciones de los niños mayores. Muchos incidentes de asfixia ocurren cuando un hermano mayorcito le da a un niño pequeño alimentos, juguetes u objetos pequeños que son peligrosos.
- Evite los juguetes que tengan piezas pequeñas y mantenga los demás objetos caseros pequeños fuera del alcance de bebés y niños pequeños.
- Siga las recomendaciones, en cuanto a la edad, que aparecen en los empaques de juguetes.
- Las pautas de edad reflejan la seguridad de un juguete basada en cualquier posible riesgo de asfixia así como en las habilidades físicas y mentales a distintas edades.


Powered by CamScanner

- Revise debajo de los muebles y entre los cojines en busca de objetos pequeños que los niños puedan encontrar y llevarse a la boca.
- No permita que los bebés y niños pequeños jueguen con monedas.

DURANTE Practique hasta 5 compresiones rápidas hacia abajo, hundiendo el pecho hasta de un tercio a la mitad de su profundidad. Continúe con 5 golpes en la espalda seguidos de 5 compresiones pectorales hasta desalojar el objeto o hasta que el bebé pierda el conocimiento (quede inconsciente).


- Llamar al 123 para saber cómo actuar mientras llega una ayuda profesional.
- Trasladar al niño o la niña al hospital más cercano
- La pronta aplicación de primeros auxilios para la asfixia puede salvar la vida de una persona.


¿Qué hacer si un niño se asfixia? Practique hasta 5 compresiones rápidas hacia abajo, hundiendo el pecho hasta de un tercio a la mitad de su profundidad. Continúe con 5 golpes en la espalda seguidos de 5 compresiones pectorales hasta desalojar el objeto o hasta que el bebé pierda el conocimiento (quede inconsciente).



Powered by CamScanner

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







Powered by CamScanner

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Giovanna Marin	Responsable	JI San Pablo	
Ana Cristina	Prof API	JI San Pablo	
Yeimmy Torres	Prof API	JI San Pablo	
Lucia Cespedes	Auxiliar API	JI San Pablo	
Ana Yesuid Ruiz	Prof API	JI San Pablo	
Paula C R	Prof API	JI San Pablo	
Patricia Diaz	Prof. A.P.I.	JI San Pablo	
Jennifer Lopez	Apoyo Administrativo	JI San Pablo	
Miti Damaris Moreno	Aux Servicios G	JI San Pablo	
Sandra Roa	Aux Servicios G.	JI San Pablo	
Alexandra Samaca	Manip. Alimentos	JI San Pablo	
Nemesia Cotua	Manip-Alimentos	JI San pablo	

Anexos:

Elaboró: Yeimmy Torres

Powered by CamScanner