



ASEPTIDINA® 2%

SOLUCIÓN TÓPICA

1	NOMBRE DEL PRODUCTO:	ASEPTIDINA® SOLUCIÓN TÓPICA 2%
2	COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA	Cada 100mL de ASEPTIDINA® SOLUCIÓN TÓPICA al 2% contiene Gluconato de Clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70% v/v.
3	PROPIEDADES	ASEPTIDINA® SOLUCIÓN TÓPICA al 2% de uso externo, es una solución antiséptica con potente actividad bactericida cuyo efecto antimicrobiano es causado por rompimiento de la membrana de la célula microbiana y efecto residual prolongado contra un amplio espectro de micro-organismo como bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, hongos y virus. No se inactiva en presencia de materia orgánica, no se absorbe por la piel, no produce irritación o sensibilización.
4	BENEFICIOS	La presetación de unidades evita el reenvase promoviendo un procedimiento seguro ya que disminuye el riesgo de infecciones por contaminación de producto.
5	ESTABILIDAD	Vida útil de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación, almacenados a temperatura no mayor a 30° C en su envase original. Las temperaturas elevadas y los contaminantes pueden acelerar la descomposición. El producto es sensible a la luz. Almacene en lugares frescos y secos.
6	INDICACIÓN	Antiséptico tópico indicado para el cuidado del sitio de inserción de catéter (cuidado de catéter), antisepsia de piel en muñón umbilical, preparación preoperatoria de la piel, antisepsia del sitio de inserción del catéter, en antisepsia de piel durante procedimientos de venopunción.
7	INSTRUCCIONES DE USO	Aplicar directamente sobre la piel impregnando una gasa o compresa estéril; previo lavado con ASEPTIDINA® JABON QUIRÚRGICO.
8	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	Hipersensibilidad a alguno de los componentes, puede causar una reacción alérgica grave. Los síntomas pueden incluir sibilancias/ dificultad para respirar, shock, hinchazón facial, urticaria o sarpullido. Evitar el contacto con los ojos, boca. No debe usarse en tejidos como meninges, cerebro u oído medio. Uso externo únicamente, no debe usarse en mucosas. Puede producir manchas oscuras en contacto con textiles. No mezclar con otros productos. No debe utilizarse en forma conjunta con otros antisépticos como los yodados puesto que son incompatibles y se neutraliza su efecto. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. El producto debe dejarse secar completamente en la piel antes de iniciar cualquier procedimiento invasivo con el fin de evitar eventos adversos o incompatibilidad con otros elementos.
9	CONTRAINDICACIONES	No debe diluirse con agua, solventes o mezclarse con otros jabones. Puede producir manchas oscuras (cafés) en contacto con superficies duras (cerámica, pisos, lavamanos etc), en textiles y la combinación de sustancias químicas como el hipoclorito de sodio por lo cual se recomienda limpiar el derrame primero con un paño humedo libre de productos y posteriormente realizar los procesos de limpieza y desinfección habituales
10	DATOS DE SEGURIDAD	Los medios de extinción en caso de incendio que se pueden utilizar son: Agua, Dioxido de carbono, sustancia química seca, capa de espuma. En caso de derrames grandes absorba el material con tierra, arcilla o materiales absorbentes comerciales.
11	REGISTRO INVIMA	INVIMA 2020M-0013206-R1
12	CONDICIÓN DE VENTA	VENTA LIBRE

V04

ME-FT-60



REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
17011500	Frasco x 60 mL - Spray	Caja X 30 Frascos
17011600	Frasco x 120 mL - Spray	Caja X 20 Frascos
17012000	Frasco x 60 mL - Tapa de Seguridad	Caja X 36 Frascos
17011600-01	Frasco x 120 mL - Tapa de Seguridad	Caja X 25 Frascos

Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7, 8, 9 Y 18.

Parque Empresarial Normandía

E-mail: servicioalcliente@proasepsis.com

Bogotá D.C., Colombia

www.proasepsis.com.co