BOVISAN TOTAL Se

Vacuna inactivada para la prevención de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, Diarrea Viral Bovina, Leptospirosis y Campilobacteriosis de los bovinos.

Suspensión inyectable Subcutánea

COMPOSICION:

Cada dosis de 5 ml contiene:

ANTIGENO	CANTIDAD/TITULACIÓN POR DOSIS
Leptospira Canicola	$\geq 10^7$
Leptospira Grippotyphosa	$\geq 10^7$
Leptospira hardjo cepa hardjo prajitno	$\geq 10^7$
Leptospira hardjo cepa hardjo bovis	$\geq 10^7$
Leptospira Icterohemorragiae	$\geq 10^7$
Leptospira Pomona	$\geq 10^7$
Leptospira Tarassovi	$\geq 10^7$
Leptospira Wolfi	$\geq 10^7$
Campylobacter fetus- fetus	40 mg
Campylobacter fetus - venerealis-intermedius	40 mg
Virus herpes bovino tipo 1 *BHV-1*	$\geq 10^7 DICT_{50}$
Virus herpes bovino tipo 5 *BHV-5*	$\geq 10^7 DICT_{50}$
Virus diarrea viral bovina tipo 1 *BVDV-1*	$\geq 10^6 DICT_{50}$
Virus diarrea viral bovina tipo 2 *BVDV-2*	$\geq 10^6 DICT_{50}$
Excipientes c.s.p.	

PROPIEDADES:

Los agentes virales IBR y BVD de alta prevalencia en los hatos bovinos así como las Leptospirosis y las enfermedades de transmisión sexual Vibriosis o Campilobacteriosis hacen parte de las limitantes productivas que impactan directamente en la economía tanto de los sistemas de cría extensivos, como en las lecherías de alta tecnología.

BOVISAN TOTAL Se; es un Biológico inactivado mixto polivalente que protege contra los virus de IBR (rinotraqueitis infecciosa bovina) BVD (diarrea viral bovina), leptospirosis (8 serovares) y Campilobacteriosis (3 serovares). Su formulación antigénica única y doblemente adyuvantada garantizan una inmunidad activa y duradera contra 15 antígenos.

INDICACIONES:

Para prevenir las infecciones ocasionadas por Virus herpes bovino BHV-1, Virus herpes bovino BHV-5, Virus diarrea viral bovina BVDV-1, Virus diarrea viral bovina BVDV-2, *Leptospira Canicola, Leptospira Grippotyphosa, Leptospira hardjoparajitno, Leptospira Icterohemorragiae, Leptospira Pomona, Leptospira Tarassovi, Leptospira Wolfi, Leptospira hardjobovis, Campylobacter fetus- fetus, Campylobacter fetus-venerealis, Campylobacter fetus - venerealis-intermedius*.

DOSIS:

Vía subcutánea. Agitar antes y durante el uso.
Bovinos: 5 ml por animal.
Primovacunación: a partir de los 3 meses de edad aplicar 2 dosis separadas 21 – 30 días.
Revacunación anual.

PRECAUCIONES:

- Usar material estéril para su administración y aplicar estrictas medidas de asepsia. Usar bajo supervisión del Médico Veterinario. Una vez abierto el frasco utilizar todo el contenido, de lo contrario desechar.
- La administración de inyectables en animales sensibles, puede provocar desde reacciones locales (un pequeño nódulo en el punto de aplicación, algunas veces con dolor, el cual desaparecerá en pocos días) hasta anafilácticas. Si es el caso, tratar con epinefrina, antihistamínicos y corticosteroides.
- No administrar en animales enfermos, estresados o parasitados.
- Vacunar solamente animales sanos.
- Conservar entre 2 – 8°C. No congelar ni exponer a la luz directa del sol.
- Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- Cualquier variación en el color del producto no afecta la estabilidad ni la eficacia del mismo.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PERIODO DE RETIRO:

- No tiene

PRESENTACION:

Frasco x 100 ml (20 dosis bovinas)

REGISTRO SANITARIO: 4A – 11948 – AGROCALIDAD

ELABORADO POR: VIRBAC URUGUAY
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA. LTDA.