FARROWSURE® GOLD B

Reg. B-1196-109. Uso veterinario.

Virus inactivado y bacterina

FÓRMULA

Cada dosis de 2 mL contiene:

Parvovirus Porcino (PPV) y bacterina conteniendo *E. rhusiopathiae* cepa CN3342, *L. bratislava* cepa JEZ, *L. canicola* cepa C-51, *L. grippotyphosa* cepa MAL 1540, *L. hardjo* cepa WHO, *L. icterohaemorrhagiae* cepa NADL (11403), *L. pomona* cepa T262.

DESCRIPCIÓN

Preparación líquida de Parvovirus Porcino originado en una línea celular porcina establecida, un cultivo clarificado y libre de suero de *E. rhusiopathiae* y cultivos de células completas de las 6 variedades serológicas de Leptospira (*Leptospira bratislava, L. canicola, L. grippotyphosa, L. hardjo, L icterohaemorrhagiae,* y *L. pomona*). Los antígenos están inactivados químicamente y se les han agregado dos adyuvantes, incluyendo el Amphigen® para intensificar la respuesta inmune. Se ha demostrado una duración de la inmunidad de 18 semanas después de la vacunación contra la erisipela.

INDICACIONES

Para la vacunación de cerdos reproductores sanos como una ayuda en la prevención de la falla reproductiva causada por el Parvovirus Porcino (PPV), la Erisipela causada por *Erysipelothrix rhusiopathiae* y la Leptospirosis causada por *Leptospira bratislava, L. canicola, L. grippotyphosa, L. hardjo, L. icterohaemorrhagiae* y *L. pomona.*



PRESENTACIÓN

Frasco con 20 mL, 10 dosis	Frasco con 100 mL, 50 dosis

USO

CERDAS GESTANTES | CERDAS DE REEMPLAZO | VERRACOS

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular

- **Dosis:** 2 mL por vía intramuscular. Agitar bien.
- **Primovacunación:** Los cerdos sanos deben recibir 2 dosis con un intervalo de 3 a 5 semanas, administrando la segunda dosis de 2 a 4 semanas antes del primer servicio.
- **Revacunación:** Se recomienda una dosis antes de cada servicio subsecuente. Los verracos se deben revacunar cada 6 meses.
- Se deben emplear buenas prácticas zootécnicas y de manejo de salud del hato.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- No vacunar 21 días antes del sacrificio.
- Usar todo el contenido del frasco una vez abierto.
- Contiene gentamicina y timerosal como conservadores.
- Usar jeringas y agujas estériles para administrar esta vacuna.
- Se puede presentar inflamación transitoria en el sitio de la inyección y/o inapetencia después de la vacunación. Al igual que con muchas vacunas se puede presentar anafilaxia después de su uso. Se recomienda la epinefrina como antídoto inicial y debe ir seguida de la terapia apropiada de sostén.
- Disponer de los envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.
- **Consulte al Médico Veterinario.**

FARROWSURE® GOLD B

Reg. B-1196-109. Uso veterinario.

Virus inactivado y bacterina

ALMACENAMIENTO

- Almacenar entre 2° y 7° C.
- No congelar este producto.
- La exposición prolongada a temperaturas superiores puede afectar adversamente la potencia.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Marca registrada propiedad de Zoetis. Registro propiedad de Zoetis México, S. de R.L. de C.V., Paseo de los Tamarindos No. 60 Planta Baja, Col. Bosques de Las Lomas, Alcaldía de Cuajimalpa, México, Ciudad de México, C.P. 05120.