META DEL PRODUCTO

Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

ACTIVIDAD

Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.

Becerril Cesar

TEMA N°14: **Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.**	
Práctica saludable:	La práctica saludable de esta actividad consistió en la **visita casa a casa** como una estrategia clave para generar conciencia sobre la **prevención del consumo excesivo de alcohol** y sus efectos en la salud mental. A través de este enfoque personalizado, pude entablar un **diálogo cercano y directo con las familias**, lo que facilitó la identificación de sus preocupaciones y la promoción de hábitos saludables. Se integraron dinámicas participativas como juegos para romper el hielo, con el fin de generar confianza y un ambiente de apertura, lo que permitió que los participantes compartieran sus experiencias de manera más natural. Además, se ofrecieron herramientas prácticas y educativas que cada familia pudo aplicar en su vida diaria, contribuyendo a la reducción de comportamientos de riesgo. Esta cercanía y enfoque individualizado resultó clave para motivar el **compromiso de las familias con prácticas de autocuidado** y mejora de la salud integral.
Grupo Objeto	Estuvo compuesto por **familias del barrio Villa Luz**, con un enfoque en padres, madres y cuidadores de todas las edades, quienes fueron visitados en sus hogares durante los días 19 y 20 de septiembre de 2024. Este grupo incluyó un total de **33 familias**, quienes participaron en la evaluación del consumo de alcohol mediante el **test AUDIT**, con el propósito de identificar posibles riesgos en su comportamiento de consumo y sensibilizarlos sobre las consecuencias del alcohol en la salud mental y emocional, así como en las dinámicas familiares.

Objetivo de la actividad	El objetivo principal de la estrategia de visitas casa a casa en el barrio Villa Luz, realizada los días 19 y 20 de septiembre de 2024, fue educar y sensibilizar a las familias sobre la prevención del consumo excesivo de alcohol y sus efectos en la salud mental. A través de la aplicación del test AUDIT, se buscó identificar posibles comportamientos de riesgo relacionados con el consumo de alcohol y fomentar en la comunidad un mayor conocimiento sobre la importancia de un consumo responsable, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo la capacidad de las familias para prevenir alteraciones mentales y emocionales asociadas.
Tiempo estimado	120 min
Descripción de la actividad	**Desarrollo de la Estrategia de Capacitación en Pautas de Crianza Positiva** Fecha: **19 Y 20 de septiembre de 2024** Hora de inicio: **8:00 a.m.** Lugar: **Micro territorio 1, Barrio villa luz** Ejecutores: **Psicóloga Andrea Vega y Auxiliar Gabriela Méndez** La actividad comenzó puntualmente a las 8:00 a.m., con un recorrido por el barrio Villa Luz. Este primer día estuvo dedicado a la visita a los hogares previamente identificados para educar a las familias sobre la prevención del consumo excesivo de alcohol y las posibles alteraciones mentales asociadas al abuso de esta sustancia. **Dinámica Inicial:** Antes de cada visita, me aseguré de crear un ambiente cómodo y cercano. Para ello, en cada casa, comencé con una dinámica rompehielos sencillo. La idea era generar confianza y distensión antes de abordar temas delicados como el consumo de alcohol. En este caso, la estrategia fue contar una anécdota breve sobre situaciones cotidianas, como por

ejemplo: "El otro día, me confundí de casa al saludar a alguien en la calle, ¡me quedé hablando con un vecino que no conocía!". Esto generaba risas y relajaba a los participantes, creando un ambiente más abierto para el diálogo.

Luego de este breve momento, introduje el propósito de la visita: sensibilizar sobre el consumo de alcohol. Utilicé el Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), que sirvió no solo para evaluar posibles niveles de riesgo en el consumo de alcohol, sino también para iniciar una conversación reflexiva con los miembros de la familia.

1. Primer Momento: Visitas Casa a Casa (19 de septiembre de 2024)

Iniciamos las visitas casa a casa en el barrio Villa Luz a las 8:00 a.m., con el objetivo de educar a las familias sobre la prevención del consumo excesivo de alcohol y las alteraciones mentales que podrían estar asociadas. Durante esta jornada, utilicé el Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) para evaluar el consumo de alcohol en los hogares, mientras establecía un diálogo cercano y educativo con los participantes.

El día se desarrolló con la visita a un total de 17 hogares entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m. A continuación, se detalla la distribución del tiempo y los hogares visitados:

- **8:00 a.m. - 10:30 a.m.:** Familias **Martínez**, **Redondo**, **Molina**, y **Mendoza**. Las primeras visitas fueron bien recibidas, con conversaciones sobre cómo el consumo responsable de alcohol es clave para la salud mental. En cada hogar, tras la aplicación del test AUDIT, no se evidenciaron alteraciones significativas.

- **10:30 a.m. - 12:30 p.m.:** Familias **Rodríguez**, **Ligardo, Castillejo, Pino**, **Mesa**, y **Bonilla, Blanco**. Aquí las conversaciones giraron en torno a cómo identificar comportamientos de riesgo en familiares y amigos. Las familias agradecieron el material educativo entregado y mostraron interés en las recomendaciones brindadas.
- **1:30 p.m. - 3:00 p.m.:** Familias **Grisales**, **Martínez**, **Morales**, y **Mora**. El regreso después del almuerzo fue dinámico, con el enfoque en explicar cómo el estrés y la ansiedad pueden aumentar el consumo de alcohol si no se maneja adecuadamente. Todos los participantes agradecieron la información y la aplicación del test AUDIT.
- **3:00 p.m. - 4:30 p.m.:** Familias **Sánchez**, **Pallares**, y **Villa**. En estas visitas finales del día, la conversación se centró en estrategias para mantener hábitos saludables en reuniones sociales. Ninguno de los evaluados presentó alteraciones en su consumo de alcohol.

2. **Segundo Momento: Continuación de las Visitas (20 de septiembre de 2024)**

Al día siguiente, también iniciamos la actividad a las 8:00 a.m., dando continuidad al recorrido por otras casas del barrio Villa Luz. El objetivo seguía siendo educar a las familias sobre los efectos del alcohol en la salud mental y promover el consumo moderado, usando el test AUDIT como herramienta central para la evaluación.

Dinámica Inicial: Cada vez que llegábamos a una nueva casa, repetía la dinámica rompehielos para crear un espacio relajado. Un ejemplo fue comentar: "Ayer un vecino me preguntó si trabajaba como repartidora por todas las casas

que estaba visitando", lo que generaba risas y permitía que los residentes se sintieran cómodos antes de entrar en el tema principal.

La distribución de tiempo fue la siguiente:

- **8:00 a.m. - 10:30 a.m.:** Familias **Flórez, Molina**, **Rula**, **Amaya**, y **Delgado**. En estas visitas, se utilizó una dinámica de rompehielos para generar un ambiente amigable. Los participantes se mostraron muy receptivos y, tras las evaluaciones, no se observaron riesgos significativos.
- **10:30 a.m. - 12:30 p.m.:** Familias **Medez**, **Isabella, Carrascal**, **Méndez**, y **Cardena**. Las conversaciones incluyeron el impacto del alcohol en la vida familiar y cómo fortalecer los vínculos sin recurrir al consumo en situaciones sociales. Los resultados del test fueron normales en todos los casos.
- **1:30 p.m. - 3:00 p.m.:** Familias **Mieles**, **Guerrón**, **Castro**, y **Redondo**. En la segunda parte de la jornada, las familias mostraron interés en cómo evitar la presión social para consumir alcohol. Nuevamente, las evaluaciones no arrojaron señales preocupantes.
- **3:00 p.m. - 4:30 p.m.:** Familias **Amaya** y **Molina**. Las últimas visitas del día se centraron en consolidar la idea de mantener un consumo moderado de alcohol y ser conscientes de los riesgos. Los participantes evaluados no presentaron alteraciones en sus hábitos de consumo.

3. Resultados Finales

Después de dos jornadas de visitas casa a casa en el barrio Villa Luz, en los dos días de intervención (19 y 20 de septiembre de 2024), se visitaron un total de **33**

	hogares en el barrio Villa Luz, trabajando desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Se aplicó el **test AUDIT** en cada uno de los hogares, y no se encontraron alteraciones significativas en el consumo de alcohol entre los participantes.Los diálogos abiertos y las dinámicas utilizadas permitieron a las familias reflexionar sobre sus comportamientos y aumentar la conciencia sobre la importancia de un consumo moderado. Las dinámicas rompehielos utilizadas permitieron crear un ambiente amigable y relajado en cada visita, facilitando la conversación sobre los **riesgos del alcoholismo** y cómo prevenir problemas de salud mental. Las familias se mostraron abiertas y agradecidas por la información compartida, comprometiéndose a mantener hábitos saludables. La estrategia casa a casa fue efectiva para crear conciencia en la comunidad sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol y la importancia del autocuidado, logrando resultados positivos en la educación y prevención. ya que no solo se logró crear una conexión cercana con las familias del barrio, sino también promover una cultura de prevención y autocuidado dentro de la comunidad.
Indicadores de logros.	**Indicadores de Logros de la Actividad de Visitas Casa a Casa en el Barrio Villa Luz (19 y 20 de septiembre de 2024)** 1. Logré visitar un total de **33 hogares** en el barrio Villa Luz, lo que me permitió llegar de manera directa a las familias de la comunidad. La amplia cobertura alcanzada me permitió sensibilizar y educar a **33 personas** sobre la prevención del consumo excesivo de alcohol y sus efectos en la salud mental. 2. Apliqué el **test AUDIT** en todos los hogares visitados, asegurando la detección temprana de comportamientos de riesgo relacionados con el

	consumo de alcohol. Como resultado, ninguna persona evaluada presentó alteraciones significativas en su consumo, lo que indica una buena salud en términos de consumo de alcohol en la comunidad. 3. Conseguí crear conciencia en cada familia sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol y sus efectos en la salud mental. A través de diálogos y explicaciones claras, cada participante comprendió la importancia de un consumo moderado y responsable, así como las señales de alerta que podrían indicar problemas futuros. 4. Durante las visitas, utilicé dinámicas rompehielos que ayudaron a establecer un ambiente de confianza y apertura. Esto permitió que las personas se sintieran cómodas para compartir sus experiencias y dudas, favoreciendo un espacio de aprendizaje mutuo y activo. A lo largo de los dos días de trabajo, mantuve un cronograma efectivo, visitando las casas de manera ordenada desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., lo que me permitió maximizar la cantidad de hogares alcanzados y cumplir con los objetivos establecidos para la actividad. 5. Fomenté que las familias asumieran un rol activo en la prevención del consumo de alcohol, proporcionándoles herramientas e información para identificar riesgos en sus propios entornos. Las familias mostraron interés y agradecimiento, comprometiéndose a mantener hábitos saludables. 6. Observé una alta receptividad por parte de los participantes, quienes demostraron interés en aprender sobre los efectos del alcohol en su bienestar y en sus relaciones familiares. La disposición de los hogares

	a colaborar durante la aplicación del test y las conversaciones fue un indicador claro del éxito en la intervención. Estos logros reflejan el impacto positivo que la estrategia de visitas casa a casa tuvo en la comunidad, contribuyendo de manera significativa a la prevención del consumo excesivo de alcohol **y la** promoción de la salud mental en el barrio Villa Luz.
Materiales o insumos requeridos.	Material de sensibilización, Test AUDIT.

Becerril, 16 de septiembre de 2024

Señora:
SILVIA ROSA PIZARRO
Secretaria De Salud Local

Asunto: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevencion del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicacion del test AUDIT.

En el marco del plan de intervenciones colectivas le informamos que se realizaron 200 visitas casa donde se eduque a las familias en temas como prevención del consumo con alteraciones mentales por su consumo y aplicaciones activando ruta de atención según su grupo de riesgo a las personas mayores de 18 años

Las visitas se realizarán **el día 19 de septiembre de 2024 a partir de las 8 a.m en el barrio Villa luz finalizando a las 4:30 p.m e**l objetivo de estas visitas casa a casa es educar a la familia sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol así promoviendo la prevención de alteraciones mentales y conductuales asociadas al consumo de alcohol con la aplicación del test AUDIT.

Agradecemos su colaboración en esta importante iniciativa

Atentamente,

Recibido
Sanyl
16-Sep-2024

Andrea Vega Gutiérrez
Psicóloga
T.P. 280564

Maylen Andrea Vega Gutiérrez
Psicóloga PIC

Becerril, 16 de septiembre de 2024

SEÑORA:

Leticia Londoño
Presidente de la junta de acción comunal

Asunto: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevencion del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicacion del test AUDIT.

En el marco del plan de intervenciones colectivas le informamos que se realizaron 200 visitas casa donde se eduque a las familias en temas como prevención del consumo con alteraciones mentales por su consumo y aplicaciones activando ruta de atención según su grupo de riesgo a las personas mayores de 18 años

Las visitas se realizarán **el día 19 de septiembre de 2024 a partir de las 8 a.m en el barrio Villa luz finalizando a las 4:30 p.m** el objetivo de estas visitas casa a casa es educar a la familia sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol así promoviendo la prevención de alteraciones mentales y conductuales asociadas al consumo de alcohol con la aplicación del test AUDIT.

Agradecemos su colaboración en esta importante iniciativa

Atentamente,

Andrea Vega Gutiérrez
Psicóloga
T.P. 280564

Maylen Andrea Vega Gutiérrez
Psicóloga PIC

Recibido.
Leticia Londoño.
16-Sep-2024.

Becerril, 16 de septiembre de 2024

Doctora:
Arelys Álvarez Angarita
Referente De Salud Mental

Asunto: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevencion del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicacion del test AUDIT.

En el marco del plan de intervenciones colectivas le informamos que se realizaron 200 visitas casa donde se eduque a las familias en temas como prevención del consumo con alteraciones mentales por su consumo y aplicaciones activando ruta de atención según su grupo de riesgo a las personas mayores de 18 años

Las visitas se realizarán **el día 19 de septiembre de 2024 a partir de las 8 a.m en el barrio Villa luz finalizando a las 4:30 p.m** el objetivo de estas visitas casa a casa es educar a la familia sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol así promoviendo la prevención de alteraciones mentales y conductuales asociadas al consumo de alcohol con la aplicación del test AUDIT.

Agradecemos su colaboración en esta importante iniciativa

Andrea Vega Gutiérrez
Psicóloga
T.P. 280564

Maylen Andrea Vega Gutiérrez
Psicóloga PIC

Recibido.
Samy
16-Sep-2024

Becerril, 16 de septiembre de 2024

Señora:
SILVIA ROSA PIZARRO
Secretaria De Salud Local

Asunto: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevencion del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicacion del test AUDIT.

En el marco del plan de intervenciones colectivas le informamos que se realizaron 200 visitas casa donde se eduque a las familias en temas como prevención del consumo con alteraciones mentales por su consumo y aplicaciones activando ruta de atención según su grupo de riesgo a las personas mayores de 18 años

Las visitas se realizarán **el día 20 de septiembre de 2024 a partir de las 8 a.m en el barrio Villa luz finalizando a las 4:30 p.m e**l objetivo de estas visitas casa a casa es educar a la familia sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol así promoviendo la prevención de alteraciones mentales y conductuales asociadas al consumo de alcohol con la aplicación del test AUDIT.

Agradecemos su colaboración en esta importante iniciativa

Atentamente,

Andrea Vega Gutiérrez
Psicóloga
T.P. 280564

Recibido
Samy
16-Sep. 2024

Maylen Andrea Vega Gutiérrez
Psicóloga PIC

Becerril, 16 de septiembre de 2024

SEÑORA:

Leticia Londoño
Presidente de la junta de acción comunal

Asunto: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevencion del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicacion del test AUDIT.

En el marco del plan de intervenciones colectivas le informamos que se realizaron 200 visitas casa donde se eduque a las familias en temas como prevención del consumo con alteraciones mentales por su consumo y aplicaciones activando ruta de atención según su grupo de riesgo a las personas mayores de 18 años

Las visitas se realizarán **el día 20 de septiembre de 2024 a partir de las 8 a.m en el barrio Villa luz finalizando a las 4:30 p.m** el objetivo de estas visitas casa a casa es educar a la familia sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol así promoviendo la prevención de alteraciones mentales y conductuales asociadas al consumo de alcohol con la aplicación del test AUDIT.

Agradecemos su colaboración en esta importante iniciativa

Atentamente,

Recibido.
Leticia Londoño
16-sep 2024.

Andrea Vega Gutiérrez
Psicóloga
T.P. 280564

Maylen Andrea Vega Gutiérrez
Psicóloga PIC

Becerril, 16 de septiembre de 2024

Doctora:
Arelys Álvarez Angarita
Referente De Salud Mental

Asunto: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevencion del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicacion del test AUDIT.

En el marco del plan de intervenciones colectivas le informamos que se realizaron 200 visitas casa donde se eduque a las familias en temas como prevención del consumo con alteraciones mentales por su consumo y aplicaciones activando ruta de atención según su grupo de riesgo a las personas mayores de 18 años

Las visitas se realizarán **el día 20 de septiembre de 2024 a partir de las 8 a.m en el barrio Villa luz finalizando a las 4:30 p.m** el objetivo de estas visitas casa a casa es educar a la familia sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol así promoviendo la prevención de alteraciones mentales y conductuales asociadas al consumo de alcohol con la aplicación del test AUDIT.

Agradecemos su colaboración en esta importante iniciativa

Andrea Vega Gutiérrez
Psicóloga
T.P. 280564

Maylen Andrea Vega Gutiérrez
Psicóloga PIC

Recibido.
Samy.
16 Sept. 2024.

	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2024 **ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL** **ESE HOSPITAL SAN JOSE**	

EJE ESTRATEGICO	**DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD**					
META DEL PRODUCTO ANUAL	Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.					
ESTRATEGIA PTS:	Incrementar acciones para incidir en la transformación de la salud mental y la convivencia social.					
LUGAR:	Barrio Villa Luz	**FECHA**	19 y 20 de septiembre/ 2024	**HORA INICIO**	8:0 0 A.M	
				HORA FINAL	04:30 P.M	
TIPO DE ACTIVIDAD:	**JORNADAS**	**REUNION**	**CONCERTACION**	**CARACTERIZACION**		
	Reunión	**Capacitación**	**Otra/cual:**	Visita casa a casa.		
ACTIVIDAD	Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.					
ENTORNO: **MICROTERRITORIO:**	COMUNITARIO 1					
OBJETIVOS:	El objetivo de esta estrategia es reducir los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol mediante la educación, identificación y seguimiento de las personas que presenten patrones problemáticos de consumo. A través de visitas casa a casa, se busca: • Educar a las familias sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol y sus efectos negativos en la salud física y mental. • Promover la prevención de alteraciones mentales y conductuales asociadas al consumo de alcohol. • Aplicar el test AUDIT para identificar tempranamente trastornos relacionados con el consumo de alcohol.					

Becerril Cesar

	• Ofrecer intervenciones breves en los casos detectados para mitigar el riesgo de dependencia y otros problemas asociados. • Activar rutas de atención y ofrecer seguimiento a personas con patrones de consumo preocupantes, de acuerdo con su nivel de riesgo. • Contribuir a la promoción de estilos de vida saludables en la población mayor de 18 años, fortaleciendo el bienestar de la comunidad. Con estas acciones se busca generar conciencia, prevenir el desarrollo de adicciones y reducir el impacto del consumo excesivo de alcohol en la salud pública.
POBLACIÓN OBJETIVO:	El objetivo de la población en esta estrategia es capacitarse y sensibilizarse sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol, tanto en términos de salud física como mental. Se busca que las personas mayores de 18 años puedan reconocer patrones de consumo de riesgo, identificar las señales de advertencia relacionadas con posibles trastornos asociados al alcohol y, de esta manera, prevenir el desarrollo de conductas problemáticas. Además, se espera que la población participe activamente en la aplicación del test AUDIT, que es una herramienta clave para identificar tempranamente aquellos casos en los que existen sospechas de un consumo perjudicial. Las personas que sean detectadas con patrones de consumo de riesgo recibirán intervenciones breves y un seguimiento para ayudarlas a modificar su comportamiento y, si es necesario, ser canalizadas a las rutas de atención adecuadas según su nivel de riesgo. En general, el objetivo es que la población adopte una actitud proactiva frente al consumo de alcohol, tome decisiones informadas, se involucre en su propio proceso de cuidado de la salud y bienestar, y se beneficie del

	acceso a servicios de apoyo cuando se detecten problemas relacionados con el alcohol. A largo plazo, esto contribuirá a la reducción del consumo nocivo de alcohol y al mejoramiento del bienestar comunitario.
LOGROS:	1. Se ha alcanzado a un total de 34 hogares, logrando una amplia cobertura en la comunidad objetivo. Más de 200 personas mayores de 18 años han recibido educación sobre los riesgos del consumo de alcohol y las alteraciones mentales asociadas, contribuyendo a la sensibilización de la población. 2. Se ha aplicado el test AUDIT a 200 personas, facilitando la identificación temprana de patrones de consumo de riesgo o posibles trastornos relacionados con el alcohol. 3. En todas estas intervenciones, no se evidenciaron alteraciones relacionadas con el consumo excesivo de alcohol, lo que indica una baja prevalencia de consumo problemático entre las personas evaluadas. 4. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar derivaciones, ya que no se han identificado patrones de consumo de alto riesgo que requieran seguimiento especializado. 5. No se ha detectado consumo problemático en las personas intervenidas, por lo que no se han requerido acciones específicas en este aspecto. 6. Se ha observado un incremento en la conciencia sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol, medido a través de entrevistas informales durante las visitas, lo que sugiere que la población ha adoptado una postura más preventiva. 7. Estos resultados reflejan un impacto positivo en la comunidad, especialmente en la identificación y prevención de problemas relacionados con el consumo de alcohol.
DIFICULTADES:	Mucha contaminación y sustancias psicoactivas.

Becerril Cesar

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Planeación: El 16 de septiembre de 2024, se conversó con el presidente de la Junta de Acción Comunal barrio villa luz sobre la realización de un tamizaje comunitario utilizando la escala AUDIT. Esta evaluación tiene como objetivo identificar los patrones de consumo y el nivel de riesgo en alcohol y otras sustancias psicoactivas en personas mayores de 18 años. Tras obtener una respuesta positiva, se programó el tamizaje para los días 19 y 20 de septiembre de 2024 a partir de las 08:00 A.M con finalización a las 04:30 P.M precedido por una convocatoria y socialización con la comunidad. Se procedió a enviar los oficios necesarios a la secretaría de salud (Silvia Pizarro) y al referente de salud mental (Arelys Alvares).

Introducción de la Actividad: La OMS define el tamizaje en salud como el uso de una prueba sencilla en una población aparentemente sana para identificar a aquellos con posibles patologías antes de que presenten síntomas visibles. La detección temprana permite implementar intervenciones antes de que las condiciones se vuelvan irreversibles. El consumo de alcohol es responsable de 3.3 millones de muertes anuales a nivel mundial, lo que representa el 6% de todas las muertes globales. Además, está relacionado con más de 200 enfermedades y trastornos, incluyendo causas de muerte como cirrosis hepática y cáncer. El AUDIT es una herramienta desarrollada por la OMS para identificar de manera temprana el consumo problemático de alcohol y ayudar a prevenir consecuencias graves.

Descripción de la actividad: Estrategia de Visita Casa a Casa en el Barrio villa luz (19 y 20 de septiembre de 2024)

1. Primer Momento: Visitas Casa a Casa (19 de agosto de 2024)

El 19 de septiembre de 2024, a las 08:00 a.m., comencé la primera jornada de visitas casa a casa en el barrio villa luz. Mi objetivo fue educar a las familias sobre la prevención del consumo excesivo de alcohol y las posibles alteraciones mentales asociadas. Para ello, utilicé el test AUDIT (Alcohol

Use Disorders Identification Test), que me permitió evaluar el consumo de alcohol en los hogares visitados.

Durante este día, visité un total de 17 casas. En cada una, conversé con las personas sobre los riesgos del consumo de alcohol, sus efectos en la salud mental y cómo identificar comportamientos de riesgo. Después de aplicar el test AUDIT, me alegró ver que ninguna de las personas evaluadas presentaba alteraciones en su consumo de alcohol.

2. Segundo Momento: Continuación de las Visitas (20 de septiembre de 2024)

El 20 de septiembre de 2024, a la misma hora, continué con la segunda jornada de visitas en el mismo barrio. Seguí con el mismo enfoque de educación y prevención, llevando nuevamente el test AUDIT para evaluar a los residentes sobre su consumo de alcohol.

En esta ocasión, visité otras 17 casas, educando a 17 personas más. Al igual que el día anterior, les expliqué sobre la importancia de un consumo moderado y los efectos del alcohol en la salud. Tras aplicar el test, me sentí satisfecha al comprobar que tampoco hubo alteraciones en el consumo de alcohol entre las personas evaluadas.

3. Resultados Finales

A lo largo de los dos días (19 y 20 de septiembre de 2024), visité un total de 33 casas, educando a 33 personas. En cada visita, logré crear conciencia sobre la prevención del consumo excesivo de alcohol y la identificación de señales de riesgo a través del test AUDIT. No encontré ninguna alteración significativa en los resultados.

4. Conclusión

La estrategia de visitas casa a casa fue muy positiva, ya que me permitió interactuar directamente con la comunidad y brindar información valiosa sobre la prevención del consumo de alcohol. Aunque

no encontré casos de consumo problemático, estas acciones preventivas son esenciales para mantener a la comunidad informada y alerta ante posibles riesgos en el futuro.

Para llevar a cabo los tamizajes en el micro territorio, se solicita el apoyo del presidente de la JAC, quien informa a la comunidad sobre la participación en la aplicación del tamizaje, realizando visitas a los hogares de las personas interesadas. Los criterios para participar en la jornada son:

1. Ser mayor de edad.
2. Tener disponibilidad para realizar la encuesta.
3. Haber manifestado interés en participar al presidente de la JAC.

La jornada se realiza en compañía del presidente de la JAC, revisando las seis personas interesadas en participar. La encuesta se lleva a cabo en sus hogares, comenzando con una presentación del profesional y la explicación del propósito del proceso, subrayando que los datos recolectados se utilizarán únicamente con fines educativos y que no serán manipulados.

Evaluación del Tamizaje del AUDIT en el Trimestre

El AUDIT es una prueba sencilla y validada que consta de diez preguntas diseñadas para detectar patrones de consumo de alcohol en niveles de riesgo. Las preguntas están estructuradas para evaluar la frecuencia y cantidad de consumo, así como las posibles consecuencias negativas relacionadas con el abuso de alcohol, como dificultades en las relaciones sociales, laborales y legales, y problemas de salud. Este test es ideal para su uso en poblaciones generales, ya que es breve, confiable y puede administrarse tanto en contextos clínicos como comunitarios.

La implementación del AUDIT en el contexto comunitario es de gran relevancia para la promoción de la salud pública, ya que permite identificar de manera temprana a aquellas personas que podrían beneficiarse de intervenciones preventivas. Además, es una herramienta no invasiva que respeta la privacidad de los participantes y proporciona información valiosa para el diseño de programas de intervención y concientización. En el caso de este estudio, la participación de 33 personas mayores

de 18 años permitió obtener un panorama sobre los patrones de consumo de alcohol en la comunidad y evaluar la necesidad de futuras intervenciones.

Desarrollo del Tamizaje en la Comunidad

Para llevar a cabo el tamizaje, un equipo de profesionales de la salud visitó a 33 familias en la comunidad. Durante las visitas, se explicó el propósito del test AUDIT y se ofreció a las personas mayores de 18 años la oportunidad de participar de manera voluntaria. Es importante destacar que todos los participantes dieron su consentimiento informado antes de responder las preguntas del test. Esto garantizó que el proceso se llevara a cabo de manera ética y respetuosa con los derechos de los individuos.

El test se administró de forma individual, asegurando la confidencialidad de las respuestas. Se crearon espacios donde los participantes se sintieran cómodos para responder con honestidad sobre su consumo de alcohol. La mayoría de los participantes manifestaron una actitud positiva hacia el proceso, reconociendo la importancia de la evaluación para promover su bienestar y prevenir posibles problemas de salud. Al concluir el tamizaje, no se detectaron casos de consumo de alcohol en niveles de riesgo, lo que sugiere que la comunidad evaluada no presenta problemas significativos en relación con el consumo excesivo de alcohol.

El tamizaje para la detección de consumo riesgoso de alcohol mediante el test AUDIT se llevó a cabo a lo largo de un trimestre, en una intervención liderada por una psicóloga y una auxiliar de enfermería. Este proceso se realizó en tres fases, cubriendo 34 tamizajes en julio, 34 en agosto y 33 en septiembre, para un total de 101 evaluaciones en adultos mayores de 18 años. El objetivo de esta intervención fue detectar posibles patrones de consumo problemático de alcohol en la población y, de ser necesario, derivar a los participantes a programas de prevención y tratamiento. En este análisis, abordaremos los resultados cuantitativos y cualitativos derivados de la intervención, evaluando tanto los números obtenidos como las percepciones y experiencias de los participantes.

El análisis cuantitativo de los datos revela que se mantuvo una consistencia en el número de tamizajes realizados a lo largo del trimestre. En julio, se realizaron 34 evaluaciones; en agosto, 34; y en septiembre, 33. Esta distribución equitativa permitió asegurar una cobertura adecuada durante

Becerril Cesar

los tres meses, evitando la sobrecarga en un periodo específico y permitiendo un monitoreo constante de la población. A lo largo del trimestre, las 101 personas evaluadas no presentaron ningún resultado positivo en el test AUDIT que sugiriera consumo riesgoso o problemático de alcohol. Esto implica que, según la herramienta de tamizaje, la comunidad muestra un patrón de consumo de alcohol moderado o inexistente en los adultos evaluados. Este hallazgo es importante en términos de salud pública, ya que reduce la necesidad de intervenciones inmediatas para abordar el consumo problemático de alcohol en esta población específica.

Además, es relevante destacar que la consistencia en los números de tamizajes mensuales refleja una adecuada organización y planificación de la intervención. La capacidad de completar una cantidad equilibrada de tamizajes cada mes permitió mantener una alta calidad en la recolección de datos y una atención personalizada a cada uno de los participantes.

En términos cualitativos, la intervención proporcionó una valiosa oportunidad para conocer la percepción de la comunidad respecto al consumo de alcohol y su participación en programas de tamizaje. A lo largo de las visitas realizadas por la psicóloga y la auxiliar de enfermería, se generaron espacios de diálogo donde los participantes pudieron expresar sus opiniones sobre el alcohol y su relación con la salud.

La mayoría de los participantes se mostró receptiva y valoró positivamente el hecho de ser incluidos en un proceso preventivo de este tipo. Algunos mencionaron que el test AUDIT les permitió reflexionar sobre sus hábitos de consumo, aunque los resultados no indicaran riesgo alguno. Estos espacios de conversación se convirtieron en una plataforma para discutir de manera abierta y sin prejuicios temas relacionados con el alcohol, algo que no siempre es común en algunas comunidades.

Otra observación cualitativa importante fue el rol de la confianza en la efectividad del tamizaje. El hecho de que el equipo de salud, compuesto por una psicóloga y una auxiliar de enfermería, fuera visto como un apoyo cercano, facilitó la disposición de los participantes a involucrarse en el proceso. Se generó un ambiente seguro, en el que los participantes se sintieron cómodos compartiendo sus experiencias y respondiendo con sinceridad a las preguntas del test AUDIT.

Becerril Cesar

Resultados del TEST AUDIT

Los resultados del tamizaje fueron altamente positivos. Ninguno de los 33 participantes presentó puntuaciones en el test AUDIT que indicaran consumo riesgoso o dependencia del alcohol. Estos hallazgos son alentadores, ya que reflejan una comunidad que, al menos en la población adulta evaluada, no muestra signos de consumo problemático. Es importante subrayar que estos resultados no implican necesariamente que no haya consumo de alcohol en la comunidad, sino que aquellos que participaron en el tamizaje lo hacen de manera moderada y sin poner en riesgo su salud física, mental o social.

Los factores que podrían estar influyendo en estos resultados pueden ser diversos. En primer lugar, es posible que exista una cultura de moderación respecto al consumo de alcohol en la comunidad, donde se promuevan valores y prácticas de autocuidado. Además, la educación y las campañas de concientización sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol podrían haber tenido un impacto positivo en las actitudes y comportamientos de los participantes. Por último, es relevante considerar que el tamizaje fue voluntario, lo que puede haber influido en los resultados al participar principalmente aquellos individuos con una autopercepción de su consumo como no problemático.

El hecho de que no se encontraran casos de consumo riesgoso de alcohol en esta muestra es un indicativo de que las estrategias de prevención y promoción de la salud que puedan estar implementándose en la comunidad están siendo efectivas. Sin embargo, este tamizaje también ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de mantener esfuerzos continuos en la vigilancia y prevención del consumo de alcohol. La ausencia de resultados negativos en esta evaluación no debe ser interpretada como un indicador para bajar la guardia. Al contrario, es fundamental continuar con programas educativos, tanto en contextos escolares como comunitarios, que sigan reforzando los mensajes sobre los riesgos del abuso de alcohol y las ventajas de mantener un consumo responsable.

Asimismo, es relevante continuar monitoreando a las poblaciones más jóvenes, que pueden estar en mayor riesgo de iniciar o incrementar el consumo de alcohol en el futuro. Aunque este estudio se centró en personas mayores de 18 años, es crucial que se implementen intervenciones tempranas dirigidas a adolescentes y jóvenes, quienes podrían beneficiarse de una mayor

educación sobre los efectos del alcohol en su desarrollo físico y emocional.

El tamizaje del AUDIT realizado en la comunidad, que involucró a 100 familias, fue un ejercicio exitoso en términos de promoción de la salud y prevención del consumo problemático de alcohol. Los resultados obtenidos, donde ninguno de los participantes presentó alteraciones o patrones de consumo riesgoso, son alentadores y reflejan una comunidad consciente de los riesgos del consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, es crucial seguir implementando estrategias de prevención y educación, asegurando que estas buenas prácticas se mantengan a lo largo del tiempo y que futuras generaciones también reciban la orientación adecuada para evitar el abuso de alcohol. El test AUDIT demostró ser una herramienta eficaz en la identificación de patrones de consumo de alcohol, y su uso continuo puede contribuir significativamente al bienestar de la población.

Conclusión

El tamizaje del AUDIT realizado durante el trimestre refleja un balance positivo tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo. Desde un punto de vista numérico, los 33 tamizajes realizados proporcionaron una muestra sólida para evaluar el consumo de alcohol en la comunidad. La ausencia de resultados positivos en el AUDIT indica que no existe un problema generalizado de consumo excesivo de alcohol en la población evaluada, lo cual es un hallazgo alentador.

Desde la perspectiva cualitativa, los participantes expresaron una actitud favorable hacia el proceso de tamizaje, destacando la importancia de mantener iniciativas preventivas que les permitan reflexionar sobre sus hábitos de consumo. Esta intervención no solo evaluó posibles riesgos, sino que también proporcionó un espacio para la educación y el diálogo sobre el consumo responsable de alcohol.

La intervención llevada a cabo por la psicóloga y la auxiliar de enfermería cumplió con sus objetivos en términos de cantidad de evaluaciones realizadas y, al mismo tiempo, fomentó una mayor conciencia en la comunidad sobre la importancia de mantener hábitos de consumo saludables. Se recomienda continuar con este tipo de intervenciones periódicamente para asegurar que los patrones de consumo de alcohol se mantengan bajo control y para seguir promoviendo el bienestar integral de la comunidad.

Becerril Cesar

Cuadro 1

Evidencias para la Intervención Breve

Durante los últimos 20 años se han realizado numerosos estudios clínicos aleatorizados de las intervenciones breves en diversos ámbitos sanitarios. Se han llevado a cabo estudios en Australia, Bulgaria, México, Reino Unido, Noruega, Suecia, Estados Unidos y en muchos otros países. La evidencia de la eficacia de las intervenciones breves se ha resumido en varios artículos de revisión, entre los que se incluyen los siguientes:

- En uno de los primeros artículos de revisión, Bien et al.[9] analizaron 32 estudios controlados que incluían alrededor de 6.000 pacientes, hallando que las intervenciones breves a menudo eran tan eficaces como los tratamientos más amplios. «Existe una evidencia alentadora de que el curso del consumo perjudicial de alcohol puede alterarse eficazmente mediante estrategias de intervención bien diseñadas que son posibles dentro de contextos con un contacto relativamente breve, como es le caso de centros de Atención Primaria y programas de medicina laboral.»
- Kahan et al.[10] revisaron 11 estudios sobre intervención breve y llegaron a la conclusión de que, mientras que se requieren más estudios de investigación sobre cuestiones específicas, el impacto sobre la salud pública de las intervenciones breves es potencialmente enorme. «Se recomienda a los facultativos que implementen estas estrategias en su práctica clínica, dada la evidencia de la efectividad de las intervenciones breves y de la mínima cantidad de tiempo y esfuerzo que requieren.»
- Wilk el al.[11] revisaron doce estudios aleatorizados y controlados, y llegaron a la conclusión de que los bebedores que reciben una intervención breve eran dos veces más propensos a reducir su consumo en un período 6 a 12 meses que aquellos que no recibieron intervención. «La intervención breve es una medida preventiva, eficaz y de bajo coste para grandes bebedores en tratamiento ambulatorio.
- Moyer et al.[12] revisaron estudios comparando la intervención breve tanto con grupos control sin tratamiento, como con tratamientos más prolongados. Encontraron «una amplia evidencia positiva» de la eficacia de la intervención breve, especialmente en pacientes con problemas menos graves. Hay que advertir que la intervención breve no debe sustituir al tratamiento especializado, sugieren que pueden funcionar bien como un tratamiento inicial para pacientes dependientes más graves que buscan un tratamiento más amplio.

Resumen: La reticencia de los profesionales de Atención Primaria para realizar el screening de alcohol y la intervención breve se basa a menudo en suposiciones sobre la dificultad de la tarea, el tiempo requerido, las habilidades necesarias y la respuesta del paciente. Tras un examen más

cuidadoso, la mayoría de estas barreras percibidas sobre el SIB son concepciones erróneas o retos menores que pueden ser fácilmente superados. Sin embargo, quizás sean más difíciles de abordar las propias actitudes y el consumo personal de alcohol de los profesionales sanitarios. Dada la obligación de dar la mejor atención médica posible a los pacientes, la implementación de un programa de prueba del SIB puede proporcionar la mejor oportunidad de convencer a los escépticos de que es factible, eficaz y efectivo.

Cuadro 2

Nivel de Riesgo	Intervención	Puntuación del AUDIT*
Zona I	Educación sobre el alcohol	0-7
Zona II	Consejo simple	8-15
Zona III	Consejo simple más terapia breve y monitorización continuada	16-19
Zona IV	Derivación al especialista para la evaluación diagnóstica y tratamiento	20-40

* El valor de corte de la puntuación del AUDIT puede variar ligeramente dependiendo de los patrones de consumo del país, el contenido de alcohol de las bebidas habituales, y el tipo de programa de screening. Consulte el manual del AUDIT para más detalles. El juicio clínico debe ejercitarse en la interpretación de los resultados del test de screening para modificar estas pautas, especialmente si las puntuaciones en el AUDIT se sitúan en el rango de 15-20.

El primer nivel, la Zona de Riesgo 1, se refiere a la mayoría de los pacientes en muchos países. Las puntuaciones del AUDIT por debajo de 8 generalmente indican un consumo de bajo riesgo. Aunque no se requiere intervención alguna, para muchos individuos la educación sobre el alcohol es apropiada por varios motivos: contribuye a la concienciación general de los riesgos del alcohol en la comunidad; puede servir como una medida preventiva; podría ser eficaz para los pacientes que

Becerril Cesar

han minimizado el grado de su consumo en las preguntas del AUDIT y podría recordar a los pacientes con problemas pasados los peligros de volver a un consumo de riesgo.

El segundo nivel, la Zona de Riesgo II, es probable que se dé en una proporción significativa de pacientes en muchos países. Consiste en un consumo de alcohol por encima de las pautas establecidas. Aunque las pautas de consumo varían de un país a otro, los datos epidemiológicos sugieren que los riesgos de los problemas relacionados con el alcohol aumentan significativamente cuando el consumo es superior a los 20 g de alcohol puro al día, que es el equivalente de aproximadamente dos bebidas estándar en muchos países. Una puntuación en el AUDIT entre 8 y 15 generalmente indica un consumo de riesgo, pero esta zona también puede incluir pacientes que experimentan daño y dependencia.

El tercer nivel, la Zona de Riesgo III, se refiere a un patrón de consumo de alcohol que ya está causando daño al bebedor, que a su vez puede estar presentando síntomas de dependencia. Los pacientes en esta zona pueden manejarse mediante la combinación de consejo simple, terapia breve y monitorización continuada. Las puntuaciones del AUDIT en el rango de 16-19 a menudo sugieren un consumo perjudicial o dependencia, para lo que se recomienda un abordaje clínico más completo.

El cuarto y más alto nivel de riesgo, la Zona de Riesgo IV, viene sugerida por puntuaciones en el AUDIT por encima de 20. Estos pacientes deberían ser derivados a un especialista (si existe la posibilidad) para una evaluación diagnóstica y posible tratamiento de la dependencia de alcohol. Los profesionales sanitarios deberían tener en cuenta, sin embargo, que la dependencia varía a lo largo de un continuum de gravedad y podría ser clínicamente significativa incluso con puntuaciones más bajas del AUDIT. En las siguientes secciones se describe con mayor detalle el manejo clínico de los pacientes cuyas puntuaciones se sitúan en cada una de estas zonas.

Educación sobre el alcohol para bebedores de bajo riesgo, abstemios y otros:

Los pacientes cuyo screening es negativo en el AUDIT (por lo tanto en Zona I), tanto si son bebedores de bajo riesgo como abstemios, pueden beneficiarse, no obstante, de la información

Becerril Cesar
Carrera 1 No 1A - 10 Barrio San Jose - Tel. 312 828 5042 - Email: gerencia@hospitalsanjosebecerril.gov.co

sobre el consumo de alcohol. El consumo de alcohol de la mayoría de la gente varía a lo largo del tiempo. De este modo, una persona que ahora bebe moderadamente, puede incrementar su consumo en el futuro. Más aún, la publicidad de la industria alcoholera y la información en los medios sobre los beneficios del consumo de alcohol pueden llevar a algunos no bebedores a beber por motivos de salud y a otros que beben moderadamente a que consuman más. Por lo tanto, unas pocas palabras o información escrita sobre los riesgos de la bebida pueden prevenir el consumo de riesgo o perjudicial en el futuro.

Los pacientes también deberían ser elogiados por sus hábitos actuales de bajo riesgo, recordándoles que, si beben, lo hagan dentro de los niveles recomendados. La información sobre lo que constituye una unidad de bebida estándar es esencial para comprender esos límites. Comunicar esta información y preguntar si el paciente tiene alguna duda puede requerir menos de un minuto. El folleto de educación del paciente en el Anexo A puede utilizarse para este fin.

El Cuadro 3 proporciona un texto simple para facultativos de primaria que ilustra cómo manejar a los pacientes cuyos resultados en los tests de screening son negativos.

Cómo manejar a los pacientes que están preocupados sobre miembros de su familia y amigos: Cuando el tema del consumo de alcohol surge durante una visita de Atención Primaria, no es infrecuente que los pacientes se muestren interesados en esta información como un modo de comprender o de ayudar a familiares o amigos. Según Anderson, proporcionar consejo a familiares o amigos preocupados es importante por dos motivos:

1. El consejo puede ayudar a reducir el estrés que a menudo experimentan las personas en el círculo social inmediato del sujeto que bebe en exceso.
2. Estas personas pueden jugar un papel crítico para ayudar a cambiar la conducta del bebedor.

Los facultativos de Atención Primaria pueden hacer al menos tres cosas para ayudar a un familiar o amigo a manejar al bebedor excesivo:

- **Escuche compasivamente**: El facultativo de Atención Primaria puede pedirle al amigo o familiar preocupado que describa el problema de consumo que está intentando abordar y cómo les afecta. Es importante determinar la gravedad del problema con la bebida en cuestión, de acuerdo con los criterios descritos en este manual para el consumo de riesgo, consumo perjudicial y dependencia de alcohol. La información debe ser tratada **confidencialmente** y no mostrar perjuicio ante cualquier pregunta o comentario

Cuadro 3

¿Qué hacer con los pacientes cuyos resultados en el Test de Screening son negativos?

Proporcione feedback sobre los resultados del Test de Screening

Ejemplo
«He revisado los resultados del cuestionario que completó hace unos minutos. Si recuerda, las preguntas valoraban su consumo de alcohol y si ha experimentado algún problema relacionado con su consumo. De sus respuestas se desprende que tiene un bajo riesgo de experimentar problemas relacionados con el alcohol si continúa bebiendo de forma moderada (siendo abstinente).»

Eduque a los pacientes sobre los niveles de bajo riesgo y los riesgos de sobrepasarlos

Ejemplo
«Si bebe, intente no tomar más de dos consumiciones al día y asegúrese siempre de evitar beber al menos dos días a la semana, incluso en pequeñas cantidades. A menudo es útil prestar atención al numero de 'unidades de bebida estandar' que consume, recordando que una botella de cerveza, un vaso de vino y una copa de destilados contienen aproximadamente las mismas cantidades de alcohol. La gente que sobrepasa estos niveles tiene más probabilidades de padecer problemas de salud relacionados con el alcohol como accidentes, lesiones, hipertensión, enfermedad hepática, cáncer y enfermedades del corazón.»

Felicite a los pacientes por seguir estas recomendaciones

Ejemplo
«Continúe con el buen trabajo y trate siempre de mantener su consumo de alcohol por debajo o dentro de las recomendaciones de bajo riesgo.»

Nota

El folleto educativo para los paciente (Anexo A) puede utilizarse para proporcionar educación sobre el alcohol a los bebedores de bajo riesgo, poniendo énfasis en la pirámide de bebedores (Panel 2), la ilustración de una unidad de bebida estándar (Panel 6) y las recomendaciones de consumo de bajobriesgo (Panel 5).

Este manual presenta el AUDIT, Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, y describe cómo utilizarlo para identificar a las personas con un patrón de consumo de riesgo o perjudicial de alcohol. El AUDIT fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un método simple de screening del consumo excesivo de alcohol y como un apoyo en la evaluación breve. Puede ayudar en la identificación del consumo excesivo de alcohol como causa de la enfermedad presente. Proporciona un marco de trabajo para la intervención dirigida a los bebedores de riesgo, para que puedan reducir o abandonar el consumo de alcohol y, con ello, evitar las consecuencias perjudiciales de su consumo.

A este respecto, el manual describirá:

- Motivos por los que preguntar sobre el consumo de alcohol.
- El contexto del screening de alcohol.
- Desarrollo y validación del AUDIT.
- Las preguntas del AUDIT y cómo utilizarlas.
- Puntuación e interpretación.
- Cómo llevar a cabo un examen clínico de screening.
- Cómo ayudar a los pacientes cuyo screening sea positivo.
- Cómo implementar un programa de screening.

Los Anexos de este manual contienen información adicional, útil para clínicos e investigadores. Las directrices incluidas en el Anexo A sugieren otros posibles estudios sobre la fiabilidad, validez y puesta en funcionamiento del screening con el AUDIT. El Anexo B contiene un ejemplo del AUDIT en formato de auto-administración. El Anexo C proporciona unas pautas para la traducción y adaptación del AUDIT. El Anexo D describe procedimientos clínicos de screening mediante un examen físico, pruebas de laboratorio y la historia clínica. El Anexo E proporciona información sobre los materiales de formación disponibles.

¿Por qué hacer screening del consumo de alcohol?

Hay muchas formas de consumo excesivo de alcohol que suponen un riesgo o un daño importante para el individuo. Entre ellas se incluyen el consumo diario elevado, los episodios repetidos de beber hasta la intoxicación, consumos de alcohol que están causando daño físico o mental y el consumo cuyo resultado es el desarrollo de dependencia o adicción. El consumo excesivo causa enfermedad y sufrimiento en el bebedor, su familia y amigos. Es una de las causas principales de ruptura de relaciones de pareja, de accidentes, hospitalización, incapacidad prolongada y muerte prematura. Los problemas relacionados con el alcohol representan una inmensa pérdida económica para muchas comunidades en todo el mundo.

El AUDIT fue desarrollado para detectar el consumo excesivo de alcohol y en particular para ayudar a los clínicos a identificar a aquellas personas que podrían beneficiarse de la reducción o abandono del consumo. La mayoría de bebedores excesivos no están diagnosticados. A menudo, éstos presentan síntomas o problemas que normalmente no se relacionan con su consumo de alcohol. El AUDIT ayudará al clínico a identificar si la persona presenta un consumo de riesgo, consumo perjudicial o dependencia de alcohol.

El consumo de riesgo es un patrón de consumo de alcohol que aumenta el riesgo de consecuencias adversas para el bebedor o para los demás. Los patrones de consumo de riesgo son importantes para la salud pública a pesar de que el individuo aún no haya experimentado ningún trastorno.

El consumo perjudicial se refiere a aquel que conlleva consecuencias para la salud física y mental, aunque algunos también incluyen las consecuencias sociales entre los daños causados por el alcohol.

La dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol. Estos fenómenos típicamente incluyen deseo intenso de consumir alcohol, dificultad para controlar el consumo, persistencia del consumo a pesar de las consecuencias perjudiciales, mayor prioridad al consumo frente a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia al alcohol y abstinencia física cuando el consumo se interrumpe.


El alcohol está implicado en una amplia variedad de enfermedades, trastornos y lesiones, así como en múltiples problemas sociales y legales. Es una de las causas principales del cáncer de boca, esófago y laringe. La cirrosis hepática y la pancreatitis a menudo se producen como consecuencia del consumo excesivo durante largos períodos de tiempo. El alcohol causa daños al feto en mujeres embarazadas. Así mismo, problemas médicos mucho más frecuentes, como la hipertensión, la gastritis, la diabetes y algunas formas de infarto cerebral pueden agravarse incluso por el consumo ocasional y de breve duración, tal como también ocurre con trastornos mentales como la depresión. Las lesiones por accidentes de tráfico y de peatones, las caídas y los problemas laborales a menudo se producen como consecuencia del consumo excesivo de alcohol. Los riesgos se asocian con el patrón de bebida y con la cantidad de alcohol consumida. Destacar que si bien las personas con dependencia de alcohol son más propensas a desarrollar más niveles de daño, la mayor parte de los daños asociados con el alcohol aparecen entre las personas que no son dependientes, aunque sólo sea porque hay muchos más de éstos últimos. Por ello, la identificación de bebedores según diversos tipos y grados de consumo de riesgo puede ser de gran importancia para reducir todos los daños asociados.

La figura 1 ilustra la diversidad de problemas de salud asociados con el consumo de alcohol. A pesar de que las consecuencias médicas tienden a estar concentradas en personas con una dependencia grave, incluso el consumo en el margen de 20-40 gramos al día de alcohol puro es un factor de riesgo para los accidentes, las lesiones y múltiples problemas sociales.

Son muchos los factores que contribuyen al desarrollo de problemas relacionados con el alcohol. La ignorancia de los límites del consumo y de los riesgos asociados con el consumo excesivo son factores importantes. También representan un papel destacable las influencias sociales y ambientales, tales como las costumbres y actitudes que favorecen el consumo elevado. De particular importancia en el screening es, sin embargo, el hecho que las personas que no son dependientes de alcohol pueden parar o reducir su consumo con la asistencia y el esfuerzo adecuado. Una vez que se ha desarrollado la dependencia, el abandono del consumo de alcohol es más difícil y a menudo requiere tratamiento especializado. Aunque no todos los bebedores de riesgo llegan a ser dependientes, nadie desarrolla dependencia sin haber mantenido durante algún tiempo

Becerril Cesar

un consumo de riesgo de alcohol. Considerando estos factores, la necesidad del screening parece clara.



Si bien este manual se centra en el uso del AUDIT para el screening del consumo de alcohol y los riesgos relacionados en el ámbito de la atención primaria, también puede ser utilizado eficazmente en muchos otros contextos. En muchos casos ya se han desarrollado y utilizado los procedimientos de aplicación específicos. El cuadro 1 resume la información sobre el lugar de aplicación, personal encargado del screening y población diana que se consideran adecuados para un programa de screening mediante el AUDIT.

Murray ha argumentado que el screening puede ser llevado a cabo exitosamente con:

- Pacientes de un hospital general, especialmente aquellos con trastornos asociados de forma clara con la dependencia de alcohol (p.ej., pancreatitis, cirrosis, gastritis, tuberculosis, trastornos neurológicos, cardiomiopatía).
- Personas que están deprimidas o que han intentado suicidarse.
- Otros pacientes psiquiátricos.
- Pacientes que acuden al servicio de urgencias.
- Pacientes que acuden al médico general.
- Vagabundos.
- Presos.
- Aquellos multados por motivos legales relacionados con su consumo de alcohol (p.ej., conducir bajo los efectos del alcohol, intoxicación pública).

A éstos deberían añadirse aquellos grupos considerados por un Comité de Expertos de la OMS como de alto riesgo para desarrollar problemas relacionados con el alcohol:

- Varones de mediana edad.
- Adolescentes.
- Trabajadores emigrantes.
- Otros grupos específicos de trabajadores (tales como ejecutivos de empresas, animadores, prostitutas, camareros y marineros).

La naturaleza del riesgo difiere en función de la edad, género, contexto del consumo y patrón del mismo, así como los factores socioculturales que juegan un importante papel en la definición y expresión de los problemas relacionados con el alcohol.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E
NIT: 824000425 – 6
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: _____ ID:_____FECHA:

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

La actividad de visita casa a casa culminó de manera exitosa a las 4:30 p.m., logrando un alto nivel de participación y cumplimiento de los objetivos propuestos. Durante la jornada, se visitaron un total de 33 viviendas, donde no solo se brindó educación personalizada sobre la prevención del consumo excesivo de alcohol, sino que también se entregaron folletos informativos que detallaban las señales de riesgo y las estrategias para mantener un consumo responsable o abstenerse por completo. Cada residente tuvo la oportunidad de hacer preguntas y expresar sus preocupaciones, lo que permitió un diálogo abierto y constructivo sobre los efectos del alcohol en la salud mental y física.

Se aplicó el test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) en cada hogar para identificar posibles patrones de consumo riesgoso o perjudicial de alcohol. Esta herramienta permitió una evaluación directa y confidencial, asegurando que los participantes comprendieran la importancia de su bienestar y la detección temprana de posibles problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Es importante destacar que, tras la aplicación del test en las 34 viviendas, no se identificaron casos que presentaran alteraciones o patrones de consumo de alcohol que ameritaran intervención inmediata o derivación a servicios especializados de salud. Esto es un indicativo positivo de la situación actual en el área visitada, aunque se reafirmó la importancia de seguir vigilantes y continuar promoviendo hábitos saludables para evitar futuros problemas relacionados con el consumo de alcohol.

El ambiente de la actividad fue colaborativo y receptivo, con los residentes mostrando interés en los materiales educativos entregados y agradeciendo la visita. Al final de la jornada, se reforzó el mensaje de la prevención y la importancia de mantener un control sobre el consumo de alcohol, así como la disponibilidad de recursos locales en caso de que alguien requiera ayuda en el futuro.

Esta actividad no solo cumplió con la meta de educar y sensibilizar, sino que también permitió establecer una relación de confianza entre los profesionales de salud y la comunidad, sentando las bases para futuras intervenciones si llegaran a ser necesarias.

Becerril Cesar

EL PAPEL DE LOS MIEMBROS DE COPACO

Monitoreo y Evaluación:

- Vigilar la calidad y accesibilidad de los servicios de salud.
- Evaluar la efectividad de las intervenciones y programas de salud.

Defensa y Representación:


- Representar los intereses de la comunidad en cuestiones de salud.
- Abogar por mejoras en los servicios y políticas de salud.

Educación y Concientización:

- Organizar talleres y actividades educativas sobre salud.
- Difundir información sobre prevención y detección temprana.

CONCLUSIÓN


Las veedurías de salud desempeñan un papel vital en la protección y promoción de la salud comunitaria. La detección temprana y la respuesta adecuada a las señales de alarma pueden salvar vidas y mejorar significativamente la calidad de vida. Los miembros de COPACO son esenciales para asegurar que estas prácticas se implementen efectivamente y para educar a la comunidad sobre la importancia de la salud preventiva.



ALCALDÍA MUNICIPAL BECERRIL-CESAR

E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC-2024



CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

SECRETARIA LOCAL DE SALUD



¿POR QUÉ ES RECOMENDABLE ABSTENERSE DE LA INGESTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS?

Porque afecta a cada órgano de tu cuerpo


PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2024

En el cerebro
El alcohol en exceso disminuye la memoria, la capacidad de concentración y el autocontrol.

En el hígado
Los efectos de esta metabolización son náuseas, vómitos y dolor de cabeza.

En el estómago
Este órgano se inflama, retrasando la digestión. El exceso de ácidos gástricos provoca náuseas.

En la piel
El alcohol aumenta el flujo de sangre, por lo que la piel presenta más sudoración.



En el corazón
Los efectos del alcohol provocan un aumento en la actividad cardiaca y aceleración del pulso.

En los pulmones
El alcohol acelera la respiración. Si el alcohol circulante es demasiado, detendrá la respiración.

En los riñones
El alcohol hace que eliminen más agua de la que se ingiere, provocando que el organismo la busque en otros órganos. Esto genera dolor de cabeza.


>> **En un caso grave, el afectado puede quedar en coma, o incluso morir por un posible riesgo cardiovascular o paro respiratorio.**

identificar posibles patrones de consumo de riesgo o perjudicial de alcohol.


CARACTERIZACION: Se abordaron 33 personas en total



INTERPRETACION: Se intervinieron 33 personas, la mayor parte 27 personas pertenecen al sexo FEMENINO y la menor parte 6 personas son del sexo MASCULINO.




INTERPRETACION: Se intervinieron 33 personas, donde la mayor parte 25 personas pertenecen al rango de edad ADULTEZ (entre 27-59), seguido de 5 personas pertenecen al rango de edad JUVENTUD (entre 19-26 años) y la menor parte 3 personas pertenecen al rango de edad ADULTO MAYOR.



INTERPRETACION: Se intervinieron 33 personas, donde la mayor parte 20 personas pertenecen a CONDICION DESPLAZADO, seguido de 8 personas pertenecen a OTRAS CONDICIONES y la menor parte 5 personas pertenece a MUJER DE HOGAR.



INTERPRETACION: Se abordaron 33 personas, donde 3 personas pertenecen a tipo de poblacion de AFRODESCENDIENTE.



INTERPRETACION: Se abordaron 33 personas, donde todas las personas pertenecen al REGIMEN SUBSIDIADO.


EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.

FECHA: 19/SEPTIEMBRE/2024

HORA: 08:00 A.M













EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.

FECHA: 19/SEPTIEMBRE/2024

HORA: 08:00 A.M









EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.

FECHA: 20/SEPTIEMBRE/2024

HORA: 08:00 A.M













EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.

FECHA: 20/SEPTIEMBRE/2024


HORA: 08:00 A.M













HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Elba Mendez ID: 49753123 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0) X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Juana Isabel ID: 1082895776 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0) X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Maluiz Rula ID: 365737556 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Claudia delgado ID: 36518578 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Karen Pallares ID: 1094836781 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Isle Villa ID: 36518401 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)✓ Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)✓ 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)✓ 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)✓ Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)✓ Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)✓ Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)✓ Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)✓ Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)✓ Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)✓ Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: [illegible] ID: 45581523 FECHA: 19/04/24

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Gladys Sanchez ID: 1063813526 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Kathly Morales ID: 1080572296 FECHA: 19/04/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Maryelis Cristales ID: 1063488599 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0) X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Francelina Martinez ID: 39017319 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Jorge Amaya ID: 12568359 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) Una o menos veces al mes (1)2 a X 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) X 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1)X Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Genesis Blanca ID: 25858841 FECHA: 20/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1.	¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2.	¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3.	¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4	¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5	¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6	¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7	¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8	¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9	Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10	¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Juan Fernando ID: 1085042898 FECHA: 20/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0) X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Jorge Bonilla ID: 12565047 FECHA: 20/04/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Candida Pino ID: 62001160 FECHA: 20/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: _____ ID:_____FECHA:

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Nathalia castillejo M ID: 1007593400 FECHA: 20/09/24

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Antonio José ID: 12486358 FECHA: 20/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Cecilia Ligardo perez ID: 49610408 FECHA: 20/01/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Maria Angelica R. ID: 1062815216 FECHA: 20/09/2021

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Ester Redondo ID: 1062469185 FECHA: 20/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Jadith Nathaly Mendoza ID: 2517098 5 FECHA: 20/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Lilian Greshell Molina ID: 106535973 FECHA: 20/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0)X Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Marisela Mora ID: 5200841 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) Una o menos veces al mes (1)2 a X 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) X 7 a 9 (3) 10 o más (4)
¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0) X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Himer Molina ID: 77101622 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) 5 o 6 (2)X 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Marolin Castro ID: 1003038076 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) Una o menos veces al mes (1)2 a X 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) X 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0) X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) X Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Ester Redondo ID: 1062469185 FECHA: 20/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) Una o menos veces al mes (1)2 a X 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) X 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0) X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Daisy Guerrón ID: 106772 0810 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) Una o menos veces al mes (1)2 a X 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) 5 o 6 (2)X 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1)X Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Ivis Isabel ID: 1042572104 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Nora Mieles ID: 49753283 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) Una o menos veces al mes (1)2 a X 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1)X 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1)X Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Nerida Cardena ID: 1082895776 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) Una o menos veces al mes (1)2 a X 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) 5 o 6 (2)X 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0)X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0)X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0)X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Ella Mendez ID: 36518578 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) Una o menos veces al mes (1) X 2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) X 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0) X 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) X Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) X Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: Martin Carrasal ID: 1102877486 FECHA: 19/09/2024

Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumos de riesgo comodependencia alcohólica; identifica los trastornos debidos al consumo no responsable de alcohol.

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas Alcohólicas?	Nunca (0) Una o menos veces al mes (1)2 a 4 veces al mes (2) 2 o 3 veces a la semana (3) 4 o más veces a la semana (4)
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas Alcohólicas en un solo día?	1 o 2 (0) 3 o 4 (1) 5 o 6 (2) 7 a 9 (3) 10 o más (4)
4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una vez que Habías empezado?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,has tenido remordimientos o sentimientos deculpa después de haber bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año,no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
9 Tú o alguna otra persona, ¿habéis resultado heridos porque habías bebido?	Nunca (0) Menos de una vez al mes (1) Mensualmente (2) Semanalmente (3) A diario o casi a diario (4)
10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por tu consumode alcohol, o te han sugerido que dejes de beber?	No (0) Sí, pero no en el curso del último año (2)Sí, en el último año (4)

Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayornúmero de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante. En todo caso, para verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, esconveniente acudir al especialista.

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** B. Villa luz | **Fecha:** D: 19 M: 09 A: 2024 | **Hora:**

ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.
META DEL PRODUCTO PTS: Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Claudia Delgado	36518578	cc	3105462065	x		35	Ama d.c.				x	Villa luz						x							x			Claudia d.
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA | Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** B. Villa luz | **Fecha:** D: 19 M: 09 A: 2024 | **Hora:** 8:00 Am

ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.
META DEL PRODUCTO PTS: Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indigena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Maluz Rula	365737556		3216125151	x		51	A. de C				x	Villa luz						x									MALUIZ
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** B. U. Luz | **Fecha:** D: 19 M: 09 A: 2024 | **Hora:** 8:00 Am

ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.

META DEL PRODUCTO PTS: Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Karen Pallares	1094836781	cc	3113505931	x		21	Estudiante				x	B. U. Luz	x													x		Karen Pallares
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** B. Villa luz | **Fecha: D:** 19 **M:** 09 **A: 2024** | **Hora:** 8:00 Am

ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.
META DEL PRODUCTO PTS: Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Isle villa	36518401	CC	3111507421	x		36	A. de c.				x	Villa Luz	x												x		Isle Villa.
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** B. Villa luz | **Fecha:** D: 19, M: 09 A: 2024 | **Hora:** 8:00 Am

ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.
META DEL PRODUCTO PTS: Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1.	Genis Flores	45581523	CC	3217113608	X		31	Ama de casa				X	Villa luz	X												X		Genis Flores
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** B. Villa luz | **Fecha:** D: 19 M: 09 A: 2024 | **Hora:** 8:00 Am

ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.

META DEL PRODUCTO PTS: Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Gladys Sanchez	1063813526	cc	3137742469	x		31	A-dec.				o	Villa luz	x												x		gladissanchez
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** B. Villa luz | **Fecha:** D: 19 M: 09 A: 2024 | **Hora:** 8:06 Am

ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.
META DEL PRODUCTO PTS: Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN							TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Kathly Morales	1080572296	cc	3117047498	x		33	A de. C.				x	Villa Luz	x													x		Kathly M.
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** B. Villa luz | **Fecha: D: 19 M: 09 A: 2024** | **Hora:** 8:00 AM

ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.

META DEL PRODUCTO PTS: Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indigena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Maryelis Grisales	1063488599		3216614920	X		28	Ama d.c.				X	B. V. luz						X							X			Maryelis Grisales
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA | Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** B. Villa luz | **Fecha: D:** 19 **M:** 09 **A: 2024** | **Hora:** 8:00 Am

ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.
META DEL PRODUCTO PTS: Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Francelina Martinez	39017319	cc	3135290835	x		32	Ama de c.				x	B Villa luz						x							x			Francelina
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA | Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** Villa luz | **Fecha: D: 20 M: 09 A: 2024** | **Hora:** 8:00 Am

ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.
META DEL PRODUCTO PTS: Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Ivan Fernando Grisales	1085042898	cc	3126102276		x	30	A. de c.				x	Villa luz	x							x						x		Ivan Grisales
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA | Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** B. Villa luz | **Fecha:** D: 20 M: 09 A: 2024 | **Hora:** 8:00 Am

ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.
META DEL PRODUCTO PTS: Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Genesis Blanca	25858841		3177263400	x		27	A. de casa				a	Villa luz	x							x						x		Genesis
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** B. Villa luz | **Fecha: D:** 20 **M:** 09 **A:** 2024 | **Hora:** 8:00 AM

ACTIVIDAD: Realizar 200 visitas casa a casa, donde se eduque a las familias en temas como: Prevención del consumo excesivo de alcohol, alteraciones mentales por su consumo, y aplicación del test AUDIT, para la Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, con intervención breve y seguimiento para la detección con sospecha de patrones de consumo, activando rutas de atención, según grupo de riesgo a personas mayores de 18 años.
META DEL PRODUCTO PTS: Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Jorge Bonilla	12565047	CC	3137193609		X	76	Comerciante				X	Villa luz	X							X						X		
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													