GUÍA

AVES DE RIONEGRO ANTIOQUIA



EL HOMBRE POR NATURALEZA
Cornare
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE

Rionegro

RIONEGRO
CUADO
DE ARMA
SANTIAGO

Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

JORGE HUMBERTO RIVAS URREA
Alcalde de Rionegro

DIEGO LÓPEZ ECHEVERRI
Secretario de Hábitat de Rionegro

CINDY JOHANA GÓMEZ ARBELÁEZ
Subsecretaria Ambiental de Rionegro

JAVIER VALENCIA GONZÁLEZ
Director General de Cornare

DAVID ECHEVERRI LÓPEZ
Jefe Oficina de Gestión de la Biodiversidad, Áreas Protegidas y Servicios Ecosistémicos de Cornare

JOSE DAVID RESTREPO GARCÍA
Biólogo e investigador

LUISA FERNANDA VALENCIA HOLGUÍN
Diseño y diagramación

Segunda edición

Copyright © **2024**

AGRADECIMIENTOS

Nos gustaría expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las personas y organizaciones que contribuyeron de diversas maneras a la creación de esta guía. Esta herramienta se convierte en un recurso invaluable que nos permite conocer la riqueza de la avifauna del municipio de Rionegro, además de contribuir al fortalecimiento del sentido de pertenencia, tanto de los residentes locales como de los visitantes extranjeros, hacia este preciado patrimonio natural.

Agradecimiento especial al doctor Rodrigo Hernández Alzate, alcalde durante el período 2020-2023, por su apoyo fundamental que hizo posible la realización de esta guía. A través de la Secretaría de Hábitat, dirigida por John Dairon Jaramillo Arroyave y la Subsecretaría Ambiental, liderada por Erika Bianney Montoya Castaño, junto con todo su equipo de trabajo.


Al exdirector general de Cornare, el doctor Javier Parra Bedoya quien durante su gestión promovió el desarrollo de la presente guía, y quien le apostó de forma constante a la protección de nuestros recursos naturales.

A la comunidad en general, especialmente a Néstor Armando Monsalve Betancur, Mario Santa, Diomedes Pérez Arbeláez, Jerson Marín, Luis Miguel Tabares, Luis Fernando Ceballos, quienes de forma desinteresada aportan registros fotográficos e información científica de vital importancia para el monitoreo y la conservación de las especies.

A la sociedad antioqueña de ornitología SAO, a la corporación Ecoguardianes y al colectivo Montano - Aviturismo y conservación, quienes lideran procesos comunitarios en pro de la conservación y el desarrollo sostenible del municipio.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

5 Presentación
6 Justificación
7 Metodología
11 Aves acuáticas
20 Aves arbóreas
44 Aves boscosas
57 Aves migratorias



PRESENTACIÓN

Las aves son indicadores de la riqueza biológica y de las condiciones ambientales de nuestro entorno, su variedad de colores, formas, tamaños, comportamiento y formas de vuelo son fácilmente observables y les confieren una gran belleza y singularidad.

Rionegro es una ciudad ubicada en el valle de San Nicolás aproximadamente a 2.100 m s.n.m., dentro de la cordillera central de Los Andes Colombianos, está atravesada por el río Negro el cual en su recorrido deja una serie de humedales y diversidad de bosques y áreas con fuerte densidad de cobertura arbórea que albergan gran cantidad de especies de flora y fauna, lo que los convierte en áreas de importancia ecológica para ser tenidas en cuenta dentro de los planes de manejo de las administraciones públicas e instituciones llamadas a su conservación.



La presente guía de aves ha sido realizada con un doble objetivo: proporcionar un material adecuado que permita conocer las aves de nuestro entorno como paso previo para valorarlas, respetarlas y conservarlas, aprovechar nuestra riqueza ornitológica y para atraer la creciente demanda turística que realiza actividades vinculadas con el medio ambiente y el avistamiento de aves.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo sostenible de una región se fundamenta en la protección y conservación de sus recursos naturales ya que estos son la base para la seguridad alimentaria y el bienestar social de todos sus habitantes. El crecimiento poblacional acelerado es motivo de preocupación dentro de los diferentes gobiernos del mundo debido a que los recursos naturales de los cuales dependen son cada vez menos, provocando la reducción y fragmentación de la vegetación nativa y modificando las comunidades de fauna residentes y migratorias (Marzluff & Ewing 2001, Alberti et al. 2003). La investigación en ecosistemas urbanos para su conservación y restauración se hace cada vez más urgente ante el crecimiento acelerado de las poblaciones humanas (Vitousek et al. 1997, Niemelä 1999, Marzluff & Ewing 2001, Miller & Hobbs 2001). Para esto resulta imprescindible evaluar el estado actual de la fauna y flora presente en la región y cómo los cambios ambientales pueden afectar su condición futura (MacNally & Fleishman 2004), de manera que programas de monitoreo proporcionen lineamientos para la planificación urbana (Niemelä 2000). Los planes de manejo recomendados para este tipo de áreas naturales incluyen a las aves como una buena elección para el monitoreo porque pueden ser censadas a grandes escalas, su ocurrencia y abundancia está influenciada por las características del hábitat que les rodea, son fáciles de ver y tienen atractivo con el público (Carignan & Villard 2002, Gregory 2006). El uso de especies de aves como indicadoras se realiza bajo el supuesto de que las respuestas de especies individuales pueden ser representativas ante complejos ecosistemas y comunidades (MacNally & Fleishman 2004, Fleishman et al. 2005). A pesar de que Colombia es el país más rico en especies de aves no se conoce mucho sobre la mayoría de ellas, una de las razones por las cuales se priorizan estudios en áreas urbanas de crecimiento acelerado. Esto y el aumento del interés del público en general sobre el gusto que da la observación de aves ha generado que las regiones conozcan su riqueza en aves y así fomentar la conservación y el ecoturismo.



METODOLOGÍA

ÁREAS MONITOREADAS

Los estudios se llevaron a cabo en las áreas de importancia ecológica del municipio de Rionegro resaltando los humedales asociados a las áreas de inundación del río Negro: Amalita, Llanito, Lotus y Zona E; áreas arbóreas urbanas: Lago Santander, Senderos del barrio El Porvenir y sector Puente Gilberto Mejía; áreas con fuerte densidad de cobertura vegetal: Cerro El Capiro, Vereda Yarumal, Vereda El Tablazo y DRMI La Selva.

REGISTRO DE AVES

La observación de aves se realizó en las horas de la mañana en el alba y de la tarde en el ocaso por razones de comportamiento y adaptación de las especies. Se realizaron salidas de campo identificando puntos de observación. Con ropa apropiada y sin hacer mucho ruido se dispuso de 15 minutos por punto para observar y tratar de registrar con cámaras fotográficas, binoculares, grabadoras de sonido, etc, el mayor número de especies posible. Con la información obtenida y basados en la bibliografía disponible se clasificaron por especies y se agruparon según sus características biológicas y su grado de vulnerabilidad.

HERRAMIENTAS

Libretas de campo para anotar datos de interés como forma, color, tamaño, hábitat donde se registra y observaciones relevantes. Cámaras fotográficas, binoculares y guías de campo.

PARA ENTENDER LA GUÍA

CLASIFICACIÓN

Para la clasificación de las fichas informativas de cada especie de ave se tuvo en cuenta el hábitat natural y el comportamiento de cada una de las especies de aves que habitan nuestro municipio, por eso quedaron clasificadas de la siguiente manera:

Aves acuáticas

Son aquellas especies de aves que su hábitat está limitado fundamentalmente a zonas húmedas y con presencia de agua, ya que su dieta y su forma de vida depende en gran medida de lo que los afluentes de agua les ofrecen. Estas especies de aves están adaptadas físicamente de una forma extraordinaria que les permite nadar, zambullirse y bucear en busca de su alimento.

Aves arbóreas

Especies de aves que pasan la mayor parte del tiempo haciendo sus actividades como alimentación, reproducción, descanso, en las alturas de los árboles en áreas urbanas y rurales de nuestro municipio, que se han adaptado para sobrellevar la presión antrópica, se han acostumbrado a la presencia humana y que incluso, aprovechan los recursos que éstos producen.

Aves boscosas

En esta sección quisimos agrupar las especies de aves que quizás son de mayor preocupación para la conservación, ya que limitan su distribución a áreas alejadas de la presión antrópica, lejos de potreros, cultivos y zonas habitadas por el ser humano; prefieren hábitats con gran densidad y cobertura arbórea, tienen comportamientos poco adaptables a la presencia humana, por lo cual su vida depende en gran medida de las acciones de conservación forestal.

Aves migratorias

Son especies de aves que han desarrollado sorprendentes adaptaciones que les permiten recorrer grandes distancias y utilizar distintos hábitats a lo largo del ciclo anual. Estas aves realizan migraciones desde Norteamérica hacía los Neotrópicos de forma innata y cíclica en temporadas fijas del año para buscar alimento, refugio y descanso en respuesta al clima frío y escasez de alimento durante el invierno. Las especies migratorias conectan países, personas e incluso continentes a través de sus rutas de migración, razón por la que se les ha denominado centinelas del cambio ambiental global.

Esta guía fue diseñada para entregar información sobre las especies de aves que habitan nuestro municipio y sobre aquellas que nos visitan en épocas de migración.

Esta guía contiene información gráfica y escrita sobre las 162 especies que hasta el día de hoy se tienen registradas en nuestro municipio, gracias al trabajo de entidades cuyo objetivo se basa en el cuidado de la biodiversidad y la conservación del río Negro y sus recursos naturales por medio de estrategias de investigación, educación ambiental y monitoreo de los bioindicadores de estado, entre ellos las aves.



ICONOGRAFÍA

CATEGORÍA IUCN

Abreviatura que hace referencia a las categorías de la IUCN- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: la fuente de información más exhaustiva del mundo sobre el estado global de conservación de especies.

- LC — Preocupación menor
- NT — Casi amenazada
- VU — Vulnerable
- EN — En peligro
- CR — Peligro crítico

ENDEMISMO

Las especies endémicas son las que limitan su distribución dentro de los límites políticos de un país. Casi endémica se refiere a las especies que el 50+% de la población actual se encuentra dentro de los límites políticos de un país.

- E — Endémica
- CE — Casi endémica

AVISTAMIENTO

Nivel de dificultad que puede tener el avistamiento de una especie dentro de su entorno natural.

- Común
- Poco común
- Escasa

ESTACIONALIDAD

Condición de residencia o migración de las especies que se observan en el municipio de Rionegro, Antioquia.

- **Residente** — Habita, se reproduce y permanece en el mismo lugar todo el año.
- **Migratoria boreal** — Anida en el hemisferio sur y que en invierno migra hacia el norte.
- **Migratoria austral** — Anida en el hemisferio norte y que en invierno migra hacia el sur.

HÁBITOS

Ciclos horarios en los que el comportamiento de una especie son más activos.

- Diurno
- Nocturno

- Macho
- Hembra

GREMIO TRÓFICO

Tipo de alimentación que constituye el mayor porcentaje de la dieta de cada especie.

Granívoro · Nectarívoro · Carnívoro · Piscívoro · Carroñero · Frugívero · Insectívoro · Omnívoro

INFORMACIÓN POR ESPECIE



ACUÁTICAS RESIDENTES




Garcita rayada / Striated Heron
Butorides striata

Es una garza con característico plumaje estriado en su pecho, es generalmente activa y confiada, permanece inmóvil o acecha con movimientos lentos al borde de la vegetación mientras se alimenta, se ha registrado utilizando carnada para obtener sus presas lo que resalta su inteligencia.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Está en toda América del Sur. En Colombia se puede ver hasta 2.600 m s.n.m., en todo el territorio, menos en las partes altas de las cordilleras y en el Cabo de la Vela.	Humedales, pantanos y vegetación acuática emergente en bordes de lagunas y ríos .







Garza azul / Little Blue Heron
Egretta caerulea

Forrajea con movimientos lentos en humedales y riberas del río Negro, camina con lentitud en aguas poco profundas o se mantiene quieta esperando a que se acerque alguna presa. Los adultos son de color azul grisáceo, la cabeza y el cuello de color morado. Los inmaduros son blancos en su primer año y a medida que van madurando presentan manchas azul grisáceo.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el centro de América del Norte hasta el centro de América del Sur. En Colombia se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2.300 metros de elevación.	Pantanos, ciénagas, campos de arroz, lagunas y costas, puede ser agua dulce, salobre o salada.

Garza Patiamarilla / Snowy Egret
Egretta thula

Es una garceta elegante y pequeña, con patas características negras y amarillas que asemejan un guante puesto. Tiene comportamientos alimentarios muy activos en aguas de poca profundidad donde se le ve revolviendo los sedimentos del fondo del agua con las patas para asustar a las presas y hacer que se muevan.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Nativa de América, en Colombia se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2.000 m s.n.m., Ocasionalmente reportada a 4.100 m de altitud.	Pantanos, ciénagas, lagunas y orillas. Se encuentra muchos tipos de hábitats acuáticos lo que incluye aguas dulces y saladas.



Garza blanca / Great egrets
Ardea alba

Es un ave grande y elegante que se puede observar dentro de los humedales y riberas del río Negro mientras permanece inmóvil a la espera de peces que naden cerca para atraparlos con un movimiento rápido del pico. Generalmente permanece sola, sin embargo se congrega en las horas de descanso.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se encuentra en casi todo el planeta en zonas templadas y tropicales, En Colombia se encuentra hasta los 2.600 m s.n.m.	Ecosistemas de humedales en el interior y en la costa, pantanos, llanos inundables, junto a ríos, lagos, estanques de piscicultura.



Garzón azul / Cocoi heron
Ardea cocoi

Es la garza más grande y esbelta de todas las garzas en Colombia, es muy esquiva y arisca, se retira de inmediato cuando percibe movimientos cerca. Suele buscar alimento al quedarse quieta o caminar con lentitud en aguas poco profundas. Permanece siempre sola o con su compañera, con la que forma pareja para toda la vida.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Habita en la mayor parte de la América del Sur, en Colombia se encuentra en altitudes por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.	Pantanos, ciénagas, costas y llanuras húmedas formadas por la marea. Es muy adaptable y busca alimento en cualquier tipo de curso de agua dulce.

Garcita bueyera / Cattle egret
Bubulcus ibis

Conocida como garcita bueyera por su cercanía a las vacas y bueyes que se encuentran en potreros y áreas abiertas cercanas a humedales y riberas del río Negro, su plumaje es totalmente blanco, pero en la época de reproducción aparecen plumas de color beige o canela en la corona y espalda.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Ampliamente distribuida en todo el mundo; En Colombia se encuentra hasta los 2.600 m s.n.m, en los Andes hasta Caquetá y Vaupés.	Granjas, pantanos, campos inundados y bordes de autopistas, a menudo cerca de rebaños de ganado.

Rascón negruzco / Blackish rail
Pardirallus nigricans

Especie de ave muy especial debido a su apariencia y canto particular, no vuela muy bien y se desplaza con grandes saltos entre los matorrales de humedales y riberas del río Negro, aunque vive en la vegetación densa se puede observar saliendo a campo abierto.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se puede encontrar en una pequeña parte de América del Sur. En Colombia está entre los 800 y 2.200 m de altura.	Pantanos, ciénagas, riberas de ríos cubiertos de malezas acuáticas, pastizales altos y húmedos.



Guaco común / Black-crowned Night-Heron
Nycticorax nycticorax

Es una de las pocas especies de aves nocturnas posible de ser observada en horas del día, ya que suelen sentarse encorvadas y sin moverse en los árboles cerca del agua. Se vuelven más activas al anochecer, cuando vuelan hacia los sitios donde se alimentan y emiten su sonido característico al atravesar la oscuridad por lo alto.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Habita en gran parte del mundo. En Colombia está en todo el país hasta los 2.200 metros de altura sobre nivel del mar.	Costas de lagos, lagunas y ríos, tanto en bosque húmedo como en estepa. Prefiere costas con vegetación densa.

Cormorán Neotropical / Neotropical Cormorant
Nannopterum brasilianus

Especie de ave que se ha establecido e desde la superficie y nadar bajo el agua, impulsándose principalmente con las patas de una forma extraordinaria.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
A lo largo de los trópicos y subtrópicos americanos, en Colombia se encuentra en todo el país desde el nivel del mar hasta 2.600 m de altura.	Ambientes marinos. También se le encuentra en humedales, incluyendo ríos, embalses, pantanos y lagunas altoandinas.

Polla negra / Common gallinule
Gallinula galeata



Es de las pollas de agua más comunes de observar dentro de los humedales asociados al río Negro, se le observa generalmente nadando a lo largo del agua mientras busca alimento, puede sumergir la cabeza bajo el agua o girar el cuerpo con la cola hacia arriba y la cabeza hacia abajo.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Gran parte de América del Norte y América del Sur, en Colombia se encuentra hasta las 2.600 m s.n.m.	Humedales, vegetación en la ribera de los ríos y cañaverales, pantanos abiertos de agua dulce con cubierta vegetal densa.






Polla azul / Purple gallinule
Porphyrio martinicus

Es común observarla dentro de los humedales asociados al río Negro. Sus dedos largos le permiten caminar sobre la vegetación acuática sin hundirse. Polluelos de color negro y los juveniles de color castaño.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el centro de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. En Colombia se encuentra hasta los 2.600 m s.n.m.	Pantanos de agua dulce, ciénagas, estanques, humedales extensos con gran densidad de plantas acuáticas.

Coquito / Bare-faced Ibis
Phimosus infuscatus



Es una especie de ave principalmente playera, que ha venido expandiendo su rango de distribución llegando a la ciudad de Rionegro en los últimos años, donde ya es factible de ser observada en humedales y riberas del río Negro utilizando su pico curvo para escarbar en la tierra húmeda y el agua y agarrar su alimento.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Colombia y Venezuela hasta el norte de Argentina y Uruguay. Hasta 2.600 m de altitud en Colombia.	Pantanos, arbustos y árboles próximos al agua, principalmente en depósitos de agua dulce, salobre y salada.




Pisingo / Black-bellied Whistling-Duck
Dendrocygna autumnalis



Pato silvestre que habita los humedales asociados al río Negro, se agrupa con sus parientes cercanos la Iguasa maría y la Iguasa careta y son relativamente ruidosos. Busca alimento principalmente en el suelo y puede alimentarse de día o de noche.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Ampliamente distribuida en América del Norte y América del Sur, en Colombia se encuentra hasta los 2.400 m s.n.m.	Lagunas y pantanos de agua dulce, campos inundados, y ocasionalmente en aguas salobres y manglares.



Iguasa careta / White-faced Whistling-Duck
Dendrocygna viduata

Pato silvestre con silbido particular por lo que es conocido como el pato silbador, activo durante las horas crepusculares. Su cabeza de color blanco contrasta con el plumaje oscuro. Al igual que todas las dendrocygnas es muy sociable y le gusta vivir en grupo. Se le avista en humedales observando lo que pasa a su alrededor desde lo alto de cualquier montículo.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Ampliamente distribuido en Suramérica y África. En Colombia se encuentra hasta los 2.400 metros sobre nivel del mar.	Lagunas, lagos, ciénagas, campos cubiertos de agua y ríos. Busca lugares con pastos altos y orillas de poca profundidad.



Iguasa maría / Fulvous Whistling-Duck
Dendrocygna bicolor

Especie de pato silvestre que habita los humedales y riberas del río Negro, al igual que otros miembros del género Dendrocygna emite una llamada ruidosa en vuelo o en el suelo. Cuando se alimenta en el agua nada sobre la superficie, o levanta la punta de la cola y sumerge la cabeza y la parte delantera del cuerpo.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Todas las regiones tropicales del mundo: en gran parte de Centro y Sudamérica, en Colombia hasta las 2.300 m s.n.m.	Lagos poco profundos, arrozales y otros humedales con vegetación abundante.

Pato enmascarado / Masked Duck
Nomonyx dominicus



Es un llamativo pato buceador que busca su alimento sumergiéndose y nadando mientras se impulsa con sus patas. Es solitario y difícil de ser avistado ya que gasta la mayor parte del día durmiendo entre la vegetación acuática, su comportamiento más activo se evidencia durante la noche.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se distribuye entre América del Norte y América del Sur. En Colombia se distribuye hasta los 2.600 metros sobre el nivel del mar.	Humedales con vegetación, estanques y embalses con crecimiento extensivo de pantanos y en aguas abiertas.





Alcaraván / Southern Lapwing
Vanellus chilensis

Es un ave ruidosa y bastante territorial, posee unos espolones bajo sus alas con los que ataca cuando se siente amenazada, sobre todo cuando tiene polluelos. Es común de observar en las riberas y humedales del río Negro donde se agrupa en bandadas y alertan a otros animales sobre la presencia de intrusos.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Nativa de América del Sur donde es bastante común. En Colombia se distribuye por debajo de los 3.200 metros sobre el nivel del mar.	Gran variedad de hábitats abiertos, usualmente en pastizales cerca del agua.



Tiranuelo Saltarroyo / Torrent Tyrannulet
Serpophaga cinerea



Atrapamoscas acuático propio de las cordilleras de Los Andes, de particular tamaño pequeño y color grisáceo, a menudo puede ser observado moviendo la cola de arriba abajo perchado sobre rocas o ramas a lo largo del río Negro o de arroyos rápidos dentro de nuestro municipio.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Nativo de América Central y de regiones andinas del noroeste y oeste de América del Sur. En Colombia está entre los 800 y los 3.300 m s.n.m.	Torrentes rocosos, arroyos y ríos andinos, tanto en ambientes boscosos como semi-abiertos.



Atrapamoscas cuidapuentes / Black phoebe
Sayornis nigricans



Atrapamoscas acuático factible de ser observardo posado a baja altura cerca de afluentes de agua, moviendo la cola lentamente, para luego lanzarse en vuelo rápido y capturar insectos sobre la superficie del agua, sus nidos los construye con lodo que extrae de las riberas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se distribuye desde el oeste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Para el caso Colombia, desde 100 a 2.800 metros de altitud, en las tres cordilleras.	Cursos de agua cubiertos de sombra, como arroyos naturales, estanques, diques de irrigación o incluso bebederos





Golondrina blanquiazul / Blue-and-white Swallow
Pygochelidon cyanoleuca

Es una pequeña y compacta golondrina, generalmente oscura arriba y blanca abajo; vuela en bandadas dispersas que revolotean en el aire mientras atrapan insectos pequeños de forma bastante ágil y rápida. Es frecuente observarla volando e incluso perchada en cables o en ramas altas desnudas y expuestas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Costa Rica hasta Tierra del Fuego. En Colombia la subespecie residente se distribuye por debajo de los 2.500 metros de altitud.	Áreas abiertas urbanas y semi urbanas con presencia de cuerpos de agua.



Golondrina barranquera / Southern Rough-winged Swallow
Stelgidopteryx ruficollis



Golondrina de zonas cálidas, pero que ha ido ampliando su distribución hacía nuestro municipio. Se alimenta en vuelo sola o en grupos de pocos individuos, en áreas cerca de cuerpos de agua y cursos de ríos. Se le ha visto perchada en cables o en ramas altas desnudas y expuestas, con su figura erguida y estilizada.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Honduras hasta Uruguay y el norte de Argentina. En Colombia se encuentra entre 0 y 1500 m s.n.m., en todo el país, ocasionalmente a mayor altura.	Áreas abiertas urbanas y semi urbanas con presencia de cuerpos de agua.



Martín pescador grande / Ringed Kingfisher
Megaceryle Torquata



Martín pescador que se ha visto en las riberas de cursos de agua del municipio, busca su alimento principalmente posándose en ramas altas observando el agua. Cuando avista un pez u otra presa cerca de la superficie, se zambulle de cabeza, capturando el pez con el pico.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el sur de Texas hasta Tierra del Fuego, en Colombia se encuentra en altitudes que rondan los 2.000 metros.	Ríos, grandes arroyos, estanques, áreas donde árboles altos y malezas bordean el río.





Martín pescador verde / Green Kingfisher
Chloroceryle americana

Martín pescador con apariencia desproporcional, se ha visto en las riberas de cursos de agua del municipio posado en ramas bajas por encima del agua, a veces se coloca en una roca en medio de la corriente, a la espera de peces pequeños que naden cerca de la superficie.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el suroeste de Estados Unidos, hasta el norte de Chile y Argentina. El Colombia se encuentra en altitudes entre 0 y 2.100 metros de altitud.	Ríos, grandes arroyos, estanques, áreas donde árboles altos y malezas bordean el río.



ARBÓREAS RESIDENTES



Tortolita / Ruddy Ground Dove
Columbina talpacoti



Tortolita pequeña y rojiza, es una especie monógama con un fuerte vínculo de pareja: cuando están posadas suelen reposar una al lado de la otra, y frecuentemente se les observa acicalándose mutuamente. Presenta una alta adaptabilidad a los hábitats alterados por el ser humano.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Centroamérica y Sudamérica hasta el norte de Argentina. En Colombia se encuentra desde los 500 hasta los 3.500 de altitud.	Campos abiertos, zonas húmedas, jardines urbanos, zonas arbustivas.



Paloma collareja / Band-tailed Pigeon
Patagioenas fasciata

Su nombre se debe a que en la nuca, justo en la base de la cabeza, presenta una banda muy bien definida en forma de collar de color blanco. Principalmente se encuentra en zonas conservadas y con poca presión antrópica, se forman en grandes bandadas entre los bosques y áreas rurales.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Norteamérica hasta el norte de Nicaragua,Costa Rica, Panamá y los Andes. En Colombia se encuentra en altitudes de 900 a 3.600 m.	Regiones boscosas prístinas, lejos de toda actividad antrópica.

Torcaza / Eared Dove
Zenaida auriculata



Es más grande y esbelta que la *Columbina Talpacoti,* presenta una visible línea auricular negra. En el cuello se puede observar una mancha iridiscente color vino. Son altamente tolerantes a la intervención humana encontrándose en una amplia variedad de ambientes como jardines, potreros, humedales, matorrales y se adaptan fácilmente en áreas urbanas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Centroamérica y Sudamérica hasta el norte de Argentina. En Colombia se encuentra desde los 500 hasta los 3.500 metros de altitud.	Campos abiertos, zonas húmedas, jardines urbanos, zonas arbustivas.

Amazilia colirrufa / Rufous-tailed Hummingbird
Amazilia tzacatl



Es un colibrí bastante territorial que puede verse con facilidad en jardines, suele establecer un área de alimentación relativamente amplia. Puede crear rutas de forrajeo a nivel local, visitando periódicamente plantas florecidas y eligiendo ramas cercanas para descansar.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Ampliamente distribuida en el continente americano, desde el sur de Ecuador hasta el centro de México. En Colombia va hasta los 2.500 metros de elevación.	Bosques, bordes, áreas abiertas, matorrales, jardines y zonas intervenidas por el ser humano, llegando a ser común en parques urbanos de ciudades.





Rumbito mulsant / White-bellied Woodstar
Chaetocercus mulsant

Es un colibrí pequeño que vuela parecido a un abejorro, presenta diformismo sexual: los machos presentan una marcada coloración púrpura en la barbilla mientras que las hembras tienen la garganta blanca, línea blanca del ojo y flancos beige intenso. Suele visitar jardines florecidos y comederos en áreas conservadas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Dispersa irregularmente en el centro y el este de los Andes de Colombia a Ecuador y Perú. Presente en altitudes entre los 1.500 a 3.300 m s.n.m.	Bordes de bosque, matorrales abiertos, zonas de cultivo y jardines.



Esmeralda occidental / Western Emerald
Chlorostilbon melanorhynchus



Colibrí pequeño que lleva su nombre por el color verde esmeralda que tiene en su plumaje, siendo las hembras con gris pálido abajo, con la mejilla oscura y una línea blanca detrás del ojo. Se ha visto individualmente alimentándose en jardines o bordes del municipio asociados a áreas boscosas y conservadas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se encuentra en Colombia y Ecuador, generalmente entre 600 y 800 metros de altitud, pero localmente, más alto en los valles andinos.	Bordes de bosque, matorrales abiertos, zonas de cultivo y jardines.



Colibrí chillón / Sparkling Violetear
Colibri coruscans



Colibrí grande y territorial que generalmente domina comederos o parches de flores, posee un plumaje de colores vivos que van desde el verde brillante hasta el azul violeta. Su nombre se debe a los particulares ruidos que emite al cantar. Busca su alimento en las partes altas de la vegetación, en árboles con variedad de flores.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se distribuye por buena parte del oeste y el norte de América del Sur. En Colombia se encuentra en altitudes entre 400–4.500 m s.n.m.	Bosques, áreas abiertas, matorrales, jardines y zonas intervenidas por el ser humano, llegando a ser común en parques urbanos de ciudades.



Amazilia verdiazul / Steely-vented Hummingbird
Saucerottia saucerrottei



Tanto el macho como la hembra son agresivos y territoriales, frecuentemente se ven entre arbustos de jardines florecidos en el municipio, sobre todo en aquellos que tienen heliconias, generalmente son solitarios aunque se les ve a veces tomando baños en grupos pequeños, incluso con otras especies.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Occidente de Nicaragua, Costa Rica, el noroccidente de Ecuador y Venezuela, en Colombia hasta los 2.300 m de altitud.	Matorrales y arbustos de áreas secas, bordes de los bosques, cultivos y jardines,



Colibrí Verdemar / Lesser Violetear
Colibri cyanotus



Es un llamativo colibrí color verde brillante con mechones violetas vistosos en el área de las mejillas y orejas. Igual que la mayoría de colibrís es territorial, sin embargo suele ser desplazado por otros colibrís más grandes y agresivos. Acostumbra visitar jardines florecidos cercanos a áreas muy conservadas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el sur de México hasta Honduras, tierras altas de Costa Rica y el oeste de Panamá. En Colombia se encuentra en altitudes entre 400 - 2.300 m s.n.m	Matorrales y árboles esparcidos, incluyendo potreros, setos vivos y áreas de crecimiento secundario



Mielerito / Bananaquit
Coereba Flaveola



Es un ave activa que suele verse en jardines y bordes del municipio hurgando las flores pequeñas y perforando la base de las corolas tubulares en busca de néctar, anda sola o en parejas, ocasionalmente puede juntarse a bandadas mixtas, pero la mayor parte del tiempo se le ve sola.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el sureste de México hasta el norte de Argentina. En Colombia desde el nivel del mar hasta 1.500 m, se ha registrado hasta 2.400 m, pero más escasa.	Bordes de bosque, áreas abiertas, matorrales, manglares, zonas arboladas y áreas antrópicas como jardines.



Picaflor canela / Rusty Flowerpiercer
Diglossa sittoides

Es un picaflor pequeño, el macho es distintivo: gris oscuro arriba y beige-rojizo abajo sin marcas contrastantes en las alas. Igual que todos los pinchaflores tiene el pico levantado y con un gancho en la punta. Es un ave solitaria y ocasionalmente en parejas, no se une a bandadas mixtas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Colombia habita principalmente en altitudes entre 1.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar.	Áreas arbustivas bastante abiertas, arboledas y jardines

Sabanero coludo / Wedge-tailed Grass-Finch
Emberizoides herbicola



Es un ave con un comportamiento abiertamente territorial, el macho se mantiene con su pareja, rechazando que cualquier otro macho se acerque a su territorio. Es un ave principalmente de tierras bajas, sin embargo, los últimos años se ha registrado su distribución en nuestro municipio.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se distribuye de forma disjunta en América del Sur y América del Norte. En Colombia se ve en alturas que no superen los 1.900 metros sobre nivel del mar.	Pastizales altos, matorrales áreas abiertas.

Toche enjalmado / Flame-rumped Tanager
Ramphocelus flammigerus

Es una tangara bastante grande y activa que presenta dimorfismo sexual muy marcado. Generalmente anda en parejas o grupos de pocos individuos forrajeando en diferentes niveles de la vegetación. Suele visitar comederos de plátano en las viviendas rurales de nuestro municipio.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el norte de Perú hasta el sur de Costa Rica. En Colombia puede encontrarse por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar.	Matorrales tropicales secos, crecimientos secundarios densos, sabanas semi-abiertas, bordes de manglares y bosques ligeros.



Saltator olivaceo / Olive-gray Saltator
Saltator olivascens

Muy similar al *Saltator striatipectus*, pero este carece del color oliva encima y las marcadas estrías en sus partes inferiores. Posee buena tolerancia a la presión antrópica, pudiendo ser encontrado en ambientes alterados por el hombre, como plantaciones de café o cacao, jardines y parques urbanos.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Es nativo del norte de América del Sur y Trinidad y Tobago. En Colombia se distribuye hasta alturas de 2.300 metros sobre nivel del mar.	Matorrales tropicales secos, crecimientos secundarios densos, sabanas semi-abiertas, bordes de manglares y bosques ligeros.

Saltator rayado / Streaked Saltator
Saltator striatipectus

Muy similar al *Saltator olivascens*, sin embargo este posee un color oliva arriba y pálido abajo con una cantidad variable de rayas oscuras en las partes inferiores. Principalmente es una especie de ave de tierras bajas, pero se ha evidenciado su distribución hacia nuestro municipio en los últimos años.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se distribuye de forma disjunta en América del Sur y América del Norte. En Colombia se encuentra en todas las altitudes hasta 2.100 m s.n.m.	Matorrales secos, claros arbustivos, bosques ligeros y jardines.

Canario criollo / Saffron Finch
Sicalis flaveola



Es un pequeño canario generalmente sociable, es común verlo en parejas o en grupos pequeños alimentándose en el suelo. El macho es amarillo brillante saturado de anaranjado en la frente y las hembras son más opacas. Suelen visitar comederos y cebaderos en jardines de zonas rurales y urbanas del municipio.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
En todo Suramérica hasta el centro de Argentina y sureste de Brasil, excepto en Chile. En Colombia se encuentra hasta los 2.300 m s.n.m.	Bordes de monte, sabanas arboladas y sabanas secas, matorrales, áreas abiertas con árboles dispersos, jardines, plantaciones y zonas urbanas.



Espiguero gris / Gray Seedeater
Sporophila intermedia

Espiguero que frecuenta los arbustos y chamizos del municipio, a menudo acompañado de otras especies de semilleros. El macho es gris con vientre blanco, con un parche blanco pequeño en la base de primarias y pico grueso rosado pálido con el culmen curvado, la hembra es muy igual a las demás de los espigueros.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se extiende por el norte de Brasil, Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago. En Colombia se encuentra en todas las altitudes hasta 2.600 m s.n.m.	Campos de maleza arbustiva, matorrales abiertos, bordes de campos, zonas de pradera pastizales, claros arbustivos y campos cultivados.

Espiguero negriblanco / Black-and-white Seedeater
Sporophila luctuosa



Es un espiguero con un precioso canto, el macho es totalmente negro arriba con un parche blanco en la base de sus alas y vientre blanco, podría confundirse con el Espiguero capuchino, pero esa especie carece del parche del ala y el vientre es de color amarillo pálido. Las hembras de los espigueros son muy similares, busca los machos acompañantes para identificarlas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Centro y norte de América del Sur. En Colombia se encuentra hasta altitudes de 2.600 m s.n.m.	Campos de maleza arbustiva, matorrales abiertos, bordes de campos, zonas de pradera pastizales y campos cultivados.

Espiguero ladrillo / Ruddy-breasted Seedeater
Sporophila minuta

Es un ave pequeña que se puede ver entre los arbustos y chamizos del municipio, a menudo acompañada de otras especies de semilleros. Los machos son de color gris opaco en las partes dorsales, y color canela en las partes ventrales y la rabadilla, las hembras presentan mucha similitud con otras de su especie.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Por toda América Central, en el norte de Sudamérica hasta las Guayanas y en la isla de Trinidad. En Colombia se encuentra hasta altitudes de 2.600 m s.n.m.	Campos de maleza arbustiva, matorrales abiertos, bordes de campos, zonas de pradera pastizales, claros arbustivos y campos cultivados..



Espiguero capuchino / Yellow-bellied Seedeater
Sporophila nigricollis



Es un pequeño espiguero que frecuenta los arbustos y chamizos del municipio. El macho es bastante distintivo con el vientre amarillo, garganta y la cara oscuros, espalda oliva-marrón y pico pálido plateado. Las hembras de los espigueros son muy iguales entre ellas, por lo cual la mejor forma de identificarlas es con los machos que las acompañan.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Por toda América Central, en el norte de Sudamérica hasta las Guayanas y en la isla de Trinidad. En Colombia se encuentra hasta altitudes de 2.600 m s.n.m.	Campos de maleza arbustiva, matorrales abiertos, bordes de campos, zonas de pradera pastizales, claros arbustivos y campos cultivados.



Tangara real / Blue-necked Tanager
Stilpnia cyanicollis

Tangara se caracteriza por su llamativo color turquesa en la cabeza contrastando con su cuerpo de color negro. Suele visitar comederos y cebaderos con plátano en zonas conservadas y cerca a áreas boscosas de nuestro municipio, generalmente se agrupa en bandadas mixtas con otras especies de fruteros




DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Colombia hasta el Norte de Bolivia y Sur de Brasil. En Colombia se encuentra entre 900 y 2.400 m s.n.m, en las tres cordilleras de los Andes.	Pastizales y rastrojos, zonas abiertas con árboles y arbustos aislados y áreas residenciales



Tangara capirotada / Black-capped Tanager
Stilpnia heinei

Tangara pequeña y bastante activa vocalmente con plumajes de machos y hembras, notablemente diferentes. Por lo general, se encuentran en parejas y a menudo siguiendo una bandada de especies mixtas de otras tangaras mientras forrajean en el dosel en busca de alimento. Suele visitar comederos.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Andes de Ecuador, Colombia y Venezuela, en un rango altitudinal que va desde los 1.400 hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar.	Bordes de selvas húmedas montanas, clareras adyacentes, áreas abiertas y jardines cerca a zonas conservadas.



Tangara rastrojera / Scrub Tanager
Stilpnia vitriolina

Se destaca por su coronilla de color naranja encendido. Su nombre común se debe a que presenta gran afinidad por matorrales y rastrojos bajos, donde forrajea activamente en busca de alimento. Puede ser atraída fácilmente a comederos de plátano. Usualmente se ve en parejas o pequeñas bandadas con otras especies.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Únicamente en Colombia y Ecuador. En nuestro país se encuentra desde los 500 a los 2.200 m s.n.m.	Cafetales, jardines, zonas abiertas y bordes de bosque.

Azulejo / Blue-gray tanager
Thraupis episcopus

Muy activa y relativamente confiada. Se desplaza a lo largo de árboles y rastrojos en busca de frutos o bayas, también frecuenta cebaderos de plátano en jardines de zonas habitadas por humanos, bastante tolerante a la presión antrópica. Suele moverse en pareja o grupos.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se distribuye desde México hasta Bolivia. En Colombia puede encontrarse en todo el territorio nacional hasta los 2.600 m s.n.m.	Zonas abiertas, áreas urbanas, jardines, bordes de bosque y áreas de cultivo

Azulejo palmero / Palm Tanager
Thraupis palmarum



Son aves sociales, comen una gran variedad de frutos, frecuentan visitar en parejas o en grupos con otras especies los comedores y cebaderos con plátano en las áreas urbanas de nuestro municipio. Son de color mayormente gris pero en buena luz se observan las tonalidades verde oliva.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Nicaragua, Bolivia, Paraguay y el Suroeste del Brasil y Trinidad. Ampliamente distribuido en Colombia hasta los 2.600 m s.n.m., con excepción de La Guajira.	Bordes de bosques, potreros arbolados, centros poblados, con frecuencia en palmas y copas de árboles en el interior de selvas.





Semillero cariamarillo / Yellow-faced Grassquit
Tiaris Olivaceus

Es un ave pequeña que se puede ver entre los arbustos y chamizos del municipio. El macho es muy llamativo, con cejas y garganta amarillo brillante, contrastantes con el color negro de la cabeza y pecho, la hembra tiene un color oliva suave notorio, lo que contrasta menos con el mismo patrón facial del macho.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el Este de México y las Antillas Mayores hasta el noroeste de Venezuela. En Colombia se encuentra entre los 300 y 2.300 m s.n.m.	Campos de maleza arbustiva, matorrales abiertos, bordes de campos, zonas de pradera pastizales, claros arbustivos y campos cultivados.



Espiguero saltarín / Blue-black Grassquit
Volatinia jacarina



Es un ave pequeña que frecuenta los arbustos y chamizos del municipio. El macho es de color negro pero debido a la capacidad que posee en sus plumas de difractar la luz se pueden observar con colores verde o azul. Las hembras de espigueros son muy difíciles de identificar, es recomendable buscar los machos acompañantes para identificarlas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el este de México y las Antillas Mayores hasta el noroeste de Venezuela. En Colombia se encuentra entre los 300 y 2300 m s.n.m.	Campos de maleza arbustiva, matorrales abiertos, bordes de campos, zonas de pradera pastizales, claros arbustivos y campos cultivados.



Jilguero aliblanco / Lesser Goldfinch
Spinus psaltria

Es un pinzón pequeño que se ve buscando alimento de forma activa y acrobática en árboles, arbustos y hierbas, a veces en grupos o bandadas mixtas. Solo defiende el territorio cercano a su nido y presenta un comportamiento monógamo durante la temporada de reproducción.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Por todo Norteamérica, visitando Centroamérica y América del Sur o Sudamérica. En Colombia se distribuyen en alturas entre los 2.000 - 3.500 m.s.n.m.	Campos abiertos de malezas, bosques abiertos, arroyos arbolados y jardines.



Jilguero pechinegro / Yellow-bellied Siskin
Spinus xanthogastrus

Es un pinzón pequeño contrastantemente marcado, como la mayoría de los pequeños semilleros, permanece en reducidos grupos familiares o bandadas que a menudo forma con otros espigueros y semilleros que forrajean a niveles bajos de la vegetación. Las parejas son territoriales durante la reproducción.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
De Costa Rica a Ecuador, Bolivia central y las tierras altas de Venezuela. En Colombia en las laderas este de los Andes norte de 800–3.000 m s.n.m.	Campos abiertos de malezas, bosques abiertos, arroyos y pastizales arbolados.

Copetón / Rufous-collared sparrow
Zonotrichia capensis

Es una especie de ave amistosa y bien conocida. Anda por el suelo sola o en parejas entre los jardines y áreas abiertas de nuestro municipio. Éstas aves son víctimas de parasitismo de otras especies como los chamones, los individuos solitarios pueden viajar en bandadas mientras que las parejas defienden su territorio.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el Sur de México hasta Tierra del Fuego. En Colombia se puede ver desde los 1.000 hasta 3.700 m s.n.m., en todo el país, incluyendo páramos y sierras.	Áreas urbanas y suburbanas, campos rurales, jardines, campos agrícolas y áreas de crecimiento secundario con matorrales.

Pibí tropical norteño / Northern Tropical Pewee
Contopus bogotensis



Es un atrapamoscas pequeño, tradicionalmente fue tratada como una subespecie del pibí tropical, pero fue separada como especie plena con base en diferencias de plumaje y vocalización. Suele percharse en una rama expuesta para tirarse hacía los insectos que pasan, y regresar a la misma rama.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Nicaragua, Bolivia, Paraguay y el suroeste del Brasil y Trinidad Ampliamente distribuido en Colombia hasta los 2.600 m s.n.m., con excepción de La Guajira.	Bordes de bosques, potreros arbolados, centros poblados, con frecuencia en palmas y copas de árboles en el interior de selvas.



Elenia copetona / Yellow-bellied Elaenia
Elaenia flavogaster

Es un atrapamoscas con una particular cresta en la parte superior de su cabeza. Suele divisar insectos desde un punto de apoyo, para después atraparlos durante el vuelo, y a veces los toma directamente de las plantas. Se mantiene en parejas durante todo el año; nunca forma bandadas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Ampliamente distribuida desde México a la casi totalidad de América del Sur. En Colombia se distribuye hasta los 2.100 metros de altitud.	Áreas de crecimiento secundario con matorral, jardines, cultivos y otras áreas abiertas con árboles esparcidos, generalmente en los niveles medios.

Sirirí bueyero / Cattle Tyrant
Machetornis rixosa



Usualmente forrajea en parejas o pequeños grupos sobre el suelo, donde corren rápidamente con una postura vertical en busca de insectos terrestres. Como su nombre lo indica, muchas veces se posa sobre el ganado para alimentarse de sus parásitos en un ejemplar caso de mutualismo.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Norte de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay , Venezuela y Colombia donde se distribuye hasta los 2.000 m s.n.m.	Sabanas, pastizales, bosque seco, regiones agrícolas y zonas residenciales abiertas.

Atrapamoscas pechirrayado / Bran-colored Flycatcher
Myiophobus fasciatus



Mosquero pequeño y marrón, se distingue fácilmente por su pecho rayado y sus barras alares contrastantes. Son aves solitarias y esquivas, en ocasiones difíciles de observar debido a que se mueven rápidamente en el suelo en busca de su alimento. La hembra es visiblemete menos rayada en partes inferiores.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el sur de Texas hasta el centro de Argentina y Trinidad. En Colombia se encuentra entre 0 y 2.600 m s.n.m en todo el país.	Bordes de bosques, parques, zonas residenciales, bosques abiertos, a lo largo de ríos, en sabanas, claros, áreas cultivadas y zonas pantanosas.





Bichofué / Great Kiskadee
Pitangus sulphuratus

Es un atrapamoscas con un comportamiento territorial, llegando a desplazar a otras especies para proteger sus recursos. Se le ve perchado en una rama o cable alto y expuesto, donde vocaliza reiteradamente. Se le ve en parejas o en grupos pequeños visitando comederos en zonas residenciales del municipio.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el sur de Centroamérica y por Sudamérica. Localmente hasta los 2.700 m s.n.m., en los valles andinos.	Hábitats abiertos, como bordes de pastizales o bosques secundarios



Pechirrojo / Vermilion Flycatcher
Pyrocephalus rubinus



Es un pequeño atrapamoscas que posee un plumaje rojo brillante muy característico, para buscar alimento espera que aparezca una presa desde una posición expuesta y luego se lanza al vuelo para capturar insectos; además, se cierne y desciende al suelo para cazar insectos pequeños.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
América Central y del Sur. En Colombia habita en altitudes de hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar.	Áreas abiertas, bordes de bosque, jardines, zonas residenciales con árboles y arbustos.



Espatulilla / Common Tody-Flycatcher
Todirostrum cinereum

A pesar de su pequeño tamaño, es una especie altamente territorial que ataca a otras especies de aves que se posan cerca de su nido. Andan en parejas haciendo rápidas incursiones o cerniéndose en el aire para atrapar pequeños insectos de entre la vegetación.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el sur de México hasta el noroccidente de Perú, Bolivia y parte sureste de Brasil. En Colombia se le encuentra hasta 2.200 m s.n.m.	Claros enrastrojados en áreas selváticas, matorrales bajos, arbustos, zonas cercanas a fuentes de agua y jardines.





Sirirí común / Tropical Kingbird
Tyrannus melancholicus

Suele tener un comportamiento agresivo frente a otras aves, incluso gavilanes, mientras está en periodo de anidamiento y al cuidado de sus crías. Es excelente cazador de insectos, incluso tiene la capacidad de cazar cerca de las luces artificiales en la noche donde espera o persigue a sus presas en el aire.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde los Estados Unidos (Arizona) hasta la parte central de Argentina. En Colombia se puede observar hasta los 2.500 m s.n.m. en todo el territorio.	Bordes de bosques, parques, zonas residenciales, bosques abiertos, a lo largo de ríos, en sabanas, claros, áreas cultivadas y zonas pantanosas.



Cucarachero / House Wren
Troglodytes aedon

Es un ave pequeña y rechoncha con alta tolerancia a la modificación antrópica, presenta preferencia por edificaciones humanas para la construcción de sus nidos, suele ingresar a las casas, en la parte inferior de los techos, desplazándose en busca de alimento, mientras realiza llamados similares a los de un cascabel.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el centro de Canadá hasta la Patagonia en Argentina. En Colombia habita en casi todo el territorio, por debajo de los 3.300 metros sobre el nivel del mar.	Bordes de bosques, pastizales, juncales, jardines y chamizos.



Sinsonte tropical / Tropical Mockingbird
Mimus gilvus



Es una especie que se destaca por su melodioso canto. Puede ubicarse en una rama alta desde donde emite numerosas notas de estructura variable. Suele ser dominante y desplazar a otras aves de los comederos de plátano. Con frecuencia utiliza construcciones humanas para buscar alimento.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Ausente en algunos países de Centroamérica, como Panamá y Costa Rica. En Colombia puede encontrarse por debajo de los 2.800 m s.n.m.	Parques, jardines, zonas arboladas, bordes de bosque y plantaciones de algunos cultivos como el café y el plátano.





Mirla patinaranja / Great Thrush
Turdus fuscater

Es una especie de mirla que sobresale bastante debido a su tamaño. Suele ser bastante confiada, que puede llegar a acercarse bastante a los seres humanos, especialmente en sitios con amplia oferta de alimento. La mayor parte del tiempo está forrajeando el suelo, sobre todo en zonas de pastos cortos, buscando el alimento.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Únicamente en la región de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. En Colombia puede encontrarse entre 1.700-4.000 metros sobre el nivel del mar.	Zonas urbanas y periurbanas, áreas campestres y boscosas, aunque prefiere zonas de matorrales en áreas intervenidas.



Mirla pantanera / Black-billed Thrush
Turdus ignobilis



Es una mirla de menor tamaño que *T. Fuscater*, tolera y aprovecha muy bien la presencia del ser humano, tanto para conseguir alimento, como para establecer territorios de reproducción. Es más evidente su actividad en las épocas de lluvia cuando la tierra se satura de agua, ya que le facilita la búsqueda de alimento.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Sudamérica, encontrándose en Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana, Ecuador, Perú y Bolivia. En Colombia habita por debajo de los 2.600 m s.n.m.	Cerca de asentamientos humanos, así como cultivos, carreteras, cafetales y centros urbanos.



Barranquero andino / Andean Motmot
Momotus aequatorialis



Es una especie muy emblemática de nuestro municipio debido a su particular acercamiento con las personas, es un ave silenciosa, que realiza movimientos rápidos seguidos de periodos largos de inactividad, suele mover su cola en forma de cometa de lado a lado ante diversas situaciones.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Andes, desde Colombia hasta el noroeste de Bolivia. En Colombia puede observarse desde los 1.300 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar	Bosques montanos tropicales y menos templados, interiores y bordes de bosque, zonas arboladas, agrícolas e incluso zonas urbanas.





Piscuís / Azara's Spinetail
Synallaxis azarae

Ave pequeña de cola larga que se esconde entre los matorrales y enredaderas cerca a los bordes de bosques en nuestro municipio, por eso es más fácil identificarla por su característico canto: Piis-cuís! que se escucha entre los matorrales densos, el cual también le aporta el nombre común con el que lo conocemos.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Argentina (hasta Tucumán), Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. En Colombia se encuentra entre los 1.500 y 3.000 m de altitud.	Bordes de bosque, arbustales y matorrales secundarios semi a hiperhúmedos de la ladera este de los Andes.



Chamón común / Shiny Cowbird
Molothrus bonariensis



Son aves gregarias que suelen agruparse en grandes bandadas. Al igual que la mayoría de los chamones suele ser un ave parasitaria debido a que en lugar de criar a sus polluelos pone sus huevos en los nidos de otras aves, siendo la *Zonotrichia capensis* la más vulnerable, para que esta se encargue de empollarlos y levantarlos.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Amplia distribución por todo América del Sur, exceptuando el Amazonas y la Patagonia. En Colombia se distribiye hasta los 3.500 metros de altitud.	Bosques abiertos, montes, parques, bañados y poblados, pastizales dedicados al cultivo y la ganadería.



Chamón gigante / Giant Cowbird
Molothrus oryzivorus



Es un chamón que suele ser grande en proporción a los demás chamones, tiene un comportamiento de puesta parasitario: coloca sus huevos en los nidos de otras aves para que estas se encarguen de la incubación y crianza. Suele ser un ave que prefiere hábitats con poca presión antrópica.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se distribuye por gran parte de América del Sur y América del Norte. En Colombia se distribuye por altitudes debajo de los 2.500 metros sobre nivel del mar.	Bosques abiertos y con crecimiento de árboles de gran tamaño, pero es también el único tordo que se encuentra en el bosque profundo.



Tordo llanero / Carib Grackle
Quiscalus lugubris

Es un ave gregaria y territorial, que puede atacar en grupos a sus posibles depredadores. Sus nidos suelen ser parasitados por el Molothrus bonariensis, aunque con bastante frecuencia reconoce los huevos de esta especie y los rechaza. Los machos se distinguen facilmente de otros chamones gracias a sus ojos amarillos.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se distribuye en el norte de Suramérica, Panamá y las Antillas Menores. Ha venido adaptándose a nuevos hábitats, ampliando su rango de distribución altitudinal desde el nivel del mar hasta altitudes mayores a los 2.500 m s.n.m.	Bosques abiertos y con crecimiento de árboles de gran tamaño, pero es también el único tordo que se encuentra en el bosque profundo.

María mulata / Shiny Cowbird
Quiscalus mexicanus



Es una especie de ave principalmente de zonas costeras, pero en los últimos años se ha registrado su distribución hacia nuestro municipio. Es un ave gregaria y ruidosa en ciertas horas del día. Tiene una apariencia estilizada y esbelta, posee una cola larga que utiliza como timón mientras se desplaza en vuelo.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Estados Unidos hasta Perú y noroeste de Venezuela. En Colombia se distribuye desde el nivel del mar hasta los 2.100 m s.n.m.	Vegetación secundaria, matorrales, áreas agrícolas, bordes de bosques, granjas, pueblos, playas y zonas urbanas.

Garrapatero aní / Smooth-billed Ani
Crotophaga ani

Se caracteriza por ser una especie gregaria que casi siempre se encuentra en grupos, ya sea descansando sobre ramas a media altura o buscando alimento. Es un experto planeador que desciende suavemente desde grandes altitudes con sus alas extendidas, usando su cola como timón.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde México hasta el sur de Brasil. En Colombia se encuentra en todo el país en altitudes entre 0 y 2.200 metros sobre el nivel del mar.	Hábitats abiertos, zonas agrícolas perturbadas y alteradas por los humanos, áreas suburbanas, incluyendo parques y bosques secundarios.



Garrapatero gigante / Greater Ani
Crotophaga major

Es una especie bastante participativa en la dispersión de semillas y contribuye al equilibrio de la flora y la fauna en las selvas donde está presente. Esta especie también destaca por su resistencia a la destrucción del hábitat, debido a que es capaz de adaptarse a la convivencia con el ser humano.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el sur de México a Centroamérica y desde Costa Rica hasta el norte de Brasil. En Colombia se encuentra por debajo de los 2.100 m s.n.m.	Pasturas altas, matorrales tupidos junto a pastizales, pasturas o pantanos abiertos, o en las lindes de bosques ribereños bajos.

Cuco ardilla / Squirrel Cuckoo
Piaya cayana

Es un ave tranquila y bastante silenciosa. Trepa sobre los árboles mediante saltos cortos y acrobáticos. Planea de manera suave para desplazarse de un lugar a otro, permanece largos periodos de tiempo observando a su alrededor, girando la cabeza en busca de alimento. Vive solitaria, en parejas o en pequeños grupos.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se encuentra desde México hasta el centro de Argentina. En Colombia habita en todo el territorio nacional, desde el nivel del mar hasta los 3.000 m s.n.m.	En los perímetros y en el interior de las selvas altas, biomas cerrados, matas tropicales secas y campos con árboles.

Caracara / Crested caracara
Caracara plancus



Es un ave que suele formar parejas estables y utilizar el mismo nido cada año, lo acondicionan con ramas y plumas. Es una especie inteligente ya que posee una notable capacidad para adaptarse a diversos biomas y aprovechar los recursos disponibles, puede cazar sus presas o alimentarse de carroña, según la disponibilidad.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el extremo sur de Sudamérica. En Colombia hasta los 3.000 metros de altitud, en casi todo el país, exceptuando la costa pacífica, Urabá y al sur del río Guaviare.	Zonas abiertas del bosque húmedo, bosques ecotonales y estepas; áreas urbanas y suburbanas.





Pigua / Yellow-headed Caracara
Daptrius chimachima

Es un ave que suele ser oportunista en cuanto a su alimentación, se ha visto posado sobre el ganado arrancando garrapatas, comiendo carroña y cazando serpientes y roedores. Aunque su dieta pueda parecer inusual, la pigua desempeña un papel importante en el ecosistema de nuestro municipio.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Costa Rica, hasta Uruguay y el norte de Argentina. En Colombia se puede encontrar hasta los 1800 m s.n.m.; con algunos registros a mayor altura.	Terrenos abiertos, potreros, sabanas con palmas o perchas altas, borde de bosques y ríos.



Cernícalo americano / American Kestrel
Falco sparverius



Es el falcónido más pequeño de todos, realiza gran parte de la caza vigilando desde una posición alta para luego bajar en picada para capturar la presa. En ocasiones, sobre todo cuando no encuentra un buen lugar elevado para ubicarse, se desplaza sobre los campos en busca de presas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
En Norteamérica, Centroamérica y toda América del Sur, exceptuando la región amazónica. En Colombia se puede observar hasta los 3.200 metros de altitud	Campos abiertos, tierras de cultivo, ciudades y bordes de los bosques.



Halcón reidor / Laughing Falcon
Herpetotheres cachinnans



Posee su nombre debido a los ruídos que emite para comunicarse, ya que se asemejan a una carcajada. Tiene un gusto muy particular por las serpientes, razón por la cual se ha vuelto un gran aliado para el ser humano, ya que también se alimenta de serpientes venenosas. Suele andar solo en parejas que forjan para toda la vida.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el norte de México hasta el noroeste de Argentina. En Colombia puede ser observado por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar.	Campos abiertos, tierras de cultivo, ciudades y bordes de los bosques.







Gavilán maromero / White-tailed Kite
Elanus leucurus

Es una especie con una especial característica de caza: se detiene por varios segundos en el aire batiendo sus alas mientras analiza el terreno para encontrar a su presa y tirarse en picada hacia ella. Se mantiene solitaria y en parejas durante la época reproductiva, pero en grupos grandes fuera de la estación de cría.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Occidente y sur de Estados Unidos, Centroamérica, norte de Suramérica, Argentina, Chile y Brasil, excepto en la región Amazónica, en Colombia, Ecuador y Perú en la zona cisandina. En Colombia, desde el nivel del mar hasta los 2.600 metros de altitud.	Arboledas abiertas, valles de ríos, pastizales abiertos de robles, pastizales desérticos, campos agrícolas y pantanos.

Gavilán caminero / Roadside Hawk
Rupornis magnirostris



Es un ave rapaz confiada y fácil de ver que se percha en lugares expuestos en donde permanece en silencio o emite una vocalización típica. Es un gran cazador de ratones y otros roedores, algo que destaca su importancia para el control de plagas en nuestro municipio.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde México hasta Argentina. Se puede ver hasta los 2.500 m s.n.m., en todo el territorio colombiano, excepto en el Cabo de la Vela.	En la mayoría de hábitats tropicales, excepto en bosques primarios, desiertos y llanuras abiertas



Búho rayado / Striped Owl
Asio clamator



Es un búho de tamaño mediano, tiene largas plumas que parecen pelos en su cabeza, aparentando unas orejas. A menudo comienza su cacería al atardecer volando bajo para un lado y otro, descendiendo velozmente sobre sus presas. Suele reposar en el día en árboles con buena sombra.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el sur de México al norte de Argentina. En Colombia presenta una distribución discontinua, desde el nivel del mar hasta 2.300 m s.n.m.	Bosques, zonas anegadizas, pastizales, campos y bosques húmedos tropicales.





Currucutú / Tropical Screech-Owl
Megascops choliba

Es un búho pequeño que suele verse solo, en parejas o en grupos familiares pequeños. Tiene hábitos nocturnos y durante el día permanece entre la vegetación, pasando desapercibido gracias al camuflaje que le brinda su plumaje. Suele percharse cerca a las lámparas aprovechando la luz para atraer a sus presas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Costa Rica hasta el norte de Argentina, Paraguay y sur de Brasil. En Colombia se ha registrado hasta los 2.800 m s.n.m., en todo el territorio.	Zonas secas y húmedas en bosques secundarios, en bordes de tierra firme y várzea, claros con árboles y zonas residenciales.



Lechuza común / Barn owl
Tyto alba



Es una de las aves nocturnas más singulares, siempre ha existido un halo de misterio en torno a la figura de esta peculiar rapaz. Su cabeza es bastante grande en comparación con su cuerpo y la cara tiene forma de corazón. Posee un pico y unas garras ideales para cazar y desgarrar a su presa. Durante el día suele reposar en árboles altos con gran cantidad de sombra.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Ampliamente distribuido en todos los continentes, excepto en la Antártica. En Colombia se encuentra en altitudes superiores a los 1.200 m s.n.m.	Claros con árboles y zonas residenciales.



Gallinazo rojo / Turkey Vulture
Cathartes aura



Es un gallinazo asociado principalmente a áreas boscosas y con menos presencia de contaminación. Tiene un olfato muy desarrollado que le permite conseguir el alimento, es igual al gallinazo común pero distinguible por su cabeza sin plumas de color rojo. El pico es corto y de color marfil.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Norteamérica hasta la Patagonia. en Colombia se puede ver desde el nivel de mar hasta los 3.000 m s.n.m., en todo el territorio.	Bosques deciduos y zonas cercanas a cultivos y otras áreas abiertas.



Gallinazo sabanero / Lesser Yellow-headed Vulture
Cathartes burrovianus



Parecido al gallinazo aura, pero ligeramente más pequeño y con la cabeza más colorida, con la cara amarilla y la corona celeste. Tiene una gran capacidad para planear utilizando las corrientes de aire. Al igual que todos los carroñeros representa un importante rol en el ecosistema, ayudando a sanear el ambiente y previniendo la proliferación de patógenos perjudiciales.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Sureste de México, pasando por Centroamérica, hasta el norte de Argentina y Uruguay. En Colombia se encuentra hasta los 2.700 m s.n.m.	Zonas secas y húmedas en bosques secundarios, en bordes de tierra firme y várzea, claros con árboles y zonas residenciales.



Gallinazo / Black Vulture
Coragyps atratus



Es el ave carroñera más común y distribuída de América. Igual que todos los carroñeros contribuyen significativamente al control de enfermedades producidas por la descomposición de materia orgánica. Para buscar la carroña suele volar alto mientras planea y utiliza su agudo sentido de la vista.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Zona oriental y todo el sur de los Estados Unidos, a través de Centro América. En Colombia se encuentra hasta los 2.700 m s.n.m., en todo el territorio.	Cualquier tipo de ambiente como campos, pueblos, ciudades, y es casi ausente en montañas elevadas, bosques y desiertos.



Carpintero cariblanco / Golden-olive Woodpecker
Colaptes rubiginosus



Es una especie de carpintero de color dorado oliváceo por encima. Duerme solitario en agujeros de troncos y generalmente busca alimento entre la vegetación densa, preferentemente en lo alto, en aglomeraciones de epífitas o en ramas con musgo. Prefiere las áreas con poca presión antrópica.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde México hasta Bolivia y el noroeste de Argentina. En Colombia se ha registrado hasta los 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar.	El bosque, cerca de los ríos, y en árboles dispersos con vegetación leñosa.





Carpintero de robledales / Acorn Woodpecker
Melanerpes formicivorus

Suele ser un ave con interesantes comportamientos alimentarios, ya que acostumbra a almacenar granos y bellotas dentro de los árboles secos o postes de luz y así asegurar la comida para después. La dependencia de hábitats de roble específicos puede volverla vulnerable a los efectos del cambio climático.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el sur de los Estados Unidos hasta Colombia. En Colombia se ha registrado entre los 600 m y los 2.500 m sobre el nivel del mar.	Bosques de robles, arboledas, bosques mixtos, cañones de pinos-robles, laderas.



Carpintero habado / Red-crowned Woodpecker
Melanerpes rubricapillus



Se encuentran solitarios o en parejas. Esta especie picotea superficies de cortezas e inspecciona extremos de ramas rotas en busca de insectos para comer. Para atraer a la hembra, los machos construyen varios nidos haciendo huecos en los árboles, esperando que la hembra elija alguno, para poder aparearse.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Costa Rica hasta el norte de América del Sur. En Colombia se ha registrado hasta los 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar.	Bosques semiabiertos y en tierra de cultivo con presencia de árboles altos.



Periquito de anteojos / Spectacled Parrotlet
Forpus conspicillatus

Es un periquito principalmente de tierras bajas pero los últimos años ha ampliado su distribución hacia varias zonas de nuestro municipio. Se le ve forrajeando activamente y dada su coloración, puede llegar a camuflarse muy bien. Con frecuencia se observan parejas perchadas mientras se acicalan por largo rato.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el oriente de Panamá hasta el occidente de Venezuela. En Colombia se ve desde los 200 hasta 1.800 metros de altura, ocasionalmente a 2.100 m.	Bordes de bosques, matorrales espinosos, llanos, bosques de galería y bosques antiguos muy degradados o bosques de baja densidad.





Guacharaca colombiana / Colombian Chachalaca
Ortalis columbiana

Es un ave con similitud a una gallina, suele andar en grupos pequeños desplazándose entre la vegetación, en horas de la mañana y la tarde se percha a lo alto de los árboles para cantar. A veces se desplaza a nivel del suelo mientras busca alimento. En nuestro municipio ha mostrado buena adaptabilidad a los humanos.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Endémica de Colombia, encontrándose únicamente en el territorio colombiano desde los 300 hasta los 2.000 metros de altitud sobre nivel del mar.	Bosques húmedos y bosques premontanos, bordes y zonas arboladas. También frecuenta ambientes urbanos o periurbanos

Turpial montañero / Yellow-backed Oriole
Icterus chrysater

Turpial con un canto sonoro y melodioso, suele andar en parejas o en grupos familiares pequeños. Es muy activo vocalmente y se mueve ágilmente entre las ramas mientras busca alimento, los machos suelen percharse en una rama mientras emiten melodías. Defiende su territorio de otras aves, incluso rapaces.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el sur de México hasta el norte de Ecuador. En Colombia puede encontrarse en la región Andina, Caribe y Pacífica hasta los 2.800 m s.n.m.	Zonas abiertas con árboles dispersos, bosques abiertos, mixtos de pinos y robles, bosques de matorrales y bordes de bosques.



BOSCOSAS RESIDENTES



Gavilán negro / Gavilán Negro
Parabuteo leucorrhous



Es un pequeño aguilucho de color negro con las partes de su rabadilla y coberturas inferiores de su cola color blanco. Se le ve solo o en parejas volando o de vez en cuando perchado en el dosel. Es un gavilán poco conocido debido a que vive en lo más denso de las zonas boscosas y montañosas de nuestro municipio.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Bosque montano en los Andes desde Venezuela hasta Argentina. En Colombia prefiere los bosques húmedos por debajo de los 2.000 m s.n.m.	Selvas húmedas, cerros y bosques subtropicales.







Gallina ciega / Band-winged Nightjar
Systellura longirostris

Es un ave muy particular, guarda muchas semejanzas con las rapaces nocturnas: posee la capacidad de volar en completo silencio, tiene un fino oído y vista muy desarrollada, además de los hábitos nocturnos. Durante el día se percha en ramas, suelo o tejados pero posee una capacidad para camuflarse a la perfección, por lo cual es muy difícil de verla.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En altitudes entre 0-4.200 m s.n.m.	Zonas abiertas de matorrales, campos semiabiertos y bordes de bosque.

Pava maraquera / Sickle-winged guan
Chamaepetes goudotii



Es una pava más grande que la Guacharaca, se le ve sola o en pareja prefiriendo el dosel medio del bosque montano, pero también se alimentan en el suelo del bosque. Puede ser dócil y confiada posándose en ramas expuestas. Fácil de distinguir por la coloración azul brillante que tiene en la cara y el área alrededor de los ojos. Es bastante discreta y silenciosa.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Zonas subtropicales en ambas laderas de los Andes, desde Colombia hasta Bolivia. Se ve en elevaciones que van desde los 900 a los 2.600 m.	Bosques húmedos de montaña, bordes de las laderas de los Andes, vegetación alta con crecimiento secundario, montes abiertos o cultivos de café.



Elenia montañera / Mountain Elaenia
Elaenia frantzii



Es un atrapamoscas tímido, a diferencia de la Elaenia copetona este carece del copete y es de menor tamaño. Generalmente es solitario cuando no están en época de reproducción. Se posa en un punto de observación a la sombra entre matorrales o en el borde del bosque para cazar insectos, ambos sexos son similares.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Guatemala hasta Colombia y el oeste de Venezuela. En Colombia habitan a partir de los 1.200 m s.n.m.	Bosques húmedos de montaña, especialmente en los bordes y en los claros.





Cacique candela / Red-bellied Grackle
Hypopyrrhus pyrohypogaster

Especie muy distintiva e inconfundible, bastante gregaria, que se desplaza en grupos de hasta 30 individuos, forrajeando a diferentes alturas mientras vocaliza constantemente. Estos grupos suelen asociarse con otras aves para formar bandadas mixtas. En nuestro municipio se ha visto aprovechando de los recursos disponibles cerca de viviendas humanas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Endémica de Colombia, donde se distribuye en altitudes entre los 1.200 y 2.700 m.	Hace uso de áreas agrícolas, bordes e interior de bosques.



Carriqui verdiamarillo / Green Jay
Cyanocorax yncas



Es un ave que suele ser escurridiza y muy difícil de ver, a pesar de sus colores brillantes. Vive en parejas o grupos familiares durante todo el año y se comunica entre sí mediante una variedad de sonidos raros. Busca alimento activamente en el follaje de árboles y matorrales, además visita comederos buscando alimento.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Texas hasta Honduras, en América del Sur, de Colombia hasta Bolivia. En Colombia se distribuye desde los 900 hasta 2.600 m s.n.m.	Bosque caducifolio, vegetación secundaria, matorrales, bosques de pino-encino.



Carpinterito oliváceo / Olivaceous Piculet
Picumnus olivaceus



Especie de carpintero pequeño que representa un excelente indicador de conservación ya que se encuentra en fuentes de agua fría y áreas boscosas bien conservadas. Es un ave solitaria y bastante tímida, lo que hace que sea más difícil de ver, pasa gran parte del día buscando comida y picoteando activamente a niveles medios.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Guatemala hasta el oeste de Ecuador. En Colombia se puede observar hasta los 2.000 m s.n.m., en ambas vertientes de la Cordillera Central.	Ambientes tropicales, bosques secos y también en bosques de montaña.





Carpinterito ahumado / Smoky-brown Woodpecker
Dryobates fumigatus

Es un carpintero pequeño de apariencia sencilla: es uniformemente pardo con lados de la cabeza de color pardo más claro, el macho tiene una gorra roja y la hembra carece de ella. Este carpinterito puede pasar desapercibido por su plumaje y hábito de forrajear bajo las sombra de los árboles buscando alimento.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Amplia distribución en Centroamérica desde México hasta Panamá y los Andes en Suramérica. En Colombia por debajo de los 2.100 m s.n.m.	Interior de bosques, arboledas y plantaciones.



Tucancito andino / Emerald Toucanet
Aulacorhynchus albivitta



Es uno de los ejemplares de tucán más bello que hay, posee un plumaje color verde brillante con diferentes tonalidades que varían dependiendo de la zona de su cuerpo. Suele verse en bandadas de varios individuos forrajeando y moverse rápida y ruidosamente por el dosel de los bosques de nuestro municipio.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Los Andes, desde el oeste de Venezuela, a través de Colombia, hasta el norte de Ecuador. En Colombia habita en elevaciones entre 350 y 2.200 m s.n.m.	Bosques frondosos húmedos, selvas abiertas.



Tororoi / Chestnut-crowned Antpitta
Grallaria ruficapilla



Es un ave muy común y fácil de escuchar, pero tímida y raramente vista en lo abierto debido a que es bastante cautelosa y huidiza. Tiene un plumaje llamativo que hace que esta especie sea inconfundible en su rango: cabeza rojiza brillante, garganta blanca y partes inferiores rayadas. Ambos sexos son iguales.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Montañas costeras del norte de Venezuela, y, a lo largo de los Andes. En Colombia está principalmente entre los 1.900 y los 3.100 m de altitud.	Vegetación densa en el interior de bosques húmedos de montaña tropicales o subtropicales.





Trogon enmascarado / Masked Trogon
Trogon personatus

Es un ave muy especial con colores bastante representativos, tanto hembra como macho tienen la parte inferior de la cola con franjas blancas y el vientre rojo con una estrecha banda blanca en el pecho. Puede pasar desapercibida ya que es bastante discreta, suele permanecer en solitario perchada y hace vuelos cortos en busca de alimento.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se encuentra en Sudamérica principalmente en los Andes y Tepuy. En Colombia se encuentra en altitudes altas entre 1.000 y 2.100 m s.n.m.	Al interior y borde de bosque húmedo.



Atlapetes nuquiblanco / White-naped brushfinch
Atlapetes albinucha



Es un elegante pinzón de cola larga, con una línea larga y conspicua en la coronilla. Se desplaza en parejas o grupos familiares y en ocasiones se agrupa en bandadas mixta de arremones. Es bastante bullicioso y saltón, forrajea activamente en el suelo buscando alimento y prefiere los bosques húmedos para vivir.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el extremo sur de México hasta Colombia donde se distribuye a lo largo del país, entre los 900 y los 2.200 m s.n.m.	Áreas de crecimiento secundario alto y matorrales, bordes de bosque con vegetación densa, cafetales con maleza, setos vivos, matorrales en huertos.



Solitario andino / Andean Solitaire
Myadestes ralloides



Es un pequeño zorzal con plumaje poco descriptible, es generalmente rojizo arriba y gris abajo. Por lo general, se escucha con bastante frecuencia en los bosques de nuestro municipio pero es difícil de ver, a menudo permanece en una sola percha durante largos períodos de tiempo.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Bosque nuboso de los Andes. En Colombia habita en altitudes que van desde los 1.200 a los 2.700 m de altitud sobre el nivel del mar.	Selva húmeda y selva muy húmeda (selva nublada) y bosque secundario alto.



Abanico pechinegro / Golden-fronted whitestart
Myioborus miniatus



Es un ave bastante activa, forma parejas durante todo el año y es frecuente que acompañe a bandadas mixtas de otras aves. Usualmente, mantiene abanicando su cola con puntas blancas, y la mueve de lado a lado mientras brinca y revolotea por entre el follaje o sobre los troncos o a lo largo de ramas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el norte de México hasta el norte de Bolivia y Guyana, en Colombia se encuentra en altitudes desde los 750m hasta los 2.200 m s.n.m.	Bosque de niebla, bosques montanos, pinos y encinos.



Arañero coronado / Russet-crowned Warbler
Myiothlypis coronata



Es un ave activa y escurridiza, usualmente forrajea y busca comida en parejas pero a menudo acompaña a una bandada de especies mixtas. Se distingue por su corona de color anaranjado rojizo que cubre desde la frente hasta la nuca y está rodeada de un borde negro, delgado y nítido.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Entre 1.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar a ambos lados de los Andes en todo el norte de América del Sur.	bosque de montaña tropical, bosques subtropicales y templados de los Andes.



Atrapamoscas montañero / Pale-edged Flycatcher
Myiarchus cephalotes



Es un mosquerito de tamaño pequeño, sin muchas características distintivas, se distingue de los otros Myiarchus por su margen blanco en la cola y sus barras alares más prominentes. Se percha en ramas expuestas al borde de los bosques de nuestro municipio, desde donde caza su alimento a baja o mediana altura.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Bosque nuboso andino de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en alturas entre los 1.100–2.400 m s.n.m.	Bordes de selva húmeda, claros de bosque con arbustos y árboles dispersos.



Atrapamoscas lagartero / Golden-crowned Flycatcher
Myiodynastes hemichrysus



Es un mosquero de tamaño grande con el vientre amarillo brillante y un patrón blanco y negro distintivo en la cabeza, similar a varias otras especies de mosqueros. Vive en parejas o en grupos familiares pequeños, se posa a alturas medias o en lo alto de los árboles para cazar insectos desde una percha expuesta, los cuales atrapa en pleno vuelo.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Costa Rica hasta el norte y noroeste de América del Sur. En Colombia alcanza altitudes cercanas a los 2.300 metros.	Habita en el dosel y en los bordes de bosques de niebla.



Atrapamoscas canelo / Cinnamon Flycatcher
Pyrrhomyias cinnamomeus



Es un mosquerito bastante pequeño con un característico plumaje de color rojizo brillante con barras alares negras. Generalmente anda en parejas mientras se percha en ramas expuestas en el borde de los bosques de nuestro municipio desde donde caza. Es muy activo vocalmente y de fácil identificación.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Colombia se encuentra entre 1.200 y los 3.000 m s.n.m.	Bosque primario y secundario semi a hiper húmedo de la ladera este de los Andes; principalmente en bosque con dosel irregular, bordes y claros.



Verderón montañero / Brown-capped Vireo *Vireo leucophrys*



Es un vireo bastante uniforme, con partes superiores de color marrón oliva, pecho y vientre amarillo y ceja blanquecina. Es un ave que suele permanecer solitaria, sin embargo se une a bandadas de otras especies mixtas. Vocaliza constantemente en el dosel de los bosques de nuestro municipio, por lo cual es más fácil escucharla que verla.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el noreste de México, a lo largo de los Andes hasta el sureste de Perú y norte de Bolivia. En Colombia se ha reportado de 1.400 a 2.500 m s.n.m.	Bordes de bosque, bosques de parte alta intervenidos. Ocasionalmente visita jardines arbolados cerca a zonas urbanas.



Pitajo torrentero / Slaty-backed Chat-Tyrant *Ochthoeca cinnamomeiventris*



Es un mosquerito pequeño, mayormente gris oscuro, con cejas blancas y partes inferiores rojizas. Prefiere estar cerca a los riachuelos boscosos de nuestro municipio. Permanece solo o en parejas y se alimenta dando pequeños saltos en el aire, aunque es muy activo vocalmente y prefiere estar en perchas expuestas, casi siempre pasa desapercibido.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se encuentra a lo largo de la cordillera de los Andes, desde el extremo oeste de Venezuela, por las tres cadenas andinas de Colombia, al sur por ambas pendientes de Ecuador, hasta el extremo noreste de Perú. Desde aproximadamente 1.700 a 2.800 de altitud.	Sotobosque, bordes de bosque, áreas arboladas cerca de fuentes de agua



Tiranuelo cejiamarillo / Golden-faced Tyrannulet *Zimmerius chrysops*



Es un atrapamoscas pequeño de colores muy brillantes, posee la cara de color amarillo dorado y los ojos de color marrón oscuro que permiten su fácil reconocimiento. Es bastante activo vocalmente y forrajea entre arbustos y árboles pequeños en áreas conservadas de nuestro municipio.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia donde habita principalmente en altitudes por debajo de los 2.300 m s.n.m.	Selvas húmedas montanas y también de baja altitud y bosques secundarios altamente degradados, tropicales y subtropicales.



Atlapetes pechiamarillo / Yellow-breasted Brush-Finch
Atlapetes latinuchus



Es un bello gorrión relativamente grande con una característica corona rojiza y un espéculo blanco en las alas, se alimenta entre matorrales y arbustos frondosos asociados a bosques montanos. Usualmente se le ve en pequeños grupos y a veces siguiendo una bandada de especies entre la vegetación del bosque.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Región andina del norte del Perú, a través de Ecuador y Colombia, al extremo occidental de Venezuela, generalmente por encima de los 3.000 m s.n.m.	Bosques y bordes de bosque montanos.





Verderón piquinegro / Black-billed Peppershrike
Cyclarhis nigrirostris

Es un vireo de tamaño relativamente grande, usualmente permanece en el dosel de las áreas boscosas de nuestro municipio, y a veces siguiendo una bandada de especies mixtas. Es muy difícil de observar ya que es bastante tímido, pero es fácil de identificar por su canto frecuente sobre todo en las mañanas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Selvas húmedas de las laderas de los Andes de Colombia y el norte de Ecuador, entre los 1.200 y 2.300 m s.n.m.	Canopia y bordes de bosque de las selvas húmedas.



Arañero cariblanco / Golden-fronted Whitestart
Myioborus ornatus




Es una reinita única, con impresionantes colores que van desde el gris hasta el amarillo brillante, con su elegancia y su gran cola, el macho deleita a la hembra para cortejarla. Se les ve en parejas o en grupos pequeños, incluso siguiendo bandadas mixtas de otras especies mientras forrajean y se alimentan en todos los niveles del bosque.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Guatemala hasta Colombia y el oeste de Venezuela. En Colombia habitan a partir de los 1.200 m hasta los 2.900 m s.n.m.	Bosques húmedos de montaña, especialmente en los bordes y en los claros.



Inca bronceado / Bronzy Inca
Coeligena coeligena




Es un colibrí relativamente grande con una coloración poco usual en su especie: es completamente marrón rojizo, casi sin color o iridiscencia. Prefiere alimentarse de las flores de *Cavendishia sp* por lo cuál es más factible de ser visto en los bosques montañosos de nuestro municipio donde se presenta más floración de este género de plantas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Bosques montanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En un rango altitudinal aproximado de 1.400 a 2.300 metros.	Dentro de la vegetación, en el estrato superior del sotobosque, estrato medio y ocasionalmente en el dosel, también en bordes de bosque.



Colibrí cola de raqueta / Booted Racket-tail
Ocreatus underwoodii



Es de los colibrís más distintivos que tenemos en nuestro municipio, el macho posee una cola larga en forma de raqueta y sus prominentes calcetines blancos o anaranjados, las hembras pueden identificarse por sus partes inferiores blancas con cantidades variables de manchas. Suele verse solitario y con comportamientos territoriales con otros colibrís.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Venezuela, a través de Colombia, Ecuador y Perú hasta Bolivia. En Colombia está presente en las tres cordilleras desde 850 hasta 3. 100 m s.n.m.	Bordes de bosque húmedo y muy húmedo, montes secundarios y claros de bosque



Tangara primavera / Blue-winged Mountain-Tanager
Anisognathus somptuosus



Es una tangara fornida con una llamativa corona y nuca color amarillo dorado, hombros y plumas de vuelo azul brillante que contrastan perfectamente con el negro de su cuerpo. Tiene un canto bastante melodioso, se le ve en parejas, en grupos familiares o bandadas con otras tangarás buscando alimento activamente.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. En Colombia habita en los bosques montanos de altitudes entre 1.500-2.500 m s.n.m.	Bosques de montaña húmedos y semi-húmedos.



Clorospingo común / Common bush tanager
Chlorospingus flavopectus



Es una pequeña ave bastante activa, suele agruparse con bandadas mixtas mientras rebusca entre el follaje y escudriña entre musgos en busca de alimento. Su plumaje es algo apago, con tonalidades grises y verde olivo que le ayudan a mimetizarse con la densa vegetación en la que habita.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Bosques húmedos desde México hasta Sudamérica, hasta las Yungas del extremo noroccidental de Argentina. Desde 1.000 hasta 3.000 metros de altitud.	En el dosel, en bordes de bosque, a menudo en árboles y arbustos en fructificación.







Picaflor lustroso / White-sided Flowerpiercer
Diglossa albilatera

Es una pequeña pinchaflor, macho es todo negruzco y la hembra es marrón-oliva, ambos con parches blancos en la cobertura de las alas. Se les puede ver en parejas o en solitario, pocas veces con bandadas mixtas en sitios de alimentación. Se considera que con su tarea de extracción de néctar de las flores ayuda a la polinización de plantas nativas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
En los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Se encuentra en altitudes entre 1.800 y 2.800 metros de altitud.	Usualmente, en el borde del bosque o en áreas arbustivas.

Picaflor de antifaz / Masked Flowepiercer
Diglossa Cyanea



Es un pinchaflor bastante grande, con hermoso color azul uniforme, máscara negra y ojos rojos, a pesar de su llamativo plumaje puede pasar desapercibido, ya que vive entre la espesa vegetación. Es bastante activo a la hora de buscar alimento, a menudo sigue una bandada de especies mixtas mientras se alimenta.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se distribuye de forma disjunta desde Venezuela a lo largo de la cordillera de los Andes, hasta el oeste de Bolivia, en altitudes entre 2.000 y 3.500 metros.	Selvas húmedas de montaña, bordes de bosque y arbustales



Azulejo montañero / Blue-capped Tanager
Sporathraupis cyanocephala



Es una Tangara bastante grande con plumaje oliva brillante arriba y gris abajo, con la cabeza mayormente azul. Permanece en parejas o en grupos de 3 a 8 individuos que pueden unirse a bandas mixtas con otras especies para buscar alimento en los árboles frutales. Prefiere hábitas con poca presión antrópica.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela, en Colombia se encuentra entre los 1.400 y los 3.000 m de altitud.	Bordes de bosques, bosques secundarios y jardines.





Tangara verdiplata / Metallic-green Tanager
Tangara labradorides

Tangara pequeña con color único verde metálico, que a menudo parece bastante opaco, presenta un similar comportamiento a las de su especie, pero menos silvícola. Es la más numerosa en las bandadas mixtas, se les ve forrajeando entre los árboles frutales y a menudo visitando comederos de jardines cerca a las zonas más boscosas de nuestro municipio.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde Colombia, en la zona andina, hasta Perú. En Colombia se encuentra entre 1.300 y 2.300 m de altura sobre el nivel del mar.	Bosques húmedos montanos, bordes de bosques y claros adyacentes.



Tangara berilina / Beryl-spangled Tanage
Tangara nigroviridis



Tangara pequeña inconfundible: todo el cuerpo con manchas azul-verde brillante que contrastan con la máscara y la espalda negras, ninguna otra tangara tiene una apariencia con tantas lentejuelas. Es una tangara bastante silenciosa y permanece solitaria o en parejas en el estrato medio y dosel de los bosques.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En Colombia se ha reportado de 1.500 a 2.500 metros de altitud..	Bosques nubosos, bosques húmedos y sus bordes.



Tangara negriazul / Blue-and-black Tanagers
Tangara vassorii




Tangara con un llamativo color azul brillante que contrasta con su antifaz negro y barrar alares negras. Se le ve en pareja o en grupos de hasta ocho individuos y a menudo en bandadas mixtas con otras aves mientras forrajea entre los árboles frutales. Es muy activa mientras busca comida: salta y aletea, se coloca cabeza abajo unas cuantas veces y luego vuela.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, entre los 1.900 y 3.400 m de altitud y preferentemente entre los 2.400 y 2.900 m s.n.m.	Bosque subtropical superior y templado.



Eufonia cabeciazul / Golden-rumped Euphonia
Chlorophonia cyanocephala



Es un ave bastante vistosa, tanto hembra como macho posee la parte superior de la cabeza de color azul celeste justo hasta el nivel de los ojos. Se mueve en parejas o en bandadas mixtas pero es más silenciosa que otras eufonias. No se adapta bien a terrenos perturbados, por eso es más fácil avistarla bosque adentro.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago. En Colombia en altitudes que rondan entre los 600 y 2.600 metros.	Frecuentan hábitats boscosos abiertos, bordes y jardines.



Cucarachero pechigrís / Gray-breasted Wood-Wrennia
Henicorhina leucophrys



Es un cucarachero pequeño y de cola muy corta, principalmente de color rufo con línea superciliar blanca. Se mueve activamente entre la densa vegetación buscando alimento, en parejas o grupos pequeños. Al igual que otros cucaracheros es bastante activo vocalmente con un canto silbado y variado, pero difícil de ver.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde las tierras altas del centro de México, pasando por los Andes hasta el oeste de Bolivia. En Colombia se ha reportado entre los 700 y 2.200 m.	Áreas boscosas, bosques húmedos con densa cobertura vegetal.




MIGRATORIAS

Andarríos maculado / Spotted Sandpiper
Actitis macularius



Es un ave playera pequeña que migra hacia nuestro municipio desde comienzos de agosto-octubre hasta finales de abril-mayo. Al caminar sobre las orillas de arroyos, estanques o pantanos, menea la parte posterior de su cuerpo hacia arriba y hacia abajo con un movimiento peculiar de tambaleo.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Sacan sus crías en Canadá y Estados Unidos. Migran hacia el sur de Estados Unidos y a Sudamérica, raras veces divagan por el oeste de Europa. Entre los 1.900 y 3.400 metros de altitud, preferentemente entre los 2.400 y 2.900.	Camina en los bordes de riachuelos, estanques y lagos, forrajea en tierra o caminando en sitios inundados.







Garza morena / Blue Heron
Ardea herodias

Es una garza bastante grande y esbelta que viene a invernar en nuestro municipio entre finales de agosto y principios de mayo. Forrajea en humedales poco profundos, suele quedarse quieta o caminar con lentitud esperando que los peces naden cerca para luego atraparlos con un rápido movimiento del pico.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se reproduce desde el sur de Alaska y Canadá hasta Chiapas y Bélice, también en las Islas Galápagos; inverna hasta el norte de suramérica.	Pantanos, ciénagas, costas y llanuras húmedas formadas por la marea.

Focha americana / American Coot
Fulica americana



Es un ave asociada a los rascones sin embargo nadan en aguas abiertas, como los patos, y camina a lo largo de la orilla. En nuestro municipio se ha evidenciado su migración entre agosto y mayo, sin embargo, también se ha registrado la presencia de esta especie fuera de su época de migración.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Norteamérica y Centroamérica, desde el sur de Alaska y Nueva Escocia, son en general migradoras hacia Colombia y Euador.	Lagos, pantanos y ríos de aguas corrientes



Agachadiza / Wilson's Snipe
Gallinago delicata

Es un ave playera de apariencia rechoncha, busca alimento sobre todo al sumergir el pico para explorar en el lodo blando, ya que la punta es flexible y tiene sensibilidad, lo que le permite detectar y capturar a las presas bajo la tierra. A nuestro municipio llega entre mediados y finales de octubre y permanece hasta marzo o abril.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Norteamérica y Centroamérica, desde el sur de Alaska y Nueva Escocia, son en general migradoras hacía Colombia y Euador.	Lagos, lagunas, salinas y zonas costeras, tanto de agua dulce como de agua salada.



Águila pescadora / Osprey
Pandion haliaetus

Es un ave rapaz ligada al medio acuático ya que su alimentación es exclusivamente piscívora. Al cazar se le observa lanzarse desde muy alto en el aire e introducir las patas primero en el agua para agarrar peces. Presenta hábitos de migración entre octubre y mayo, sin embargo, también se ha reportado la presencia de individuos residentes.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Todos los continentes, excepto en la Antártida, presenta nidificación boreal e invernación austral.	Cerca del agua, ya sea dulce o salada.

Reinita acuática / Northern Waterthrush
Parkesia noveboracensis

Es una reinita de gran tamaño, que suele ser tímida y es difícil acercarse. Llama la atención por su extraño comportamiento de "balanceo", meneando la mitad posterior de su cuerpo hacia arriba y hacia abajo de forma constante a medida que camina, y emitiendo su llamado metálico fuerte.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
En verano, desde Alaska hasta Nueva Jersey. En invierno, desde Florida hasta América del Sur.	Bosques húmedos cercanos al agua.

Pato cucharo / Northern Shoveler
Spatula clypeata

Es un pato de tamaño promedio con un característico pico grande en forma de espátula visible a la distancia y en vuelo. Para alimentarse se zambulle en el agua donde realiza movimientos rotatorios que le permiten remover el agua. En nuestro municipio se ha evidenciado la migración de algunos individuos hacia nuestros humedales entre agosto y mayo.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Regiones septentrionales de Eurasia y Norteamérica, pasa el invierno en el sur de Europa y Asia, África, la mitad sur de Norteamérica y la región caribeña.	Marismas, charcas, lagunas, embalses, albuferas.





Barraquete aliazul / Blue-winged Teal
Spatula discors

Es un pato pequeño con parches azul calcáreo en la parte superior del ala. Los machos en plumaje reproductivo tienen una distintiva media luna blanca delante del ojo. Durante la época de migración que va desde agosto o principios de octubre hasta mayo se ve forrajeando en nuestros humedales e incluso a lo largo de la ribera de nuestro río Negro.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
América del Norte, desde Alaska hasta Nueva Escocia al este y Texas al sur, donde se reproducen. Durante invierno migran hasta América del Sur.	Pantanos, pastizales inundados, estuarios, salinas, lagunas y lagos.

Patiamarillo chico / Lesser Yellowlegs
Tringa flavipes

Es un ave playera de porte muy estilizado, con largas patas de color amarillo vivo, durante la época de migración que va desde agosto y septiembre hasta finales de mayo es factible verla alimentándose con movimientos rápidos en las riberas del Río Negro o humedales de nuestro municipio.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Nidifica en el cordón forestal de Alaska y Canadá, en invierno migra cubriendo gran parte de América del Sur.	Prados inundados, manglares, embalses, fangos intermareales, albuferas y marismas.



Andarríos solitario / Solitary Sandpiper
Tringa solitaria



Es un ave playera similar al Patiamarillo grande, del que se diferencia por ser algo más pequeño, de cuerpo más compacto y con patas menos amarillas, además de tener la rabadilla y el centro de la cola de color oscuro. Durante la migración, como lo infiere su nombre, se le suele encontrar solo, a lo largo de la orilla de nuestro Río Negro.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Oriunda de Estados Unidos, se reproduce entre Canadá y Alaska. Durante la temporada más fría, suele migrar hacía Suramérica y Centroamérica.	Orillas de arroyos, pantanos y estanques arbolados y marismas de agua dulce.





Cuco americano / Yellow-billed Cuckoo
Coccyzus americanus

Es un cuclillo con comportamiento muy tímido, tiene conductas esquivas que lo hacen bastante difícil de localizar, sin embargo es bastante activo vocalmente. Prefiere ambientes muy conservados, por lo cual es factible de ver en nuestros bosques alejados durante la época de migración.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Ampliamente distribuido por América, cría en Norteamérica, las Antillas Mayores y la península de Yucatán y migra en invierno hacia América del Sur.	Zonas boscosas, matorrales, huertos y bosquecillos a orillas de arroyos.



Atrapamoscas minimus / Least Flycatcher
Empidonax minimus



Es un mosquerito pequeño que quizás pasa desapercibido por su tamaño y su color opaco que se mimetiza bien con el ambiente. En la época de migración se le ve mientras busca su alimento observando desde una percha expuesta para luego levantar vuelo y capturar insectos, es bastante activo vocalmente.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Anida en Norteamérica y pasa el invierno en México y América Central.	Bosques abiertos, arboledas de álamos, huertos, árboles de sombra.



Reinita de Canadá / Canada Warbler
Cardellina canadensis

Es una hermosa reinita que vuela más de 5 mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos, hacia nuestros bosques andinos para pasar la temporada invernal que va desde finales de agosto hasta abril. Al llegar a nuestro municipio se agrupa con bandadas mixtas de otras reinitas mientras forrajean en busca de alimento.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Anida en Norteamérica e inverna principalmente en el norte de Suramérica.	Bosques de niebla o bosques húmedos, matorrales en áreas de crecimiento secundario, bosques secundarios.





Reinita enlutada / Mourning Warbler
Geothlypis philadelphia

Es una reinita robusta que nos visita desde el Sur de Canadá cuando allí cae el invierno, migra hacia nuestro territorio en busca de alimento y refugio. Durante su estancia en nuestro municipio forrajea activamente entre los arbustos en busca de alimento, generalmente anda en bandadas mixtas con otras migratorias.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se reproducen en el Sur de Canadá, en las épocas frías migran hacía América Central y norte de América del Sur.	Bosques de niebla o bosques húmedos, matorrales en áreas de crecimiento secundario, bosques secundarios.



Reinita Verderona / Tennessee Warbler
Leiothlypis peregrina

Es una reinita diminuta pero con un sorprendente canto, en la época de migración suele permanecer en bandadas mixtas con otras reinitas migratorias, busca alimento activamente entre los arbustos y plantas florecidas, a menudo visita floraciones de cultivos de café.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Anida en Canadá y Estados Unidos y pasa el invierno en América Central y el norte de América del Sur.	Bosques caducifolios y mixtos. Durante la migración, en arboledas y malezas.




Turpial hortelano / Orchard Oriole
Icterus spurius

Es un pequeño turpial muy activo vocalmente, los machos adultos son saturados de castaño marrón con la cabeza negra. Las hembras son opacas de color verde amarillo con barras blancas en las alas. Durante la migración se reúne en bandadas mixtas con otras especies mientras forrajea a diferentes niveles.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Anida en Norteamérica y pasa el invierno en México y América Central.	Bosques abiertos, arboledas de álamos, huertos, árboles de sombra.







Turpial baltimore / The Baltimore oriole
Icterus galbula

Turpial bastante llamativo: los machos son anaranjados con cabeza negra. Las hembras varían de amarillo a anaranjado brillante abajo con la cabeza grisácea. Durante su época de migración suelen verse más adentrados en los bosques de nuestro municipio, tienen un canto muy melodioso y permanece más a menudo cerca de la copa de los árboles.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se reproducen en el Sur de Canadá, en las épocas frías migran hacía América Central y el norte de América del Sur.	Bosques de niebla o bosques húmedos, matorrales en áreas de crecimiento secundario, bosques secundarios.

Atrapamoscas copetón / Great Crested Flycatcher
Myiarchus crinitus

Es un atrapamoscas bastante grande pero difícil de detectar ya que prefiere permanecer en la copa de grandes árboles. Tiene características muy parecidas a nuestros atrapamoscas: pecho amarillo y rojizo en las alas y la cola, busca alimento al volar desde una posición elevada para capturar insectos.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Anida en el sur y este de Canadá y en toda la mitad oriental de Estados Unidos y migra hacia América Central y noroeste de América del Sur.	Áreas boscosas abiertas, alrededor de los bordes y claros.



Picogordo degollado / Rose-breasted Grosbeak
Pheucticus ludovicianus

El nombre de esta ave se debe a la mancha triangular de color rojo intenso en su pecho, que contrasta con el negro de la cabeza y el blanco del vientre. Durante su visita hacia nuestros territorio en la época de migración es frecuente verla en bandadas mixtas forrajeando entre los arbustos en busca de alimento.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Anida en Norteamérica y pasa el invierno en México y América Central.	Bosques abiertos, arboledas de álamos, huertos, árboles de sombra.



Cebrita trepadora / Black-and-white Warbler
Mniotilta varia



Pequeña ave con un llamativo plumaje de rayas blancas y negras. Durante la época de migración que va desde agosto y septiembre hasta mayo, es común observarla en zonas cercanas a arroyos, ríos e incluso en parques urbanos con buena cantidad de árboles frutales en busca de refugio y alimento que le ofrecen las cálidas tierras de nuestro municipio.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Anida en Canadá y Estados Unidos. En la temporada invernal migra hacía México, Guatemala, Costa Rica y Norte de Colombia.	Bordes de bosque, arboledas, parques, zonas urbanizadas.



Atrapamoscas sulfurado / Sulphur-bellied Flycatcher
Myiodynastes luteiventris

Es un mosquero grande y con un plumaje rayado muy característico, al igual que todos los mosqueros busca alimentos al observar desde una posición elevada para luego levantar vuelo y capturar insectos. Es de las últimas aves migratorias que llegan hacia nuestro municipio, se reportan a finales de octubre.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Cría desde los Estados Unidos hasta el Norte de México e invernan desde el centro y sur de México, en América Central, y en el noroeste de América del Sur.	Bosques abiertos, arboledas y en las lindes de los bosques.



Piranga bermeja / Hepatic Tanager
Piranga flava

Es una tangara grande, con colores llamativos muy similares a los de la Piranga rubra, pero se distingue de esta por tener el pico negro y un color más intenso. Busca alimento de forma lenta y con prudencia, saltando entre las ramas y deteniéndose para observar con detalle entre el follaje. Durante la época de migración forrajea con otras especies migratorias.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Anida en Estados Unidos y migra en épocas frías hacia las laderas este y oeste de los Andes.	Bosques de montaña abiertos, robles y pinos.







Piranga escarlata / Scarlet tanager
Piranga olivacea

Es una tangara con una apariencia demasiado llamativa: el macho tiene una coloración roja brillante que contrasta con sus alas negras, las hembras y machos en plumaje no reproductivo son oliva amarillo con las alas grises o negras. Pasa el invierno en nuestra región, se agrupa con otras especies migratorias y a veces, suele visitar comederos sobre todo en áreas rurales.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Anida en Estados Unidos y migra en épocas frías hacia las laderas este y oeste de los Andes.	Bosques de montaña abiertos, robles y pinos.

Piranga roja / Summer Tanager
Piranga rubra

Es bastante similar a la Piranga Olivácea, pero esta es totalmente rojo brillante, la hembra presenta diferentes tonalidades que van del amarillo pálido al anaranjado brillante. Durante su migración se une a bandadas mixtas con las que recorre el follaje de plantaciones y árboles florecidos de nuestro municipio.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Anida en Norteamérica y migra en invierno a México, América Central, las Antillas y Sudamérica	Jardines, bosques, arboledas áreas abiertas, bordes de bosques y plantaciones.



Reinita cabecidorada / Prothonotary Warbler
Protonotaria citrea



Es una reinita de colores muy brillantes y bastante activa durante su forrajeo en busca de alimento, suele forrajear sola o en pareja, con frecuencia se une a bandadas mixtas con otras reinitas que igual que ella, migran desde Norteamérica hacia nuestro territorio huyendo del frío y en busca de comida y refugio.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Desde el este de Estados Unidos y Canadá, en invierno se extiende desde el sur de México hasta América Central y el Caribe.	Manglares, bosques húmedos, áreas pantanosas, bordes de bosque, matorrales secos, arroyos y potreros con árboles.





Reinita castaña / Bay-breasted Warbler
Setophaga castanea

Es una reinita de colores opacos y castaños, pero bastante llamativa ante la vista. Solo se ve durante la época de migración que va desde octubre a mayo. Es bastante sutil a la hora de buscar alimento entre el follaje, durante la migración se une a bandadas mixtas que incluyan otras reinitas.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se reproduce en el bosque boreal. En casi todo Estados Unidos. Pasa el invierno en Centro y Suramérica.	Bordes de bosque, arroyos y potreros con árboles florecidos.



Reinita dorada / Yellow Warbler
Setophaga petechia



Es una reinita con llamativo plumaje amarillo brillante con cierta cantidad de rayas castañas en su pecho y vientre. Durante su época de migración es muy factible de ver forrajeando entre los arbustos de nuestro municipio, pero tiene movimientos sutiles que hacen que pase desapercibida.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Norteamérica, sur y centro de México. Se desplaza durante el invierno hacía América Central y en América del Sur.	Bordes de estanques, pantanos y bosques, particularmente donde hay sauces.



Reinita gorginaranja / Blackburnian Warbler
Setophaga fusca



Es una reinita bastante llamativa gracias al naranja brillante de su garganta que sobresale facilmente entre la vegetación. Durante la época de migración forrajea activamente entre las copas de los árboles en busca de alimento, la mayoría de veces se desplaza en bandadas mixtas con otras reinitas migratorias.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se reproduce en el este de América del Norte, desde el sur de Canadá a Carolina del Norte. Pasa el invierno en el sur de América Central y en Sudamérica.	Bordes de bosques, bosques mixtos, zonas con buena cobertura vegetal.





Candelita norteña / American Redstart
Setophaga ruticilla

Reinita visitante entre la época de migración que va desde finales de agosto hasta mayo, revolotea en los árboles de forma muy activa, por lo general expandiendo sus alas y su cola de manera parcial, como para exhibir sus hermosos colores con tonalidades naranjas brillantes. Prefiere ambientes sin tanta presión antrópica.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Anida en Canadá y el norte y este de los Estados Unidos. Inverna en el sur de California, México, en las Antillas, América Central y norte de Sudamérica.	El interior o el límite de bosques con abundante hierba o arbustos.



Vireo ojirojo / Red-eyed Vireo
Vireo olivaceus



Es una especie de vireo con plumaje verde oliva arriba y blancuzco abajo, sin barras alares. Es muy activa vocalmente: puede cantar por largos periódos de tiempo pero no siempre es fácil de ser vista. Durante el periodo de migración se agrupa con bandadas mixtas de reinitas y otras especies migratorias.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Anida en América del Norte y se desplaza hacia el occidente de la cuenca del Amazonas y el centro oeste de América del Sur, en los inviernos boreales.	Lindes de bosques, arboledas en orillas de ríos, granjas, cortinas rompevientos, huertos y bordes de caminos.



Sirirí norteño / Eastern Kingbird
Tyrannus tyrannus

Especie de tirano que, como es bien sabido protegen su territorio y su área de alimentación violentamente. Durante su época de migración es muy abundante y se le ve mientras busca su alimento observando desde una posición elevada para luego levantar vuelo y capturar insectos.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Anida en América del Norte y se desplaza hacia el occidente de la cuenca del Amazonas y el centro oeste de América del Sur, en los inviernos boreales.	Lindes de bosques, arboledas en orillas de ríos, granjas, cortinas rompevientos, huertos y bordes de caminos.







Sirirí tijeretón / Fork-tailed Flycatcher
Tyrannus savana

Mosquerito con una presencia bastante atractiva, luce una cola más larga que el cuerpo con dos largas plumas externas en la punta de esta, tiene comportamientos similares a todos los mosqueritos. Viene hacia nuestro territorio para pasar el invierno austral, sin embargo también hay reportes de poblaciones reproductivas residentes.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Extremo norte de Sudamérica, migran hacia el norte cruzando Bolivia, Paraguay y Amazonas, hasta llegar a Colombia y Venezuela	Campos con árboles y arbustos espaciados, pastizales o incluso jardines en áreas urbanas.

Pibí oriental / Eastern Wood-Pewee
Contopus virens

Es un atrapamosas migratorio sin características distintivas en su plumaje, tiene dos barras alares blanquecinas. La base del pico usualmente es anaranjada pero difícil de ver. Es usualmente visto en una percha alta para raudamente salir volando para atrapar a sus presas en vuelo, aunque también las atrapa entre la vegetación.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Nidifica en América del Norte, migrando al sur en el otoño, llegando hasta el centro oeste de América del Sur.	Arboleda, bosques de pino y encino y arboledas de álamos y sauces a lo largo de arroyos.



Pibí occidental / Western Wood-Pewee
Contopus sordidulus

Es un atrapamosas migratorio casi idéntico al Pibí oriental, pero en Estados Unidos se separan por sus rangos. En otras partes donde ambos están presentes se observan las sutiles diferencias del pico y barras alares. Usualmente visto en una percha alta mientras busca su presa, luego sale para capturar insectos y regresar al mismo sitio.



DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Cría en los bosques abiertos del oeste de Norteamérica. En Invierno migra a Sudamérica a través de Centroamérica y las Antillas.	Bosques de pino y encino, coníferas de follaje abierto y arboledas cercanas a ríos.



Zorzal buchipecoso / Swainson's Thrush
Catharus ustulatus

Es un bello zorzal que se caracteriza por su aspecto pecoso claramente definido en la parte superior del pecho volviéndose más borrosos hacia el vientre. Su canto es como una flauta y con frecuencia se ve forrajeado entre los arbustos de nuestro municipio cuando entra en época de migración.

DISTRIBUCIÓN	HÁBITAT
Se reproduce en Alaska, Canadá, en el norte y el oeste de EE.UU. Pasa el invierno del norte sobre todo en América del Sur, al este de los Andes.	Bosques abiertos, matorrales, en crecimiento a orillas de arroyos.

BIBLIOGRAFÍA

HILTY, S. L. & BROWN, W. L. (1986). A GUIDE TO THE BIRDS OF COLOMBIA. PRINCETON UNIVERSITY PRESS,PRINCETON.

HILTY, S. L. & BROWN, W. L. (2001). GUÍA DE LAS AVES DE COLOMBIA. CALI: SAO-UNIVERSIDAD DEL VALLEY AMERICAN BIRD CONSERVANCY.

NATIONAL AUDUBON SOCIETY (2014) GUÍA DE AVES DE AMÉRICA DEL NORTE.

SULLIVAN, B.L., C.L. WOOD, M.J. ILIFF, R.E. BONNEY, D. FINK, AND S. KELLING. 2009. EBIRD: A CITIZENBASEDBIRD OBSERVATION NETWORK IN THE BIOLOGICAL SCIENCES. BIOLOGICAL CONSERVATION 142:2282-2292.

