Maxforce® PLATIN



INSECTICIDA

Descripción de producto

Maxforce® Platin es una formulación de cebo con gel insecticida de uso profesional especializado, listo para usar y controlar diferentes tipos de cucarachas y lepismas (pececillo de plata).
Contiene el ingrediente activo Clotianidina al 1,00% e incluye en su formulación de gel un conjunto de ingredientes alimenticios sumamente atractivos para las cucarachas y para las ninfas en particular. **Maxforce® Platin** contiene igualmente un agente de sabor amargo para evitar ingestiones accidentales.

Espectro de acción

RASTREROS

Cucarachas multiespecie (adultos y ninfas):

// Cucaracha germánica o alemana (*Blattella germanica*).
// Cucaracha común, oriental o negra (*Blatta orientalis*).
// Cucaracha americana o roja (*Periplaneta americana*).
// Lepisma (pececillo de plata) (*Ctenolepisma longicaudatum*).



Blattella germanica | *Blatta orientalis* | *Periplaneta americana* | *Ctenolepisma longicaudatum*

Peligro y prudencia



ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH208	Contiene 1,2-bencisotiazolin-3-ona y 5-cloro-2-metil-isotiazol-3-ona/2-metil-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P391	Recoger el vertido.
P501	Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Escenarios de utilización

// Edificios industriales y comercios.
// Áreas domésticas/privadas.
// Edificios públicos (p.e. colegios, hospitales, residencias asistidas).

Datos

Registro: ES/MR(NA)-2019-18-00658.
Composición: Clotianidina 1% (grado puro)
1,026% (grado técnico).
Formulación: Cebo insecticida en gel – listo para su uso (RB).
Presentación: Blíster con 4 cartuchos de 30 g.
Periodo de estabilidad del producto: 2 años.

Equipo de protección

Protección manos: Guantes de protección cumpliendo con la directiva EN 374:
- Material: Caucho nitrilo.
- Tasa de permeabilidad: > 480 min.
- Espesor del guante: > 0,4 mm.

Protección de los ojos: Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).

Protección piel y cuerpo: Utilizar un mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 6.

Certificaciones

// Certificación de seguridad alimenticia HACCP.
// Formulación exenta de aceite de palma.

Dosis y usos autorizados

Ámbito de utilización	Método de aplicación	Categoría de usuario	Plazo de reentrada
INTERIORES	**Localizada en forma de gota. Con jeringa dosificadora**	**Profesional especializado**	**No requiere**

Espectro de acción	Dosis infestación moderada (raramente se ven cucarachas durante el día)	Dosis infestación intensa (suelen verse cucarachas durante el día)	Frecuencia
Cucaracha pequeña (rubia o alemana ninfas y adultas)	0,1 g/m^2 (1 punto x 0,1 g)	0,2 g/m^2 (2 puntos x 0,1 g)	No aplicar más de una vez al mes
Cucaracha grande (negra u oriental ninfas y adultas)	0,2 g/m^2 (2 puntos x 0,1 g)		
Cucaracha roja o americana (ninfas y adultas)	0,2 g/m^2 (2 puntos 0,1 g) 0,3 g/m^2 (2 o 3 puntos x 0,1 g)		
Lepismas	0,1422 g/m^2		

Relación diámetro/peso de las gotas: - una gota de 7 mm ≈ 0.1 g - una gota de 3 mm ≈ 0.007 g - una gota de 2 mm ≈ 0.002 g

Instrucciones de uso

Maxforce® Platin se dispensa mediante un aplicador de gel o de una jeringa adecuados.

Antes del tratamiento, los usuarios deben estudiar el área que se va a tratar para identificar lugares de infestación de cucarachas y lepismas.

El cebo se aplica en lugares disimulados, como son cantos, bordes, rendijas, agujeros, etc, y siempre lo más cerca posible de los refugios.

Deben eliminarse del área infestada todas las fuentes naturales de alimentos apetecibles para las cucarachas para favorecer la ingestión del cebo.

Cabe esperar un efecto muy rápido sobre la población de cucarachas, observándose cucarachas muertas a las 24 horas del tratamiento. Los niveles máximos de control se alcanzan entre seis días y dos meses después del tratamiento según el nivel de infestación y siempre que el gel esté presente. En caso de niveles de infestación altos, examinar los puntos aplicados del producto biocida periódicamente (una vez al mes) y realizar aplicaciones adicionales según proceda. No obstante, no se debe aplicar más de una vez al mes.

CONTROL DE CUCARACHAS PEQUEÑAS

// Los cebos en gel deben permanecer aplicados al menos 14 días para una eficacia óptima. Un mes después, se pueden volver a aplicar cebos en gel frescos nuevos si siguen viéndose cucarachas.

CONTROL DE CUCARACHAS GRANDES

// Los cebos en gel deben permanecer aplicados al menos 4 semanas para una eficacia óptima. Si siguen viéndose cucarachas, se pueden volver a aplicar cebos en gel frescos nuevos.

CONTROL DE LEPISMAS

// Aplicar muchas gotas pequeñas en áreas en las que se oculten y vivan las lepismas. Estas áreas pueden estar debajo y detrás de rodapiés y zócalos y debajo de revestimientos de madera o de otras áreas que proporcionen cobertura.

// Los cebos en gel deben permanecer aplicados al menos 8 semanas para una eficacia óptima. Si siguen viéndose lepismas, se pueden volver a aplicar cebos en gel frescos nuevos. La dosis de aplicación corresponde a aproximadamente 20 puntos de 3 mm de diámetro por metro cuadrado o 65 gotas de 2 mm de diámetro por metro cuadrado.

Otras recomendaciones de uso

// Una vez completado el tratamiento, retirar el cartucho vacío y eliminarlo de forma segura. Si el cartucho solo se ha usado parcialmente, retirarlo del aplicador, cerrarlo con la tapa proporcionada y guardarlo conforme a las instrucciones.

// No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

// Coloque los puntos de cebo en lugares inaccesibles para niños o mascotas.

// No aplique en superficies donde se almacenan, preparan o comen alimentos o piensos.

// Evite la aplicación en lugares excesivamente polvorientos, húmedos o grasientos, y en superficies sujetas a limpieza húmeda.

// No aplicar sobre superficies absorbentes, No exponer las gotas de cebo a la luz del sol ni a fuentes de calor. Proteger de la lluvia.

// Información: Algunos materiales sensibles, como los tejidos, pueden teñirse con el producto. En caso de duda, aplicar antes en un área pequeña poco visible.

Bayer CropScience, S.L.
Environmental Science
Av. Baix Llobregat, 3, 5
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Telf: 93 228 40 00
www.es.bayer.es

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.