

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 HOSPITAL PIO XII E.S.E. REINVENTANDO LA SALUD MENTECU DE HECHO NIT. 891.201.845-2
	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	

ACTIVIDAD N°4

**Promocionar las “18 prácticas
claves -AIEPI” en prácticas
familiares que fortalezcan el
cuidado yrotección de niñas y
niños, através de jingles con
enfoque diferencial**

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

DIMENSION							
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN LA POBLACIÓN INFANTIL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO							
TIPO DE INTERVENCION	I10601 INFORMACIÓN EN SALUD EN PRÁCTICAS DE CUIDADO Y CRIANZA						
INTERVENCION	Promocionar las "18 prácticas claves - AIEPI" en prácticas familiares que favorezcan el cuidado y protección de niñas y niños, a través de jingles con enfoque diferencial.						
ENTORNO	COMUNITARIO						
OBJETIVO DE LA INTERVENCION							
Promocionar las "18 Practicas claves-AIEPI prácticas familiares que favorezcan el cuidado y protección de niñas y niños, a través de jingles con enfoque diferencial.							
POBLACION SUJETO	Juventud	MICROTERRITORIO		6			
DESARROLLO DE LA INTERVENCION							
MUNICIPIO	Sibundoy	AMBITO	URBANA	☒ RURAL	RURAL DISPERSA		
LUGAR	Emisora SELECTA	FECHA	9/07/2023	DURACION	2 horas		
DESCRIPCION DEL PROCESO DE ARTICULACION							
Se realiza el proceso de articulación con el señor CARLOS ESTEBAN PATIÑO coordinador de la emisora Selecta de Sibundoy Putumayo.							
DESCRIPCION DEL PROCESO DE CONVOCATORIA							
Una vez realizada la articulación con el coordinador de la emisora, se ostenta que el mensaje debe ser transmitido con una frecuencia de 1 vez por semana durante tres semanas que se pueda oír en todo el Alto Putumayo.							
DESCRIPCION DE LA INTERVENCION							
El día 9 de julio se da inicio a la transmisión por emisora y por la pagina del Hospital PIO XII, se evidencia que se tiene 300 visitas en la pagina del Hospital en el jingle publicado.							
CONTENIDO TEMATICO DE LA INTERVENCION							
<p>Se da inicio explicando que significa AIEPI.</p> <p>AIEPI - Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia - es una estrategia que tiene como finalidad disminuir la mortalidad y la morbilidad en los niños menores de cinco años y mejorar la calidad de la atención que reciben en los servicios de salud y en el hogar.</p> <p>AIEPI, busca incorporar en los servicios de salud una evaluación integrada e integral de los niños cuando entran en contacto con un profesional o técnico en</p>							

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

salud, ya sea en una institución o en la comunidad y, así mismo, incluir dentro de las acciones cotidianas de distintos actores sociales, actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

¿Cuáles son sus objetivos?

- Contribuir a la reducción de la mortalidad en la infancia.
- Reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades y problemas de salud que afectan a los niños.
- Mejorar el crecimiento y el desarrollo durante los primeros cinco años de vida de los niños.

Práctica 1. Amamante a su bebé, de manera exclusiva, durante los seis primeros meses.

Práctica 1 Fomentar la lactancia materna exclusiva.

- A los niños hay que alimentarlos con leche materna hasta los seis meses de edad.
- Lactancia materna a libre demanda, no incluir agua, jugos ni bebidas.
- La leche materna quita la sed.
- La succión estimula la producción de leche.
- Es bueno acariciar, hablar y mirar al bebé mientras se le está dando el pecho.

1. La leche materna es el primer y mejor alimento en la vida de los bebés y es una fuente de hierro y vitamina A.
2. Inmediatamente después del parto, la madre debe amamantar al recién nacido. Así crecerá sano, fuerte y feliz. La leche que sale del pecho poco después del parto, también llamada primera leche o calostro, es el mejor alimento para el bebé porque posee sustancias que lo protegen de muchas enfermedades.
3. La leche materna, durante los seis primeros meses de vida, satisface todas las necesidades nutricionales de la y el bebé. No necesita de otro alimento, ni agüitas. Se le debe dar pecho tantas veces como él y la bebé pida, por lo menos diez veces durante las 24 horas.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

4. La lactancia materna facilita la labor de la madre porque no necesita prepararse, ni utilizar recipientes.

5. La leche materna es el alimento más económico para el bebé.

Práctica 2. A partir de los seis meses de edad, suministre a los niños alimentos complementarios recién preparados, de alto contenido nutricional y energético, continuando al mismo tiempo con la lactancia materna hasta los dos años o más.

Práctica 2 Alimentación complementaria después de los 6 meses de edad.

- A partir de los seis meses el niño debe comer PAPILLAS ESPESAS de cereal, verduras y frutas.
- El niño debe comer tres veces al día: desayuno, almuerzo y comida, y tomar dos refrigerios entre las comidas: fruta, leche, pan, etcétera.
- Continuar con la lactancia materna hasta que el niño cumpla los dos años.



Una alimentación balanceada para los niños debe incluir los siguientes alimentos según la edad apropiada:

1. Cereales, tubérculos y plátano: dan calor y energía.
2. Verduras y frutas: dan vitaminas y ayudan a evitar las enfermedades.
3. Carnes, huevos y leguminosas secas: dan hierro y ayudan a formar y dar fuerza a los músculos, huesos, sangre, piel, cabello y demás partes del cuerpo. Es necesario retirar la piel del pescado para evitar alergias a la grasa, además se debe tener cuidado con las espinas.

Práctica 3: Aumente el consumo de alimentos como: ahuyama, arracacha, papaya, zanahoria, acelga y espinaca, para proporcionar dosis suficiente de vitamina A, combinados con vísceras, hígado y carne que proporcionan dosis de Hierro y Zinc.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

Práctica 3 Dar micronutrientes al niño.

- Sobre todo VITAMINA A, HIERRO y ZINC, se encuentran en cierto tipo de alimentos que se les deben dar a los niños o Brindarlos como suplemento, es decir, además de sus alimentos.
- LA VITAMINA A protege las mucosas y estimula la formación de anticuerpos que son las defensas del cuerpo contra las enfermedades.
- EL HIERRO previene la anemia y hace que los niños sean más atentos y activos, al mismo tiempo que los protege de las infecciones.

¿Cree usted que es importante darle hierro y vitaminas a su hijo?

1. A partir de los seis meses de edad, la alimentación de los niños debe incluir frutas y verduras de color anaranjado o verde, sal yodada y carnes porque ayudan a su crecimiento y desarrollo gracias a su contenido en hierro y vitaminas.
2. A partir de los seis meses de edad hasta los cinco años de edad, los niños pueden recibir suplemento de hierro a una dosis de 2 mg/kg/día de hierro elemental durante 30 días cada seis meses.
3. Un suplemento de zinc ayuda a disminuir la duración y gravedad de la diarrea en los niños. Además, previene nuevos episodios de diarrea durante los dos a tres meses siguientes. También es esencial en el tratamiento de la desnutrición.
4. La dosis recomendada de zinc para administrar en el caso de niños con riesgo de problema del crecimiento es la mitad de la dosis de zinc recomendada para el tratamiento de la diarrea, es decir, 5 más en el menor de seis meses y 10 más en el mayor de seis meses.

Práctica 4: Promueva el desarrollo mental y social del niño, respondiendo a su necesidad de atención. Procure estimularlo mediante: conversación, juegos y otras interacciones físicas y emocionales apropiadas, llévelo oportunamente al Control de Crecimiento y Desarrollo.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

Práctica 4 Afecto, cariño y estimulación temprana.

- Los niños necesitan MUCHO CARIÑO y SER ESTIMULADOS para desarrollar su inteligencia y sus habilidades.
- Los controles de crecimiento y desarrollo cada 6 meses durante los primeros años de vida en el establecimiento de salud para determinar que sean normales.
- El juego es una necesidad vital y un modo de expresión en la etapa infantil, que permite desarrollar las capacidades motoras mentales, afectivas y sociales.
- Es necesario utilizar vocabulario sencillo y claro, articulando correctamente palabras y frases sin deformaciones.




¿Qué actividades realizan en la familia o en la comunidad que repercuten positivamente en la protección de la salud de los niños?

1. Las madres y los padres deben pasar más tiempo con sus hijos. Ellos se desarrollan mejor cuando sus padres les hablan, escuchan y juegan con ellos. Esto se llama estimulación adecuada y ayuda a desarrollar su inteligencia y les da seguridad.
2. Un niño que se desarrolla bien físicamente crece en talla y aumenta de peso en forma regular.
3. La familia debe compartir actividades con el bebé, aun cuando parezca muy pequeño. Hay que hablarle, reírse con él, abrazarlo y mostrarle cariño.
4. Tres momentos especiales para el niño son: cuando toma pecho o come, cuando lo cambian o bañan y al momento de dormir.
5. Los niños necesitan saber que tienen la aprobación de las personas importantes en su vida. Aprobarlos es aplaudirlos y felicitarlos cuando tienen éxitos; por ejemplo, aplaudirlos cuando cogen un sonajero o simplemente cuando dicen su primera palabra.
6. Los niños aprenden mejor a las buenas que a las malas. El castigo físico, las groserías o los gritos van en contra del desarrollo del niño. Puede marcarlos para toda la vida.
7. Lleve mensualmente el control del crecimiento y desarrollo del niño.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

Práctica 6 Saneamiento básico.

- A los niños hay que darles un ambiente limpio, sin heces y sin basura. Agua apta para el consumo y estimular la práctica del lavado de manos.
- Recoger y almacenar el agua en recipientes limpios, el cual debe estar cubierto, sacar el agua con cucharón de mango largo sólo usado para dicho fin; estos se deben vaciar y enjuagar todos los días.
- No comer los alimentos crudos excepto frutas, verduras y hortalizas enteras que se hayan lavado antes de comer. Lavar las manos después de defecar y antes de manipular o comer alimentos.



¿Cómo realizan la disposición final de las heces?

1. La familia debe lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos, antes de comer y dar de comer al niño, después de hacer sus necesidades, y después de cambiar los pañales del bebé.
2. Las heces, incluyendo las de los niños, deben desecharse en forma segura, poniéndolas en el servicio sanitario o en una fosa cubierta.
3. La forma más efectiva de evitar la diarrea es tomar agua segura, ya sea hervida o filtrada.
4. Se debe hervir el agua para el consumo de la familia, el lavado de manos y de alimentos.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

8. Todos los niños necesitan aprender a ser disciplinados. Para disciplinar al niño se deben tener reglas claras y de acuerdo con su edad. Por ejemplo: comer en la mesa, dormir a horas determinadas y recoger los juguetes. Las reglas se enseñan con firmeza, nunca con gritos, ni castigos físicos.

Práctica 5: VACUNACION: Lleve a su niño o niña en la fecha prevista para que reciba el esquema de vacunación de acuerdo a su edad.

Práctica 5 Hay que vacunar a todos los niños.


- La mejor protección son las VACUNAS, se ponen por dosis de acuerdo con la edad del niño. Son totalmente gratuitas y suministradas por la institución de salud.
- A veces, algunas vacunas pueden causar un poco de dolor, malestar y fiebre después de su aplicación; estas molestias pasan rápidamente.
- Es indispensable guardar y conservar el carnet de vacunas y llevarlo cada vez que se asista a un centro de salud.

¿Cuál ha sido su experiencia con las vacunas de sus hijos?

1. Los niños deben recibir todas sus vacunas en las fechas establecidas, durante su primer año de vida, así crecerán sanos y felices y estarán protegidos contra muchas enfermedades. La vacunación es un acto de amor y protección.
2. Si no ha recibido las vacunas correspondientes según la edad, deberá acudir a la institución de salud para que complete los esquemas de acuerdo con las normas técnicas establecidas.
3. Si el niño tiene resfrío, diarrea o fiebre puede ser vacunado sin riesgo alguno.
4. Las vacunas no causan ningún daño; después de la aplicación algunos niños presentan un poco de malestar o fiebre, pero esto pasa con rapidez.
5. Es importante cuidar y conservar en buen estado el carné de vacunación de los niños.

Práctica 6: Higiene adecuada: Promueva el consumo de agua potable, lavado de manos como hábito familiar, aseo personal y manejo correcto de basuras y materias fecales o excretas.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020



Agua segura:

1. Hervir el agua cinco minutos.
2. Mantener tapado el recipiente del agua hervida.
3. Almacenarla en recipientes con tapa y llave para su disposición y utilización
4. Es conveniente depositar el agua hervida en un recipiente limpio. Evite mezclarla con el agua que tenía depositada.
5. Utilizar un filtro casero también garantiza agua segura para el consumo de la familia.

Aseo personal:

1. La familia, incluyendo a los niños, se deben bañar diariamente con agua y jabón.
2. Se debe evitar secarse las manos con trapos sucios.
3. Siempre se debe mantener limpia la cara y la nariz limpia de los niños.
4. Las uñas de los niños y las personas adultas se deben mantener cortas y limpias.

Mantenimiento y precaución en la vivienda:

1. Se deben limpiar las superficies y ropas con cantidad adecuada de desinfectantes.
2. El ambiente de la casa se debe mantener libre de humo. Las personas adultas o familiares no deben fumar dentro de la casa.
3. Es importante evitar los olores fuertes como cera, perfumes, laca, rociadores, entre otros.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

4. Se recomienda forrar el colchón y las almohadas con telas plásticas impermeables, cambiar las sábanas periódicamente y poner al sol las cobijas, especialmente las de los niños.
5. Para evitar la humedad en la casa se deben reparar las goteras en los techos.
6. Para evitar enfermedades respiratorias se deben eliminar diariamente el polvo de pisos, muebles y ventanas.
7. Se debe lavar diariamente el sanitario o letrina, con una solución jabonosa y blanqueador.
8. Las basuras se deben depositar en recipientes con tapa o en bolsas plásticas cerradas.
9. Las mascotas deben permanecer fuera de la casa, preferiblemente de las habitaciones y de la cocina.
10. Las mascotas se deben mantener aseadas, bien alimentadas y desparasitadas.
11. Si los niños juegan con las mascotas, se deben lavar sus manos y la cara.

Práctica 7: Medidas preventivas contra el DENGUE Y LA MALARIA: Proteja al niño o niña con toldillo, mosquitero e insecticidas, promueva jornadas de aseo en su localidad.

Práctica 7 Prevención de Malaria y Dengue.

- Muchos de los criaderos de mosquitos del dengue son recipientes o tanques que almacenan agua.
- Tapar los tanques. Sustituir con tierra o arena el agua de los floreros y cambiar el agua o hacer orificios en el fondo del mismo y en otros posibles criaderos.
- En las áreas públicas toda la comunidad debe cooperar con las autoridades para evitar que los sumideros de aguas lluvias, llantas, inservibles, basuras y otros lugares se vuelvan criaderos de zancudos.
- Utilización de toldillos en las camas.

¿Usa toldillo para dormir?

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el zancudo hembra *Aedes aegypti* o conocido popularmente como “zancudo saraviado” o zancudo patas blancas. La malaria es una enfermedad parasitaria con manifestaciones agudas

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

y crónicas causada por la picadura del mosquito hembra anopheles previamente infectado con la enfermedad.

Muchos de los criaderos de mosquitos del dengue son recipientes o tanques que almacenan agua limpia o acumulan agua de lluvia en las casas (baldes, bebederos de animales, botes de plantas, botellas, cubiertas, floreros, frascos, juguetes, latas, pilas, tambores, tanques, tinas y llantas viejas). Los mosquitos ponen sus huevos, que en el agua se transforman en las larvas y en 8 días estas se convierten en el mosquito. La medida más importante para prevenir el dengue es evitar que los recipientes se transformen en criaderos del mosquito:

Medidas preventivas en zonas endémicas:

1. Limpiar las paredes internas de los recipientes como pilas de lavar ropa y tanques, con cepillo, una vez por semana (desocupar, cepillar las paredes, enjuagar)
2. Tapar los tanques y sustituir con tierra o arena el agua de los floreros, cambiar el agua o hacer orificios en el fondo de floreros y otros posibles criaderos
3. Evitar la acumulación de botellas e inservibles que puedan acumular agua

Disposición de las basuras para evitar los criaderos de mosquitos



En las áreas públicas toda la comunidad debe cooperar con las autoridades para evitar que los sumideros de aguas lluvias, llantas, inservibles, basuras y otros lugares se vuelvan criaderos de zancudos.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

En malaria los criaderos del mosquito están por fuera del domicilio y son propios de ambientes más rurales o de las periferias de las ciudades: lugares con vegetación donde el agua corre lento en ríos y caños, canales de riego, áreas inundadas, lagunas, charcos, estanques para criaderos de peces. El drenaje, relleno y la limpieza de vegetación son medidas de gran utilidad dependiendo del criadero.

Medidas para disminuir el riesgo de picaduras por mosquitos de dengue y malaria

1. Colocar mallas metálicas en puertas y ventanas
2. Utilización de toldillos en las camas. En malaria es la medida más importante, e idealmente los toldillos deben ser impregnados con insecticidas
3. Si hay casos de dengue, rociar las áreas habitables y de descanso con un insecticida

Atención a los síntomas: En zonas endémicas se debe llevar al niño a la institución de salud más cercana para su evaluación, si presenta:

1. Fiebre, escalofríos o sudoración sin causa aparente.
2. Erupciones en la piel y hemorragias leves o moderadas.

Práctica 8: Adopte y mantenga hábitos apropiados para la prevención y atención del VIH SIDA.

Práctica 9 Llevar a los niños al odontólogo desde los primeros meses de edad.

- A los niños, desde los primeros días de vida, se les debe realizar la limpieza y masajes de las encías todos los días. El cepillado, con la salida del primer diente, desde entonces procure asistir a la primera consulta odontológica para que aprenda los métodos preventivos y de higiene oral.
- Después de la última limpieza en la noche, no dé alimentos al bebé, solo agua.

¿Sabe cómo se transmite el VIH/SIDA?


 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

El SIDA es una enfermedad producida por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que ataca las defensas del cuerpo hasta dejar a la persona infectada desprotegida ante cualquier enfermedad.

1. La transmisión del virus VIH se produce por contacto sexual, transfusión de sangre contaminada y de la madre infectada al feto durante el parto o durante la lactancia.
2. La transmisión del virus se puede prevenir con conductas sexuales responsables, además del uso correcto del condón en las relaciones sexuales.
3. La transmisión del virus VIH de la madre a su hijo se puede prevenir a través de un diagnóstico temprano durante el embarazo, seguido de un tratamiento adecuado.
4. Las personas que viven con el VIH, especialmente niños, tienen los mismos derechos y necesidades que otras personas y necesitan tratamiento, adecuada nutrición, atención, amor, educación, albergue y apoyo de las personas que los rodean (familias, comunidades y trabajadores de la salud).
5. La transmisión a través de transfusiones se evita garantizando que el banco de sangre cumpla con las medidas de bioseguridad y control de calidad de sangre.
6. A la hora del parto de una madre infectada con el virus VIH, debe recibir atención especial para hacerle el control respectivo a ella y a su bebé.

Práctica 9: Mantenga una adecuada HIGIENE ORAL: limpie las encías con gasa humedecida y promueva el correcto cepillado de los dientes, 3 veces al día o después de cada comida.

Limpieza y masaje en la encía del bebé



Orientación prenatal

1. Durante el embarazo la madre debe asistir a controles odontológicos

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

2. Se debe aumentar el uso de la seda dental y el cepillado. Esto ayuda a reducir el riesgo de compartir las bacterias de la boca de la madre a el bebé.

Primeros seis meses o antes de la erupción de los primeros dientes

1. Limpieza y masajes de las encías del niño

- Limpie las encías de su bebé con un paño previamente hervido o gasa: humedézcalo y limpie delicadamente de arriba hacia abajo masajeando suavemente las encías pasándola de cinco a diez veces y de derecha a izquierda.
- Si sale sangre de las encías se debe acudir inmediatamente al médico.
- Evite compartir alimentos o elementos de su boca a la boca del bebé. Las bacterias de la saliva de la persona adulta se propagan en la boca del bebé durante la primera dentición y así surge la caries.

Después de la erupción del primer diente

1. Procure asistir a la primera consulta odontológica para que aprenda los métodos preventivos y de higiene oral.
2. Para aliviar las molestias de la salida de los dientes, dé un rasca encías de caucho, un paño previamente hervido y humedecido en agua fría o algún tipo de legumbre limpia y grande (zanahoria) para evitar que se la trague.

Cepillado adecuado de los dientes, lengua y encías de los niños



Desde la aparición del primer diente hasta la salida total de los dientes temporales o de leche (aproximadamente dos a tres años).

El cepillado de los niños es responsabilidad de las personas adultas, por eso:

1. Lávese las manos muy bien antes de iniciar la limpieza de la boca de los niños.
2. Acueste al niño en sus piernas para que pueda tener mayor visibilidad de los dientes.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

3. Tome seda dental y pásela por cada uno de los dientes desde la última muela al centro. Sin hacer mucha presión deslícela suavemente desde la base de las encías hacia afuera.
4. Luego cepille los dientes de su bebé con cualquier cepillo pequeño sin mojarlo y con una crema sin flúor. Aplique una pequeña cantidad de crema, del tamaño de una arveja. Si no tiene crema sin flúor no la use.
5. Primero se cepillan los dientes por la cara externa, diez veces por cada cara del diente; luego hágalo en la parte interna y termine por la parte de encima de los dientes y muelas.
6. Limpie finalmente la lengua del niño con el mismo cepillo, pasándolo con cuidado de no estimular el vómito, hasta que quede rosada.
7. Después de la última limpieza en la noche, no dé más alimentos a su bebé, solo agua.
8. Si al niño le da miedo la cepillada, puede darle un espejo para que vea cómo se realiza la limpieza y así genere un espacio de confianza y amor con su hijo.
9. Visite al odontólogo cada seis meses como mínimo, o menos si el odontólogo lo cree necesario.

Práctica 10: Proteja a los niños del contacto con enfermos de TBC-TUBERCULOSIS o llévelo al centro de salud si presenta tos y fiebre por más de 3 semanas.

Práctica 11 Alimentación del niño enfermo en el hogar.

Cuando el niño tiene diarrea:

- Si el bebé está enfermo y tiene menos de 6 meses, hay que darle solo leche materna, más veces y por más tiempo.
- Si el bebé está enfermo y tiene más de 6 meses, hay que darle su alimentación habitual y muchos líquidos.
- Si es posible, se debe aumentar la frecuencia y el número de raciones hasta que el niño se recupere.



¿Conoce algo respecto a la Tuberculosis?

1. Los niños que viven con personas enfermas de Tuberculosis o que reciben visitas de personas que están enfermas o en tratamiento, deben asistir a la institución de salud para hacerles la evaluación y determinar si están enfermos para suministrarles el tratamiento. Si se descarta la enfermedad, a los niños menores de cinco años, se les debe proporcionar el medicamento preventivo.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

2. A todos los niños recién nacidos se les debe aplicar la vacuna contra la Tuberculosis (BCG).
3. Si un niño presenta tos persistente que no mejora ni disminuye, durante tres semanas o fiebre prolongada, llévelo a la institución de salud para que sea evaluado y se aclare si está enfermo de Tuberculosis; en ese caso se le debe suministrar el tratamiento.
4. Si un niño pierde o no gana peso durante tres meses y además presenta tos persistente, llévelo a la institución de salud para que sea evaluado. Puede estar enfermo de Tuberculosis u otra enfermedad crónica.
5. Contribuya con las autoridades sanitarias en la búsqueda del caso fuente o persona que transmitió la Tuberculosis al niño. Es decir, solicite que se le realice la baciloscopia a la persona adulta que presenta síntomas como: tos por más de quince días, fiebre y escupe con sangre.

Práctica 11: Continúe alimentándose y dando líquidos a los niños, especialmente leche materna, cuando están enfermos.

¿Cuánto líquido dar?

- Ofrecer al niño tanto líquido como quiera recibir de manera voluntaria, cada vez que haga diarrea y mientras dure la misma.

La madre debe llevar a su hijo al servicio de salud si:

- Comienza las deposiciones líquidas con mucha frecuencia Vomita repetidamente. Tiene mucha sed. No come ni bebe normalmente. Tiene fiebre. Hay sangre en las heces. El niño no experimenta mejoría al tercer día.

Cuando el niño tiene gripa:

- Evitar contacto con personas con gripa, si es necesario que esté con personas enfermas, debe instruirse para que se laven las manos antes de tocar al niño y utilicen tapabocas.
- Lavado de manos: se deben lavar las manos: después de toser o estornudar, después de sonarse o tocarse la nariz o la boca, antes y después de cada comida, después de entrar al baño o cambiar los pañales del bebé, después de jugar o tocar objetos comunes, cuando estén visiblemente sucias.



¿Qué dificultades tiene para alimentar a sus hijos cuando están enfermos?

1. Si un niño menor de seis meses se enferma se debe continuar alimentando con leche materna exclusivamente.


 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

2. Un niño enfermo, menor de seis meses y con fiebre, puede perder muchos líquidos; es necesario amamantarlo más frecuentemente mientras dure la enfermedad.
3. Si el niño enfermo es mayor de seis meses, se debe aumentar los líquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y dárselos más veces al día que de costumbre.
4. El niño con fiebre pierde mucha energía. Recuerde que, aunque pierda el apetito, es importante darle más alimentos de lo normal, con el fin de que recupere la energía perdida. Es necesario darle con frecuencia cantidades pequeñas de alimentos blandos y de alimentos que le gusten.
5. Los alimentos ofrecidos deben ser ricos en energía y nutrientes como frijoles triturados y pedazos pequeños de papaya y otras frutas.
6. La leche materna y otros líquidos son especialmente importantes porque alimentan y previenen la deshidratación.
7. El niño debe tomar una comida extra hasta dos semanas después que pase la enfermedad o hasta que recupere su peso.

Práctica 12: Administre a los niños el tratamiento casero apropiado: Suero oral, paños de agua tibia, bebidas endulzadas con miel, tolerancia y paciencia con mucho amor.

Práctica 12 Tratamiento en casa del niño enfermo.


- Evitar bebidas con alto contenido de azúcar.
 - Solución de Sales de Rehidratación Oral: El suero oral es el mejor medicamento para prevenir y tratar la deshidratación.
 - Agua combinada con una dieta que incluye alimentos fuente de almidón como arroz y papa, de preferencia con sal, es un tratamiento adecuado para la mayoría de los niños con diarrea.
- Otra opción es dar agua y galletas saladas ó pasabocas como rosquitas que contienen almidón y sal.



¿Qué remedio casero le da a su hijo cuando tiene fiebre? ¿Qué creencia tiene con respecto a las enfermedades de su hijo?

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

1. Un niño se debe llevar inmediatamente a la institución de salud más cercana, si presenta alguno de estos signos: no puede mamar o tomar líquidos, vomita todo, tiene convulsiones, está como dormida o dormido y no puede despertar; si tiene respiración rápida o dificultad para respirar.
2. Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria.
3. Si el niño tiene tos, suministre más líquido y alimentos.
4. Si el niño tiene fiebre, suministre más líquidos; siga alimentándolos y no los abrigue demasiado. Dele una dosis de acetaminofén para bajar la fiebre. Si es jarabe de 125 mgs por 5 cc, suministre la mitad del peso del niño en mililitros. Si es en gotas, suministre dos gotas por cada kilo de peso del niño.



Receta a base de papa:

- Ingredientes: dos papas de tamaño mediano, media cucharadita tintera de sal, un litro de agua.
- Preparación: se pelan y se pican las papas, se ponen en una olla con un litro de agua y media cucharadita tintera de sal, se pone a cocinar durante media hora, se licúa, se deja enfriar y se le da al niño. Debe insistirse en que debe ser muy cuidadoso en la medida de la sal.

Receta a base de arroz tostado

- Ingredientes: ocho cucharadas de arroz, media cucharadita de sal, un litro de agua.
- Preparación: se tuesta el arroz en un sartén, sin agregar grasa, cuando esté tostado, se muele. Se ponen en una olla ocho cucharadas soperas rasas del polvo de arroz tostado, un litro de agua y media cucharadita tintera de sal. Se cocina durante quince minutos, se deja enfriar y se le da al niño.

Receta a base de plátano

- Ingredientes: medio plátano verde, un litro de agua, media cucharadita tintera de sal.
- Preparación: se pela y se pica medio plátano verde, se pone en una olla con un litro de agua y media cucharadita tintera de sal, se cocina durante media hora, se licúa, se deja enfriar y se le da al niño.

- A los niños menores de dos años: 50-100 ml (un cuarto a media taza) de líquido
- A los niños de dos a diez años: 100-200 ml (de media a una taza)
- A los niños mayores o personas adultas: tanto como deseen

Cuidados en el hogar para la diarrea:

1. Se le debe dar al niño más líquido de lo habitual para prevenir la deshidratación, preferiblemente leche materna o sales de rehidratación oral (SRO): disuelva un sobre de SRO en un litro de agua fría, hervida.
2. No se les deben suministrar bebidas con alto contenido de azúcar, como los refrescos muy endulzados, las bebidas gaseosas, las bebidas hidratantes para deportistas y los jugos de frutas preparados industrialmente. También deben evitarse los purgantes y estimulantes como el café y las infusiones de hierbas como la manzanilla.


 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

3. Se les debe suministrar agua combinada con alimentos como arroz y papa, de preferencia con sal. Otra posibilidad es dar agua y galletas saladas o pasabocas como rosquitas que contienen almidón y sal.

En niños menores de dos meses:

- Se debe mantener la lactancia materna exclusiva, es decir, no suministrar ningún otro alimento distinto a la leche materna.

Tratamiento casero apropiado para la fiebre



Cuidados en el hogar para la fiebre:

1. Dele más líquido de lo habitual.
2. El uso de medicamentos para bajar la fiebre debe ser considerado en niños que se observan deprimidos, incómodos o no se observan bien. Si ese es el caso, suminístrele acetaminofén (la mitad del peso del niño en mililitros).
3. Si el niño a pesar de la fiebre se aprecia bien, no es necesario suministrarle medicamento para bajar la fiebre.
4. Si el bebé es menor de dos meses, se debe continuar con la lactancia materna exclusiva.

Cuidados en el hogar para el resfrío:

1. Se debe evitar el contacto con fumadores; no debe existir humo de cigarrillo dentro del hogar donde viven niños.
2. Se debe evitar el contacto con personas con gripa. Si esto no es posible, los enfermos deben lavarse las manos antes de tener contacto con los niños y usar tapabocas.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

Tratamiento casero apropiado para el resfrío




3. Si el bebé es menor de seis meses, tiene flemas y tos, debe tomar leche materna exclusivamente. Si ya no está lactando debe tomar más agua.
4. Para aliviar la tos y el dolor de garganta dele a su hijo bebidas aromáticas o té. Si es mayor de dos años de edad puede administrarle miel.
5. Mantener fosas nasales destapadas, administrando con frecuencia suero fisiológico por ambas fosas nasales y limpiando las secreciones de la nariz.
6. Evitar el exceso de ropa y cubrir boca y nariz del niño con una bufanda, cuando va a cambiar de temperatura, principalmente en las mañanas y en las noches.
7. Hay que enseñar a los niños y sus padres que al toser y estornudar lo hagan de la siguiente manera:
 - Colocar un pañuelo de papel desechable o papel higiénico sobre boca y nariz al toser o estornudar y posteriormente botarlo a la basura y lavarse las manos.
 - Cuando no sea posible acceder a papel desechable, se debe hacer sobre la flexura del codo.
8. Se debe ventilar a diario la casa y la habitación del niño enfermo.
9. Si el niño tiene la nariz tapada prepare una solución salina: un cuarto de una cucharadita de sal disuelta en medio litro de agua tibia y aplíquela en cada fosa nasal para que pueda respirar y comer.
10. No administre medicamentos, antibióticos o jarabes para la tos a menos que sean formulados por el médico.

Práctica 13: Tome las medidas adecuadas para prevenir y controlar lesiones y accidentes en los niños.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

- Hay accidentes y lesiones que no ocurren por casualidad o mala suerte, sino por FALTA DE CONOCIMIENTO Y DESCUIDO de las personas mayores.
 - Los niños pequeños están descubriendo el mundo, por eso tienen curiosidad por tocar y probar todo lo que ven. Esto es bueno y normal, pero los pone permanentemente en situaciones de riesgo.
- La tarea de los padres y personas en general es CONTROLAR EL RIESGO PARA EVITAR EL DAÑO. Esto se puede lograr con:
- Dejar fuera del alcance de los niños objetos y productos peligrosos como fósforos, velas encendidas, ollas calientes, herramientas cortantes, productos tóxicos, cables eléctricos.
 - Si hay niños pequeños, poner protección (reja, baranda) en los lugares de donde se puedan caer.



¿Cómo reprende a sus hijos cuando hacen algo malo?

El abuso o maltrato de menores abarca toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

¿Cómo practicar el buen trato?

1. Hay que tener reglas claras acerca de los deberes de los niños como comer en la mesa, dormir a cierta hora, recoger los juguetes que se usaron, entre otros.
2. Se debe expresar disgusto con la voz sin necesidad de gritar y de usar el castigo físico. Cuando le hable al niño hágalo a su misma altura.
3. Se debe expresar amor al niño a través de juegos.
4. Se deben aplicar siempre las mismas reglas. Cuando al niño se le permite un día una cosa y otro día no, se confunde.
5. Cuando un hijo comete una falta, se debe explicar por qué estuvo mal lo que hizo. No importa si el niño aún no habla, ellos desde muy temprana edad entienden las razones e interpretan las expresiones de los padres.
6. Es importante escuchar los motivos del niño antes de reprenderlo. Antes de imponer un castigo cuente hasta diez y piense un momento cual será la forma más adecuada de corregirlo. No castigue con rabia, porque puede maltratarlo.
7. No se debe reprender a un niño por algo que pasó mucho tiempo antes, especialmente si es muy pequeño, ni dos veces por un mismo hecho.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

8. Jamás diga a un hijo que es tonto o bruto. Ellas y ellos pueden equivocarse y si cometen faltas debe corregirlas, pero no de manera violenta. Todas las personas cometen errores y no por eso, son tontas o brutas.

9. El castigo físico, los gritos, las amenazas y los insultos no generan respeto, sólo miedo y no son la forma correcta de educar.

Práctica 14: Promueva que el hombre participe activamente en el cuidado de sus hijos y se involucre en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

Práctica 14 Participación el hombre en el cuidado del niño y de la mujer gestante.

- Pueden MOTIVARLOS SOBRE la importancia de tomar ciertas DECISIONES en forma COMPARTIDA con la mamá para beneficio de los niños y de toda la familia, como por ejemplo: vacunar a sus hijos, llevarlos a los controles de salud, buscar atención médica cuando sea necesario, planificar su familia para no poner en riesgo a la mujer y a la familia con partos de riesgo y con hijos que no van a ser atendidos como debe ser.



¿Qué tanto participa el padre en el cuidado de sus hijos y las labores del hogar?

- Es necesaria la participación del padre durante el embarazo, en el momento del parto y en el cuidado del niño y de la madre después del nacimiento.
- Es derecho de la pareja decidir el número de hijos que la familia puede sostener, cuidar y educar.

Los hombres deben apoyar a la mujer en:

1. Demorar el primer embarazo hasta que la mujer haya cumplido por lo menos los 18 años de edad, reduce el riesgo de complicaciones al momento del parto.
2. Durante el embarazo de la madre, el hombre debe conocer los signos de peligro que indican que puede haber alguna complicación, saber cómo actuar y cuidar que ella cumpla con sus controles prenatales.
3. Al momento del parto, debe tratar que ella tenga un parto seguro atendido por personal apropiado.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

4. Después del parto, la pareja y otros integrantes de la familia deben hacerse responsables de:

- Suministrar alimentos adecuados a la madre.
- Cuidar al bebé, limpiar y alimentar a los niños mayores.
- Encargarse de los quehaceres de la casa: cocinar, lavar la ropa, lavar los utensilios de la cocina y limpiar la casa; además de la crianza de los hijos.
- Facilitar que la madre pueda ir al servicio de salud para su control después del parto y el control del recién nacido.

5. Dejar pasar por lo menos dos años entre un embarazo y otro. Así se repone el cuerpo de la madre.

Práctica 15: Evite el maltrato y descuido de los menores y tome medidas correctivas cuando esto ocurra.

- Se debe evitar el maltrato y el descuido de los niños y tomar las medidas necesarias si esto ocurre.
- Los padres deben evitar las situaciones que den pie al maltrato infantil, entre ellas el alcoholismo.
- Todo lo anterior se puede evitar **CONVERSANDO CON LOS NIÑOS** para **DETECTAR** situaciones de **MALTRATO** y referir los casos para que se tomen las medidas adecuadas.

¿Cómo reprende a sus hijos cuando hacen algo malo?

El abuso o maltrato de menores abarca toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

¿Cómo practicar el buen trato?


1. Hay que tener reglas claras acerca de los deberes de los niños como comer en la mesa, dormir a cierta hora, recoger los juguetes que se usaron, entre otros.
2. Se debe expresar disgusto con la voz sin necesidad de gritar y de usar el castigo físico. Cuando le hable al niño hágalo a su misma altura.
3. Se debe expresar amor al niño a través de juegos.
4. Se deben aplicar siempre las mismas reglas. Cuando al niño se le permite un día una cosa y otro día no, se confunde.
5. Cuando un hijo comete una falta, se debe explicar por qué estuvo mal lo que hizo. No importa si el niño aún no habla, ellos desde muy temprana edad entienden las razones e interpretan las expresiones de los padres.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

6. Es importante escuchar los motivos del niño antes de reprimirlo. Antes de imponer un castigo cuente hasta diez y piense un momento cual será la forma más adecuada de corregirlo. No castigue con rabia, porque puede maltratarlo.
7. No se debe reprimir a un niño por algo que pasó mucho tiempo antes, especialmente si es muy pequeño, ni dos veces por un mismo hecho.
8. Jamás diga a un hijo que es tonto o bruto. Ellas y ellos pueden equivocarse y si cometen faltas debe corregirlas, pero no de manera violenta. Todas las personas cometen errores y no por eso, son tontas o brutas.
9. El castigo físico, los gritos, las amenazas y los insultos no generan respeto, sólo miedo y no son la forma correcta de educar.

Práctica 16: Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

- **SEÑALES DE PELIGRO DE NEUMONÍA:** el niño respira rápida y agitadamente; cuando respira se queja y hace ruidos, se le hunde el estómago al tomar aire.
- **SEÑALES DE PELIGRO DE DESHIDRATACIÓN:** Si el niño hace muchas diarreas al día, si hay sangre en las heces, si vomita varias veces, llora sin lágrimas, bebe con mucha sed o no es capaz de beber, no mama o no quiere comer, no se mueve normalmente y no se despierta.
- **SEÑALES DE PELIGRO DE ENFERMEDAD FEBRIL:** el niño está muy caliente, se pone rojo, suda y respira agitado. Tiene cualquier tipo de sangrado: en la orina, en las heces, manchas rojas, como moretones en la piel.
- **SEÑALES DE PELIGRO DE MUERTE:** Si el niño no quiere mamar, no se quiere despertar, le dan "ataques" o convulsiones, vomita todo lo que come, respira agitado y con ruidos y tiene alguna señal de deshidratación se debe llevar urgentemente al establecimiento de salud. Si es un recién nacido, además de los anteriores se debe observar si el bebé tiene el ombligo rojo, con pus y mal olor.




¿Qué signos de alarma nos indican que debemos llevar de inmediato al niño al servicio de urgencias?

Lleve de inmediato al niño al servicio de salud si presenta uno o varios de los siguientes signos generales de peligro: no pueden mamar o tomar líquidos, vomita todo, tiene convulsiones, está como dormido y no puede despertar.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

Práctica 17: Cumpla con los tratamientos dados por el médico y siga al pie de la letra las recomendaciones dadas por el personal de salud y no olvide asistir al control.



Cuando la explicación del médico o la enfermera no ha sido clara ¿usted se devuelve a preguntar?

- Al ser atendido por el personal de salud, asegúrese de haber entendido todas las indicaciones y cumpla con cada una de ellas.
- Nunca cambie el tratamiento que le ha ordenado el médico. Si tiene dudas, consúltelo de nuevo.

Recomendaciones:

1. Dele al niño el tratamiento completo, aun cuando parezca que ha mejorado o que ya está sano o sana.
2. Si no tiene claro la cantidad y la dosis de medicamento que debe administrarle al niño, pregunte al personal de salud.
3. No le dé al niño los medicamentos que hayan sobrado de un tratamiento anterior.
4. Regrese a la institución de salud en la fecha y hora citada para la consulta de seguimiento, aunque el niño parezca estar mejor.
5. Si el niño no mejora o se agrava su estado de salud, vuelva a la institución de salud y de ser posible consulte al mismo personal de salud que lo trató.
6. Recuerde que siempre debe llevar consigo el carné de salud del niño.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

7. Debe llevar a la y el bebé, al niño a la consulta todas las veces que se lo pida el personal de salud, hasta que le digan que ya se recuperó.
8. Cumpla con llevar al niño a la institución de salud cuando el agente comunitario de salud se lo solicite o recomiende

Práctica 18: Promueva que toda mujer embarazada asista al control prenatal y apóyela para que su parto sea atendido en una institución de salud, recuerde que la salud de las mujeres gestantes y de las niñas y niños es responsabilidad.

RESULTADOS DEL PROCESO	
LOGROS	<ul style="list-style-type: none"> Se logra fomentar bases en AIEPI al radioescucha que del alto Putumayo Los oyentes logran identificar las 18 practicas claves para el cuidado de los niños y niñas que se encuentran en su comunidad. Se logra que el jingle llame la atención de las personas y realicen las visitas a la pagina del Hospital y se enteren de la importancia de las "18 Practicas AIEPI"
DIFICULTADES	No se presentan dificultades en la concertación ni en el desarrollo de la actividad
ANALISIS CUALITATIVO DEL RESULTADO DE LA INTERVENCION	
<p>En la actividad realizada del jingle en el alto Putumayo con la radio escucha de la emisora SELECTA, se observó por medio de la página del hospital bastante acogida.</p> <p>En el transcurso de los días se fue evidenciando que eran más los interesados en obtener conocimiento con respecto a las "18 Practicas clave AIEPI", lo cual quiere decir que fue una buena estrategia para lograr que la información sea difundía asertivamente.</p>	
RECURSOS UTILIZADOS PARA DESARROLLAR LA INTERVENCION	
RECURSOS HUMANOS	<ol style="list-style-type: none"> (01) Psicóloga (01) enfermera profesional (01) comunicadora social
RECURSOS MATERIALES	<ol style="list-style-type: none"> Papel bolígrafo

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-PIC-001
	INFORME INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/04/2020

RECURSOS TECNOLOGICOS	1. Equipo de cómputo 2. micrófonos 3. sed de grabación
--------------------------	--



ANEXOS DEL INFORME

	DOCUMENTO	N° de folios
01	Certificación de la emisora	01
02	Pantallazo de la publicación del Jingle	01

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION: Jingle publicado en la pagina Web del Hospital PIO XII de Colon	DESCRIPCION: Jingle publicado en la página Web del Hospital PIO XII de Colon
--	--

	
--	---

ELABORACION			
JOSÉ LUIS JAIMES ZAMBRANO	MARIA FLOR JAIMES	NELCY DULCE ORTEGA	JUAN PABLO JAMIOY
CARGO	CARGO	CARGO	CARGO
APOYO PIC 2023	COORDINADORA PIC	SUBGERENTE CIENTIFICA	GERENTE
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
			
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
9/07/2024	9/07/2024	9/07/2024	9/07/2024

241

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 E.S.E. HOSPITAL PIO XII Porque tu salud merece lo mejor 017. 591.581.645-5
	FORMATO DE OFICIOS PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	

Colon Putumayo, 5 de julio de 2024

Señor:

Carlos Esteban Patiño.

Coordinador

Emisora SELECTA.


Alto-Putumayo

Ref. solicitud de espacio radial.

Reciba usted un atento saludo, de la manera más respetuosa por medio del presente se informa que se requiere de un espacio radial en su prestigiosa emisora, con el fin de promocionar las "18 prácticas claves - AIEPI" en prácticas familiares que favorezcan el cuidado y protección de niñas y niños, a través de jingles con enfoque diferencial, en el municipio de Sibundoy Putumayo.

Por la atención prestada se anticipa agradecimientos.

Cordialmente.



FLOR JAIMES ZAMBRANO

Coordinadora Departamental PIC 2024

Correo electrónico picdepartamental2024@gmail.com

Cel: 3227015022



Porque tu salud merece lo mejor

Dirección: Calle 4 No. 8 – 18. Celular: 3153621485. Pagina web
www.esehospitalpioxiicolonputumayo.gov.co Correo electrónico:

esehcolon2004@yahoo.es

Colón Putumayo



 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 E.S.G. HOSPITAL PIO XII Porque Tu Salud Merece lo Mejor NIT. 001.501.545-9
	FORMATO DE ACTA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	

Fecha	5/7/2024	Hora Inicio	4 p.m.	Hora Finalización	5 p.m.	Acta N°	001
Lugar	Casa de habitación Carlos Esteban Patiño.						
Microterritorio	6						
Objetivo	Promocionar las "18 prácticas claves - AIEPI" en prácticas familiares que favorezcan el cuidado y protección de niñas y niños, a través de jingles con enfoque diferencial.						
Responsable	EQUIPO PIC DEPARTAMENTAL						
ORDEN DEL DIA							
1	SALUDO						
2	DESARROLLO DEL TEMA						
3	ACUERDOS						
CONVOCADOS/ASISTENTES							
Nombre		Cargo o Profesión	Área o Institución	¿ASISTIO?			
				S	N		
CARLOS ESTEBAN PATIÑO		GERENTE	EMISORA SELECTA	X			
FLOR JAIMES		COORDINADORA PIC	HOSPITAL PIO XII	X			
JOSÉ LUIS JAIMES		APOYO PIC	HOSPITAL PIO XII	X			
DESARROLLO							
1	Se realiza una bienvenida y un cordial saludo al gerente de la emisora SELECTA el señor Carlos Esteban Patiño, posteriormente se indica que la actividad estará a cargo del equipo básico PIC, con la coordinadora Flor Jaimes, y José Luis Jaimes apoyo.						
2	Se da a conocer que se requiere del apoyo del señor Carlos Esteban Patiño para realizar la promoción de las "18 Practicas claves-AIEPI prácticas familiares que favorezcan el cuidado y protección de niñas y niños, a través de jingles con enfoque diferencial. El señor Carlos Esteban Patiño, manifiesta que es una buena temática para tratar con los habitantes del alto Putumayo ya que no todas las personas cuentan con el conocimiento y la importancia de la práctica de dicha temática.						
3	Se llega al acuerdo de que la actividad se realizará el día 9 de julio de 2024, en instalaciones de la emisora SELECTA del alto Putumayo. La invitación se realizará por medio de grupo de WhatsApp y los diferentes medios de comunicación en el territorio.						
COMPROMISOS Y/O TAREAS PENDIENTES							
1	Tarea	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones			
2	La actividad será responsabilidad del PIC departamental.	Equipo PIC "FLOR JAIMES"	9/07/2024				
3	Adecuación y gestión Presidente de la emisora.	CARLOS ESTEBAN PATIÑO	8/07/2024				
4	Convocatoria a los participantes.	CARLOS ESTEBAN PATIÑO	8/07/2024				
Observaciones Generales							
Documentos	1	Oficio de articulación			N° folios	01	
Anexos	2				N° folios		

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 E.S.E. HOSPITAL PIO XII Porque Tu Salud Merece Lo Mejor RIT. 001.001.045-2
	FORMATO DE ACTA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	

3	Nº folios
---	-----------

Fecha próxima reunión	9/07/2024	Hora	2 p.m.	LUGAR	Emisora SELECTA.
Tema	Promocionar las "18 prácticas claves - AIEPI" en prácticas familiares que favorezcan el cuidado y protección de niñas y niños, a través de jingles con enfoque diferencial.				

EN CONSTANCIA FIRMAN			
Nombre	Cargo o Profesión	Área o Institución	FIRMA
CARLOS ESTEBAN PATIÑO	GERENTE	EMISORA SELECTA	
MARIA FLOR JAIMES	COORDINADORA PIC	E.S.E HOSPITAL PIO XII	
JOSÉ LUIS JAIMES	APOYO PIC	E.S.E HOSPITAL PIO XII	José Luis Jaimes.



LA FIRMA PATIÑO PRODUCCIONES
Nit. 12.748.219- 0

CERTIFICA.

Que dando cumplimiento al Plan de Trabajo del PIC-2023 Ref. (PIC DEPARTAMENTAL 2024) se realizaron 6 horas de perifoneo durante 3 semanas, promocionando las "18 prácticas claves - AIEPI" en prácticas familiares que favorezcan el cuidado y protección de niñas y niños, a través de jingles con enfoque diferencial.

E.S.E. Hospital PIO XII Porque tu salud merece lo mejor, Juan Pablo Jamioy gerente

Para constancia se firma en sede principal de Patiño producciones Sibundoy Putumayo a los veintinueve días del mes de julio de 2024.

Atentamente:

Carlos Esteban Patiño
Director Ejecutivo.