MORBILIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

La Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) es un evento de interés en salud pública de control nacional, que requiere acciones de vigilancia y seguimiento rutinario, el distrito hace seguimiento al comportamiento de morbilidad para enfermedad diarreica aguda mediante un análisis comparativo de los últimos 8 años, excluyendo los años 2020-2021, dadas las modificaciones en el comportamiento de las enfermedades en los años pandémicos; mediante el uso de la metodología de Bortman para la construcción de los canales endémicos.

En Bogotá la distribución de casos a partir de la semana epidemiológica 02 presenta un comportamiento hacia el aumento, manteniéndose en la zona de alerta y a partir de la semana 06 tiene un incremento importante acercándose a la zona epidémica.

Con corte a semana epidemiológica 07 se han notificado un total de 133.670 atenciones por casos de EDA, lo cual representa una disminución del 16,4% respecto al 2019 y un aumento del 15% respecto al 2024. La mediana de notificación de casos semanal lo corrido del año 2025 fue de 16.451, mostrando una diferencia de 9.233 atenciones con respecto a la semana actual.

El sexo que más reportó casos fueron las mujeres en comparación con los hombres; con corte a semana epidemiológica 07 se contaron 74.905 mujeres atendidas, equivalentes a un 56%. En cuanto al tipo de atención el 96,9% de casos fueron atendidos en consulta ambulatoria, que equivale a un total de 129.655 casos; por otro lado, se atendieron 4.015 casos en servicio de hospitalización equivalentes a un 3,1%.

El canal endémico para enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años mostró un comportamiento de mantenimiento en la zona de seguridad hasta la semana epidemiológica 04 con tendencia al aumento, llegando a la zona de alerta en la semana 07. En la última semana epidemiológica se evidencia un incremento de 20,6% en el número de atenciones con respecto a la semana previa.

Es necesario mantener el seguimiento continuo del comportamiento de la EDA, así como continuar intensificando las medidas para la prevención, manejo y control, haciendo énfasis en el lavado de manos, manejo de residuos, mantener completo el esquema de vacunas, mantener una alimentación saludable, lavar los alimentos antes de consumirlos y cocinarlos muy bien, consumir agua potable o hervida, así como en las acciones de información en pautas de manejo de síntomas en casa, signos de alarma y el momento en que se debe acudir a la atención médica en unidades de servicios de salud.