INFORME DE ACTIVIDADES

CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO No.GCN-032-2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA Y LA CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA REGIONES "CORPISSA"

Con el fin de:

"AUNAR ESFUERZOS PARA DETERMINAR LA CONDICIÓN FITOSANITARIA DE LOS CULTIVOS DE COCO Y CHONTADURO EN LOS MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ, SAN JOSÉ DEL PALMAR Y SAN JOSÉ DE TADÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, ANTE EL INCREMENTO DE LA PRESENCIA Y AFECTACIÓN DEL COMPLEJO ANILLO ROJO (AR), RHYNCHOPHORUS PALMARUM Y PORROCA"

PRESENTADO POR:

DILEISON RNTERIA ASPRILLA

Periodo del informe: Del 01 al 30 de 11 de 2024

1. Introducción

El presente informe comprende cada una de las actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de noviembre, en donde se desarrollaron las visitas a las diferentes comunidades Guarato, Playa de oro, Yerrecuy del municipio de Tadó y ubicando la cantidad de beneficiario requeridas para la zona.

Con la misión de mitigar el problema fitosanitario en cultivos de chontaduro, causado por la plaga conocida como el picudo negro (*Rhynchophorus palmarum*,) y la enfermedad Anillo Rojo (AR), que afectan la región Pacífica. Y pequeños productores, indígenas, afros.
Con la realización de este diagnóstico se puede implementará, planes de manejo fitosanitario, teniendo en cuenta planes de manejo integrado de plagas (MIP) que incluye: el monitoreo constante de las plantaciones,
la instalación de trampas para reducir, rebajar, mitigar capturado y sacrificando la cantidad tan grande que hay de picudo negro y la erradicación de plantas afectadas por el anillo rojo de las palmas.

El chontaduro Bactris gasipaes Kunth, es una palma nativa del trópico cálido húmedo de América Latina. Su origen se presume en la Región Occidental de la cuenca Amazónica, pero se han encontrado poblaciones nativas en Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Panamá y Costa Rica (Corpoica, 1996). Según Moran (2015), menciona que el cultivar del chontaduro es conocido con nombres comunes de acuerdo con la región donde se consume: pejibaye en Costa Rica; peach palm en inglés; pupunha en Brasil; pijuayo en Perú; chontaruro, chontilla, en Ecuador; Manaco en Guatemala; Pijiguao en Venezuela; Tembé en Bolivia; Pibá o pifá en Panamá; Pupunheira y pupunha en Brasil; mientras que su nombre real es Pixbae (Crane, 2013).

El picudo negro, una plaga que ha causado estragos en la región Pacífica, especialmente en cultivos de coco y chontaduro, tiene una alta capacidad de adaptación y movilización, lo que lo convierte en una amenaza persistente. A lo largo de los años, se ha observado un incremento en su incidencia, afectando miles de hectáreas de cultivos en departamentos como Nariño y Chocó.

2. Objetivos y metodología

Determinar la condición fitosanitaria de los cultivos de Coco y Chontaduro en los municipios de Bajo Baudó, San José del Palmar y San José de Tadó en el departamento del Choco, ante el incremento de la presencia y afectación del complejo Anillo Rojo (AR), Rhynchophorus palmarum y Porroca.

Objetivo 1. Determinar el número de palmas y lugares de producción afectados por Rhynchophorus palmarum, Anillo rojo y Porroca en cultivos de coco y chontaduro en predios priorizados de los municipios de Bajo Baudó, San José del Palmar y San José de Tadó en el departamento de Choco.


Objetivo 2. Realizar un análisis y diagnóstico situacional fitosanitario de lugares de producción afectados por Rhynchophorus palmarum, Anillo rojo y Porroca en los cultivos de coco y chontaduro en los municipios Bajo Baudó, San José del Palmar y San José de Tadó del departamento de Choco

Objetivo 3. Fortalecer las capacidades técnicas de los productores para la identificación, prevención, monitoreo y control de riesgos fitosanitarios en cultivos de coco y chontaduro en los municipios priorizados del departamento del Choco.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL PERIODO DE REPORTE

Con este ejercicio se permitió la ubicación de las participantes, en las diferentes zonas, teniendo en cuenta algunas bases de datos de productores que tienen palmas de chontaduro como cultivo comercial, y los que tuvieron palmas y la plaga acabo con ellas.

Esto les puede permitir querer retomar las actividades del cultivo del chontaduro a los productore, teniendo en cuenta la gran labor realizado un diagnóstico con las instalaciones de las trampas, que permitirá realizar estudios más certeros para el control de la plaga. En el municipio de Tadó – Choco.



1.- Se realizaron 25 visitas teniendo en cuenta base de datos tomadas de productores que sembraron chontaduro en alguna época que quedaron plasmado en el formato 3-1032 V6.

<table>
<tr><td>Instalación de trampas en los diferentes predios
</td><td>
Instalación de trampas en los predios</td></tr>
<tr><td>Instalación de trampas con el compañero trampero</td><td>Con el productor realizanso recorrido para instalar la trampa</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

2.- Des pues de haberle llenado el formato físico 3-1032 V6 se alimentaba el formato 3-1030 V11 con la in formación tomada en la visita al productor. Este formato se anexará a la entrega del informe.

3.- Se le realizo la entrega de los insumos a los participantes y se le hizo firmar el acta de entrega se le decía que se le estaba entregando se anexara las actas firmadas y escaneadas de los productores que se les entrego.

	
En la entrega de trampas	Entrega de trampa llenada del acta





4.- Esta es los totales para este mes del número de productores, área evaluada, cantidad de trampas instaladas, cantidad de palmas contabilizadas, cantidad de palmas afectadas.

	INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE			
N° de Productores	Area Evaluada en ha	N° de trampa instalada	N° de palmas	N° palmas Afectadas
27	38	108	2011	916

ANEXO

Formato3 -1032 en PDF
El formato 3 -1030 digital
Actas de Entrega Escaneadas firmadas PDF

Atentamente.



C.C 11805941