San Andrés Islas, abril 21 del 2025

Señores
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
Ciudad

Cordial saludo.

Yo NILA ESTHER GONZALEZ VIDAL, en mi calidad de Representante Legal de REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S me permito certificar que la empresa se encuentra al día en el pago de Parafiscales: Salud, Pensión, y Riesgos Profesionales.

Atentamente,



NILA ESTHER GONZALEZ VIDAL
CC 45.474.654 de Cartagena
Representante Legal
Representaciones y servicios JM S.A.S

Anexo: Pago parafiscales

JORNADA 1 DE FUMIGACIÓN EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL- AÑO 2025














Best








Ropemar2003


Cont















DAMAS






DAMAS




Ropemar2003


Ropemar2003


Ropemar2003

Raticida en Bloques Parafinados

Composición

Brodifacoum……..0,05 gr./ kg.
Bitrex*.....0,01 gr./ kg.
Derivados de cereales c.s.p. .....c.s. 999,94 gr./ kg.
*Benzoato de Denatonium

PRODUCTO PREMIUM

KLERAT® BLOQUE es un poderoso rodenticida anticoagulante de última generación que controla eficazmente guarenes **o ratas de alcantarilla (*Rattus norvegicus*),** ratas del tejado **(*Rattus rattus*)** y lauchas o ratones **(*Mus musculus*).**
KLERAT® BLOQUE controla a los roedores con la primera dosis que ingieren, equivalente a 1,3 g en Ratas y 0,2 g en Lauchas y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre **a partir del tercer día de la primera ingesta.**
KLERAT® BLOQUE contiene **Bitrex®**, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y **no siendo detectado por los roedores**.

Para Uso Doméstico e Industrial
Listo para Usar en Exterior o Zonas Húmedas

Autorización del Instituto de Salud Publica (ISP) **N°386/04**
Fabricado por: Syngenta Protectao de Cultivo, Sao Paulo, Brasil.
Bajo licencia de Syngenta Limited. Inglaterra
Importa: Syngenta S.A.
Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes - Teléfono: (2) 941 0100
Distribuye: Carlos Salas y Cia. Ltda.
Manuel Antonio Maira 1011-R, Providencia – Telefono: (2) 274 4989
Santiago – Chile.

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.
Bitrex® es marca registrada de Mac-Farland Smith, Inglaterra.

APROBACIONES



RECOMENDACIONES DE USO

• **KLERAT® BLOQUES** es un raticida listo para usar (cebo), especialmente indicado para el control de roedores en casas, bodegas, industrias, planteles animales y otros.

• Aplicar **KLERAT® BLOQUES** tan pronto se observen las primeras señales de los roedores (fecas, huellas, roeduras, manchas, etc.).

• Utilizar el orificio central de los bloques para colgarlos o fijarlos (ej*. caja cebadora o tubo de PVC*), en todos los lugares donde los roedores circulen, viven y alimenten (alcantarillado, canales de desagüe, vigas, jardines, árboles, madrigueras).

• En caso de nuevos roedores repita la aplicación cada 7 ó 14 días hasta que cese el consumo.

• Para prevenir una nueva infestación, es posible mantener algunos puntos permanentes con **KLERAT® BLOQUES** (*puntos críticos*), solo si es estrictamente necesario, y revisarlos periódicamente para detectar si hay consumo.

Cuadro General de Recomendaciones de uso.-

ROEDOR	DOSIS
Ratas y guarenes	**Colocar 1 – 2 bloques cada 5 a 10 metros**
Lauchas o Ratones	**Colocar 1 bloque cada 3 a 6 metros**

• Si la infestación es alta utilice distancia menor de ubicación señalada en el cuadro anterior.
• Complemente el uso de **KLERAT® BLOQUES** con una correcta limpieza y aseo del lugar.
• Para interiores o ambientes secos, prefiera **KLERAT® PELLETS.**

Grupo químico: Hidroxicumarina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• **Conservar KLERAT® BLOQUE en su envase original.**

• **Usar guantes para su manipulación.**

• **No comer, beber ni fumar durante la aplicación.**

• **Enterrar o eliminar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.**

• **Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.**

• **Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no responsables.**

• **Mantener fuera del alcance de aves y animales.**

• **No almacenar junto con alimentos.**

• **En caso de intoxicación acuda a un médico.**

PRIMEROS AUXILIOS

• En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico **CITUC al fono: 635 3800** , las 24 horas.
• Mantener al afectado abrigado y en reposo Si el afectado está inconsciente, no administrar nada por boca y mantenerlo acostado de lado.

ANTÍDOTO

• Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de Tiempo Protrombina, administrar **Vitamina K 1 (Fitomenadiona oral o inyectable.**
Adultos 40 mg. x día y Niños menores de 12 años 20 mg. x día, ambos en varias dosis.

ACCIÓN TÓXICA

• Brodifacoum es un anticoagulante. Puede observarse hemorragia nasal o de encías, hematuria, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales y excesiva fragilidad capilar hasta varios días después de ocurrida la ingesta.
• Este producto es de clase IV OMS: CUIDADO puede ser peligroso.

CUIDADO AMBIENTAL

• Brodifacoum es extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No elimine el contenido del envase ni los roedores muertos a cursos de agua o fuentes de agua.

• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.
• ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.
• EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
• MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.
• NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.
• TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.

En caso de INTOXICACION, llamar a:
− Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 635 3800.
− Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 941 0100,
Santiago – Chile.



CARACTERÍSTICAS:
CIPERCOM EC, es un insecticida piretroide cuyo ingrediente es la **CIPERMETRINA** con un amplio espectro de acción que actúa por contacto e ingestión contra todos los insectos rastreros y voladores tales como arañas, hormigas, cucarachas, garrapatas, gusanos, moscas, chinches, grillos, mosquitos y pulgas, entre otros. Tiene un drástico efecto contra toda clase de larvas de Lepidópteros y ataca al sistema nervioso de los insectos.

USO Y FORMA DE APLICACIÓN. (En salud publica, Domestico e Industrial)

Liquido emulsiónable. Mezcle usando las siguientes proporciones.
5 c.c a 15 cc del producto para 1 litros de agua
Aplique por aspersión alrededor de sitios tales como armarios, áticos, esquinas, gabinetes, grietas, muebles, paredes, pisos y ranuras. Para el control de cucarachas aplíquelo detrás de estufas, neveras, lavaderos e inodoros. Para el control de hormigas aplíquelo en hormigueros y a través de sus caminos. Las pulgas se pueden combatir con una aspersión fina sobre toda la superficie del suelo o por donde existan rastreros de estos molestosos insectos.

PRECAUCIONES

- Use guantes, gafas y mascarillas.
- Haga aplicaciones en sitios ventilados.
- No coma, beba ni fume durante su aplicación.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugares frescos y secos, manténgase el envase cerrado con la etiqueta visible.
MANTÉNGASE ALEJADO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES.
Después de su uso destruya el envase. Evite contaminar ríos y lagunas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Evite el contacto con la piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua y jabón. Remueva la ropa contaminada.
- En caso de ingestión, consultar directamente al médico y si es posible mostrar el envase del producto o etiqueta del producto, no inducir el vomito.
- En caso de inhalación. lleve a un sitio aireado

PRESENTACIONES: Frascos por 30 cc- 250 cc y 1000 c.c.
REGISTRO SALUD PÚBLICA: RGSP- 275-2007 Ministerio de la Protección Social

PREPARADO POR.
Felipe Antonio Mendoza, Q.F.
T.P. 0200139291185205S del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos.
DIRECTOR TÉCNICO

AGRONEGOCIOS

PRODUCTOS JULIAO & Cía. Ltda. FORMULADORES E IMPORTADORES	FICHA TÉCNICA CIPERCOM E.C.

COMPOSICIÓN: 100 gramos de producto contiene:

INGREDIENTE ACTIVO

CIPERMETRINA ----------15

INERTE EMULSIONABLE---------- --- 85 %

PARAMETROS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Liquido homogéneo
Color	Amarillo pálido
Olor	Característico a solvente orgánico
Solubilidad	En agua y en solventes orgánicos
Densidad a 20°C	0,95 - 0,98
Humedad (KF)	Menor de 0.1 % p/v
Concentración	14,98 % - 15,2%

CONCEPTO TOXICOLOGICO III- MEDIANAMENTE TÓXICO

San Andrés Islas, abril 21 de 2025

Señores
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
Ciudad

Asunto: Informe N° 1 de fumigación – mes: abril

Ciudad

Cordial saludo.

Adjunto les presento primer informe del servicio de fumigación contra insectos rastreros, voladores y roedores, realizado en todas las áreas de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, en la isla de San Andrés:

En esta primera actividad, se fumigaron todas las áreas (oficinas, salones, cafetería, baños, áreas comunes, áreas externas, etc.), se hizo énfasis en la fumigación de techos, especialmente en la oficina administrativa (almacén) y en la de dirección.

El ciclo de fumigación que se trabajara será de manera trimestral.

La fumigación es de manera preventiva, contra insectos rastreros, voladores como zancudos y roedores.

Se fumigaron todas las áreas externas y de igual forma las oficinas ubicadas en el primer piso

No hubo hallazgos de ningún insecto rastrero ni de roedores.

Para esta actividad se trabajó con Cipercon, cuyo principio activo es Cipermetrina, en dosis de 8cc por litro de agua.

Se desratiza en todos los sectores con Klerat Pallet.

RECOMENDACIONES

- Evitar el estancamiento de aguas en las áreas externas, para evitar la proliferación de mosquitos.
- Remplazar puertas con polillas ya que podrían expandirse a otras áreas de las oficinas y prevenir el ingreso de comején.
- Cerrar vías de acceso de palomas: sellamiento o encerramientos de en los techos
- Tratar de dar de baja a elementos en des uso, para prevenir anidación de roedores y de insectos rastreros como cucarachas.

Atentamente,



NILA ESTHER GONZALEZ VIDAL
Gerente

Nota: se anexan fichas técnicas