1. Un poco para entender la función del mosquito como vector ¿Qué es la fiebre amarilla y como se transmite?

   La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica aguda producida por un arbovirosis transmitida por mosquitos hembras (Aedes y Haemogogus) infectadas al picar de una persona a otra, algunos se reproducen alrededor de las casas (domésticos), otros en la selva (silvestres) y algunos en ambos hábitats (semi-domésticos). Estos mosquitos preferencialmente permanecen en la superficie del agua. La inmunidad se adquiere a través de la vacuna o por haber tenido previamente la enfermedad.

2. ¿Por qué Bogotá no está en riesgo de ser una zona endémica? ¿Se deben tomar medidas como no tener aguas empozadas y fumigar?
   Bogotá no es y no está en riesgo de ser una zona endémica, debido a su altura sobre el nivel del mar, ya que el mosquito vector no puede vivir bajo estas condiciones climáticas del Distrito Capital, razón por las cual las medidas de control se enfocan en los municipios y ciudades donde habita el mosquito.

3. ¿La vacuna sólo es preventiva o también puede ayudar a reducir el desarrollo de síntomas graves?
   La vacuna solo es preventiva y proporciona inmunidad efectiva dentro de los 10 días previos a la exposición para el 80-100% de las personas vacunadas, y dentro de los 30 días para más del 99% de las personas vacunadas.

4. ¿Cuáles son los síntomas de fiebre amarilla? ¿Si un familiar está enfermo, estoy en riesgo?

   Los principales síntomas son: fiebre, dolor muscular con prominente dolor de espalda, dolor de cabeza, pérdida de apetito y náuseas o vómitos. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen después de 3 a 4 días. El virus de la fiebre amarilla solo se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, por lo tanto no hay riesgo si tengo contacto con personas que están con la enfermedad.

5. Ante la declaratoria de alerta, ¿que medidas se deben tomar desde los hogares y centros de salud en la temporada postvacacional?

Desde el hogar:

- Consultar de inmediato a los servicios de salud ante la presencia de signos y síntomas de la enfermedad, si ha visitado los últimos 15 días a una zona de riesgo para fiebre amarilla.

Centro de salud

- Fortalecer los procesos de capacitación de personal médico, especialistas y enfermería en la identificación y atención de acuerdo lineamientos y protocolos actuales para la atención del evento.
- Garantizar la atención, diagnóstico y seguimiento oportuno a los pacientes que consulten a los servicios de salud como casos probables para la enfermedad.
- Evaluar la adherencia a guias y protocolos establecidos para la atención de casos de fiebre amarilla
- Garantizar disponibilidad de insumos médicos y de laboratorio necesarios para la atención integral de los casos de acuerdo a su nivel de complejidad.
- Fortalecer la articulación y comunicación con el DUES para garantizar adecuados y oportunos procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes.
- Realizar notificación al Sistema de vigilancia nacional, toma de muestras de en forma inmediata y remisión al Laboratorio de Salud Pública de los casos probables identificados de acuerdo a lo establecido en el protocolo nacional del evento.