
Postest AT Fortalecimiento Vigilancia Eventos Prevenibles por Vacuna (Sarampión-Rubéola, Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica y Hepatitis A) Subred Sur 10-04-2025


1. ¿Cuál es el periodo de incubación del Sarampión? (0 punto)

a) De 12 a 23 días	0
b) De 7 a 21 días	13
c) De 7 a 30 días	0
d) De 7 a 23 días	0




2. Cristina, de 28 años, viaja de vacaciones a Estados Unidos. Al regresar a Colombia, tiene fiebre alta y tos. Unos días des pués, el 2 de junio, desarrolla exantema maculopapular en cabeza y tronco. Su período de transmisibilidad del sarampi ón es: (0 punto)

a) Entre el 30 de mayo y el 7 de junio	1
b) Entre el 31 de mayo y el 6 de junio	1
c) Entre el 29 de mayo y el 6 de junio	10
d) Entre el 28 de mayo y el 7 de junio	1




3. ¿Hasta qué momento es aceptable obtener una muestra de orina, luego del inicio del exantema? (0 punto)

a) Desde el primer día del inicio del exantema y hasta 7 días después	2
b) Desde el primer día del inicio del exantema y hasta 14 días después	0
c) Desde el primer día del inicio del exantema y hasta 10 días después	11
d) Desde el primer día del inicio del exantema y hasta 30 días después	0




4. En un brote de Meningitis bacteriana o meningococcemia se debe entregar profilaxis a: (0 punto)

a) Todos los contactos directos e indirectos	1
b) A los contactos indirectos	0
c) A los contactos estrechos	11
d) A ningún contacto	1




5. En los casos de meningococcemia se observa signos y síntomas característicos: (0 punto)

a) Irritabilidad, pérdida del estado de conciencia y fiebre	3
b) Abombamiento de la fontanela y convulsiones	0
c) Vómitos en proyectil, rigidez nucal	0
d) Exantema que evoluciona rápidamente a erupción petequial	10



6. Son agentes objeto de la vigilancia de meningitis bacteriana: (0 punto)

a) Candida albicans, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis	0
b) Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae	13
c) Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Cryptococcus neoformans	0
d) Candida auris, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae	0




7. El periodo de transmisibilidad de la hepatitis A es: (0 punto)

a) Aproximadamente 15 días antes de inicio de ictericia y una semana posterior o por niveles altos...	7
b) Posterior al inicio de a ictericia una semana o hasta desaparecer la misma	0
c) 1 a 50 días, con promedio de 30 días antes del inicio de la ictericia	6
d) Ninguna de las anteriores	0



8. Respecto a las acciones individuales y colectivas para el evento Hepatitis A son ciertos los siguientes aspectos: (0 punto)

a) Ante la presencia de dos o más casos en población cautiva o de pertenencia étnica se configura como...	0
b) El aislamiento entérico es una recomendación que se debe dar hasta una semana después de...	9
c) El periodo de transmisibilidad esta definido por el inicio o permanencia de la Ictericia; es un evento qu...	0
d) a y b son correctas	4



9. La configuración de caso confirmado se puede hacer por: (0 punto)

a) Únicamente por laboratorio	4
b) Por laboratorio y por clínica	4
c) Por nexo epidemiológico si esta asociado a un brote y por laboratorio	1
d) Todas las anteriores	4

