
# Pretest AT Fortalecimiento Vigilancia Eventos Prevenibles por Vacuna (Sarampión-Rubéola, Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica y Hepatitis A) Subred Sur 10-04-2025


1. ¿Cuál es el periodo de incubación del Sarampión? (0 punto)

| | |
|---|---|
| a) De 12 a 23 días | 0 |
| b) De 7 a 21 días | 16 |
| c) De 7 a 30 días | 0 |
| d) De 7 a 23 días | 1 |





2. Cristina, de 28 años, viaja de vacaciones a Estados Unidos. Al regresar a Colombia, tiene fiebre alta y tos. Unos días des pués, el 2 de junio, desarrolla exantema maculopapular en cabeza y tronco. Su período de transmisibilidad del sarampi ón es: (0 punto)

| | |
|---|---|
| a) Entre el 30 de mayo y el 7 de junio | 0 |
| b) Entre el 31 de mayo y el 6 de junio | 2 |
| c) Entre el 29 de mayo y el 6 de junio | 9 |
| d) Entre el 28 de mayo y el 7 de junio | 6 |





3. ¿Hasta qué momento es aceptable obtener una muestra de orina, luego del inicio del exantema? (0 punto)

| | |
|---|---|
| a) Desde el primer día del inicio del exantema y hasta 7 días después | 7 |
| b) Desde el primer día del inicio del exantema y hasta 14 días después | 4 |
| c) Desde el primer día del inicio del exantema y hasta 10 días después | 2 |
| d) Desde el primer día del inicio del exantema y hasta 30 días después | 4 |




4. En un brote de Meningitis bacteriana o meningococcemia se debe entregar profilaxis a: (0 punto)

| | |
|---|---|
| a) Todos los contactos directos e indirectos | 4 |
| b) A los contactos indirectos | 0 |
| c) A los contactos estrechos | 13 |
| d) A ningún contacto | 0 |





5. En los casos de meningococcemia se observa signos y síntomas característicos: (0 punto)

| | |
|---|---|
| a) Irritabilidad, pérdida del estado de conciencia y fiebre | 6 |
| b) Abombamiento de la fontanela y convulsiones | 1 |
| c) Vómitos en proyectil, rigidez nucal | 4 |
| d) Exantema que evoluciona rápidamente a erupción petequial | 6 |





6. Son agentes objeto de la vigilancia de meningitis bacteriana: (0 punto)

| | |
|---|---|
| a) Candida albicans, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis | 1 |
| b) Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae | 11 |
| c) Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Cryptococcus neoformans | 5 |
| d) Candida auris, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae | 0 |




7. El periodo de transmisibilidad de la hepatitis A es: (0 punto)

| | |
|---|---|
| a) Aproximadamente 15 días antes de inicio de ictericia y una semana posterior o por niveles altos... | 3 |
| b) Posterior al inicio de a ictericia una semana o hasta desaparecer la misma | 3 |
| c) 1 a 50 días, con promedio de 30 días antes del inicio de la ictericia | 8 |
| d) Ninguna de las anteriores | 3 |




8. Respecto a las acciones individuales y colectivas para el evento Hepatitis A son ciertos los siguientes aspectos: (0 punto)

| | |
|---|---|
| a) Ante la presencia de dos o más casos en población cautiva o de pertenencia étnica se configura como... | 2 |
| b) El aislamiento entérico es una recomendación que se debe dar hasta una semana después de... | 2 |
| c) El periodo de transmisibilidad esta definido por el inicio o permanencia de la Ictericia; es un evento qu... | 2 |
| d) a y b son correctas | 10 |




9. La configuración de caso confirmado se puede hacer por: (0 punto)

| | |
|---|---|
| a) Únicamente por laboratorio | 7 |
| b) Por laboratorio y por clínica | 3 |
| c) Por nexo epidemiológico si esta asociado a un brote y por laboratorio | 3 |
| d) Todas las anteriores | 4 |

