

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	REPORTE DE ASISTENCIA A REUNIONES			
	Código:	SDS-PYC-FT-044	Versión:	

Elaborado por: Nury S. Leguizamon Amaya /Revisado por: Alvaro A. Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo C.

Objetivo¹: Plan de aceleración para reducción de la mortalidad materna

DATOS DEL ORGANIZADOR DE LA REUNIÓN

Entidad/Proceso: Ministerio de Salud y Protección Social



Nombre: Dra. Sidia Caicedo Teléfono: _____Correo electrónico: _____

Lugar de la reunión: Plataforma Académico

Fecha: 17-10-2024 Hora de inicio: 7:00am Hora de Finalización: 9:00 am

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS ²

1. Seguimiento a la situación de mortalidad materna SE 41 de 2024.
2. TMI -PLUS: Estrategia para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas – Sesión 1.
3. Reflexiones acerca de la situación de la mortalidad materna.
4. Próximos Pasos paream.



Indicador	Objetivo
Se reduce la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.	(-) Eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.
Se reduce la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.	(+) Eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.
Se reduce la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.	(-) Eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.
Se reduce la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.	(+) Eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.
Se reduce la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.	(-) Eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.
Se reduce la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.	(+) Eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.

¹ El presente formato aplica únicamente donde el proceso no sea el organizador o no se pueda contar con el acta.

² Se podrán incluir las filas que se requieran en cualquiera de los items del documento.

³ Agregar Evidencia Fotográfica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	REPORTE DE ASISTENCIA A REUNIONES			
	Código:	SDS-PYC-FT-044	Versión:	

Elaborado por: Nury S. Leguizamon Amaya /Revisado por: Alvaro A. Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo C.

Tratamiento de la sífilis gestacional



Prophylaxis fetal se recomienda **18 a 24 horas** si los niveles de penicilina en sangre están por debajo de 1 U mínima inhibitoria

1 U de penicilina mayor de 0,03 mg/ml para asegurar un efecto bactericida

Para curar una sífilis precoz se requiere una (1) adecuada mantención durante 7 días

Los beneficios superan ampliamente los riesgos

No aplicar al menos 1 dosis PB:

- Riesgo de aborto
- Costo fetal
- Riesgo perinatal
- Sífilis congénita

1 dosis PB aplicada 30 o más días antes del parto previene hasta un 87% de los casos la infección en el feto, mortalidad y parto prematuro

Desensibilización - Alergia a la penicilina

Mujeres con historia de **alergia a la penicilina** o antecedente de:

Reacciones alérgicas sistémicas tipo I

- Edema angioneurótico
- Urticaria generalizada
- Choque anafiláctico o dificultad respiratoria

Realizar desensibilización Penicilina V potásica vía oral y aplicar la penicilina benzatínica

Para su administración se requiere que el prestador de servicios de salud cuente con un equipo básico para reanimación cardio-cerebro pulmonar

Desensibilización - Inducción de tolerancia a los medicamentos

La desensibilización consiste en administrar un fármaco a una persona que no lo tolera, en dosis muy bajas y aumentando gradualmente la dosis hasta alcanzar la dosis terapéutica

Conviene administrar a un día de haberse recuperado el medicamento al que se induce la tolerancia

Esta intervención permite proporcionar el fármaco que se necesita para el tratamiento de la enfermedad

Después de suspender el medicamento, el paciente puede volver a ser alérgico a dicho medicamento

La desensibilización no dura mucho tiempo

Resolución de la sífilis

La sífilis es una enfermedad infecciosa causada por el bacterio *Treponema pallidum*. Se transmite por contacto sexual directo con una lesión infectada o por contacto con fluidos de una lesión infectada.

La sífilis puede ser curada con antibióticos. El tratamiento depende de la etapa de la enfermedad.

Tratamiento de la sífilis primaria:

- 1 dosis de Penicilina benzatínica 2.4 millones de unidades intramusculares.
- Repetir el tratamiento en 7 días.

Tratamiento de la sífilis secundaria:

- 1 dosis de Penicilina benzatínica 2.4 millones de unidades intramusculares.
- Repetir el tratamiento en 7 días.

Tratamiento de la sífilis terciaria:

- 1 dosis de Penicilina benzatínica 2.4 millones de unidades intramusculares.
- Repetir el tratamiento en 7 días.

Esquema de desensibilización oral para personas alérgicas a la penicilina

Penicilina V potásica solución oral de 250 mg por 5cc, equivalente a 400.000 UI; se dará 30.000 UI * centímetros cúbicos.

Se deben suministrar: **14 dosis**

- Una dosis cada **15 minutos**
- Tiempo total: **3 horas y 45 minutos**
- Dosis acumulada: **1.296.700 UI**

Tratamiento del o los contactos sexuales

Sífilis de duración desconocida:

- 2.400.000 UI de Penicilina benzatínica en 1 dosis semanal por 3 semanas
- Penicilina benzatínica

En caso de alergia a la penicilina, administrar doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 14 días

A los contactos se recomienda **NO** realizar pruebas diagnósticas para sífilis

Realizar **tratamiento a todos los contactos sexuales**

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA SDS

COMPROMISO	RESPONSABLE (Dependencia/Proceso/SDS)	FECHA

DATOS DEL ASISTENTE (s) A LA REUNIÓN (como representante de la SDS)

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/PROCESO	FIRMA
Nancy Rico Galeano	Profesional Especializado	Subdirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud	