SEMILLEROS

MANEJO TÉCNICO DEL SEMILLERO EN BERENJENA

EMPEZAR



genially

GALERÍA MANEJO DEL SEMILLERO

HOME



RIEGO



NUTRICIÓN



MANEJO

SANITARIO

genially

RIEGO



RIEGO

ES IMPORTANTE CONOCER LA PROCEDENCIA DEL AGUA DE RIEGO Y EN LO POSIBLE REALIZAR MONITOREO Y ANÁLISIS PERIÓDICOS CON EL FIN DE CONOCER SU CALIDAD. SE RECOMIENDA REGAR ENTRE DOS O TRES VECES AL DÍA, DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR.

INFO

genially

RIEGO



LA FRECUENCIA DE RIEGO EN EL SEMILLERO SE ESTABLECE DE ACUERDO AL TIPO DE SUELO O SUSTRATO, TIPO DE SEMILLERO, LA ESPECIE SEMBRADA Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA REGIÓN.

UN EXCESO DE HUMEDAD EN LOS SEMILLEROS PUEDE FAVORECER EL ATAQUE DE HONGOS DEL SUELO QUE PRODUCEN DAMPING-OFF.

PARA REGAR LO IMPORTANTE ES TENER CALIBRADOS LOS TIEMPOS DE RIEGO Y DE ESTA MANERA NO INCURRIR EN ERRORES DE MANEJO


...TE CONOCER LA
...A DEL AGUA DE
...O POSIBLE
...NITOREO Y
...IÓDICOS CON EL
...CER SU CALIDAD.
...IDA REGAR
... TRES VECES AL
...ENDO DE LAS
...S AMBIENTALES
DEL LUGAR.

INFO

genially

NUTRICIÓN EN SEMILLEROS

Definición de Nutrición en las plantas




NUTRICIÓN DE PLÁNTULAS EN SEMILLEROS

CUANDO SE UTILIZAN SUSTRATOS INERTES COMO TURBA SE REQUIERE UN PLAN DE FERTILIZACIÓN TANTO EDÁFICO COMO FOLIAR.
ESTE FERTILIZANTE EDÁFICO SE DEBE APLICAR CUANDO LAS PLÁNTULAS TENGAN DOS HOJAS VERDADERAS

+ INFO

genially

NUTRICIÓN EN SEMILLEROS



SE RECOMIENDA DILUIR EN AGUA UN FERTILIZANTE COMPLETO TIPO TRIPLE 15 EN DOSIS DE 10 GRAMOS POR LITRO Y APLICARLO AL SEMILLERO TRATANDO DE HUMEDECER EL SUELO, PREFERIBLEMENTE EN HORAS DE LA TARDE

NUTRICIÓN DE PLÁNTULAS EN SEMILLEROS

CUANDO SE UTILIZAN SUSTRATOS INERTES OMO TURBA SE EQUIERE UN PLAN E FERTILIZACIÓN ANTO EDÁFICO OMO FOLIAR. STE FERTILIZANTE DÁFICO SE DEBE APLICAR CUANDO LAS PLÁNTULAS TENGAN DOS HOJAS VERDADERAS

+ INFO

genially

MANEJO SANITARIO



MANEJO SANITARIO EN SEMILLEROS

LA SANIDAD DE LAS PLÁNTULAS DE BERENJENA ESTÁ LIGADA A LA PRODUCTIVIDAD Y POSTERIOR DESARROLLO DEL CULTIVO.
POR TAL MOTIVO ES SUPREMAMENTE IMPORTANTE REALIZAR PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN QUE IMPIDAN LA PROLIFERACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

genially

INFO





Estas prácticas son:
Utilizar semilla certificada o conocer su procedencia (si son de variedades criollas),
Desinfectar las bandejas si vienen de una plantulación anterior
Mantener el semillero libre de malezas y plagas, que sean fuentes de patógenos y trasmisoras de virus
Evitar regar excesivamente (no encharcar)
Desinfectar el sustrato y no reutilizar el sustrato de la plantulación anterior.
Otra medida de prevención en la producción de plántulas es aplicar periódicamente Trichodermae sp. en el semillero utilizando dosis de 1 mL/litro de agua

SANIDAD DE LAS
LÁNTULAS DE
ERENJENA ESTÁ LIGADA
LA PRODUCTIVIDAD Y
OSTERIOR
ESARROLLO DEL
ULTIVO.
OR TAL MOTIVO ES
UPREMAMENTE
PORTANTE REALIZAR
RÁCTICAS DE
REVENCIÓN QUE
PIDAN LA
ROLIFERACIÓN DE
LAGAS Y
NFERMEDADES

INFO

genially

MANEJO SANITARIO



M

A SANIDAD DE LAS
LÁNTULAS DE
ERENJENA ESTÁ LIGADA
LA PRODUCTIVIDAD Y
OSTERIOR
ESARROLLO DEL
ULTIVO.
OR TAL MOTIVO ES
UPREMAMENTE
PORTANTE REALIZAR
RÁCTICAS DE
REVENCIÓN QUE
PIDAN LA
ROLIFERACIÓN DE
LAGAS Y
NFERMEDADES

Hongo beneficioso para las plantas, ampliamente utilizado como agente de control biológico contra diversos patógenos vegetales

Se utiliza en aplicaciones foliares, tratamiento de semillas y suelo para el control de diversas enfermedades producidas por hongos.

genially

INFO

PREPARACIÓN DEL TERRENO





EQUIPO PARA

DESCOMPACTAR EL SUELO

GENERALMENTE, LAS PRÁCTICAS DE LABRANZA EL OBJETIVO ES HACER UNA CORRECCIÓN FÍSICA EN LOS PRIMEROS CENTIMETROS DE PROFUNDIDAD DEL SUELO, A FIN DE DISMINUIR LA RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE LAS RAICES, LO QUE EQUIVALE A BAJAR UN POCO LA DENSIDAD APARENTE, AUMENTAR LA MACRO YLA MESOPOROSIDAD, ASI COMO MEJJORAR LA INFILTRACIÓN DEL AGUAY DEL AIRE



+
INFO

genially

PREPARACIÓN DEL TERRENO



GENERALMENTE, LAS PRÁCTICAS DE LABRANZA EL OBJETIVO ES HACER UNA CORRECCIÓN FÍSICA EN LOS PRIMEROS CENTIMETROS DE PROFUNDIDAD DEL ENCIA A LA E EQUIVALE A NTE, AUMENTAR COMO AY DEL AIRE

SI LA SIEMBRA SE REALIZA EN SUELOS BAJOS, CON DRENAJES INTERNOS LENTOS Y TEXTURAS ARCILLOSAS O LIMOSAS, SE RECOMIENDA REALIZAR CABALLONES PARA EVITAR QUE LOS EXCESOS DE HUMEDAD PERJUDIQUEN LOS CULTIVOS.





DESCOMPACTAR EL SUELO

INFO

genially

TRASPLANTE

PLÁNTULA IDEAL PARA EL TRANSPLANTE





LA PREFERENCIA DE LOS AGRICULTORES ES SEMBRAR EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO. (ABRIL Y MAYO) CON EL INICIO DE LAS LLUVIAS, AUNQUE ALGUNOS EN MENOR PROPORCIÓN LO HCAEN EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE


EL TRASPLANTE A SITIO DEFINITIVO SE DEBE REALIZAR CUANDO LAS PLÁNTULAS TENGAN DE 5 A 6 HOJAS VERDADERAS Y UNA ALTURA DE 10 A 15 CENTIMETROS, LO CUAL OCURRE APROX. A LOS 30 DÍAS DESPUES DE HABER SEMBRADO LA SEMILLAS, DE FORMA SIMULTANEA SE INICIA EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DONDE SE VAN A ESTABLECER LAS PLANTAS

+ INFO

genially

TRASPLANTE

PLÁNTULA IDEAL PARA EL TRANSPLANTE



ANTES DEL TRASPLANTE DEBEN HACERSE LABORES COMO CONTROL DE MALEZAS EN LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJE, MECANIZACIÓN DEL LOTE E INCORPORACIÓN DE RESIDUOS DE COSECHAS ANTERIORES.

EN CASO DE QUE EL LOTE PROVENGA DE VARIAS COSECHAS ANTERIORES DE BERENJENA, SE DEBEN INCORPORAR LOS RESIDUOS PARA DESTRUIR EL INÓCULO DE HONGOS EXISTENTES, PRINCIPALMENTE Sclerotium, Phytophthora y Colletotrichum, LOS CUALES PUEDEN SOBREVIVIR EN LOS RESIDUOS DE COSECHA.

TAMBIÉN ES NECESARIO TRAZAR ZANJAS PROFUNDAS PARA EL DRENAJE SUBSUPERFICIAL EN LOTES CON SUELOS ARCILLOSOS.

OTRA LABOR ES EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CABALLONES Y EL DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGP QUE SE VA A UTILIZAR.

LA LABOR FINAL PREVIA AL TRASPLANTE ES EL TRAZADO, AHOYADO Y HUMEDECIMIENTO DE LOS HUECOS PARA LA SIEMBRA DE LAS PLÁNTULAS

NCIA DE LOS
RES ES
N EL PRIMER
DEL AÑO.
AYO) CON EL
LAS LLUVIAS,
LGUNOS EN
OPORCIÓN LO
SEPTIEMBRE Y

DEBE REALIZAR
5 A 6 HOJAS
NTIMETROS, LO
UES DE HABER

SEMBRADO LA SEMILLAS, DE FORMA SIMULTANEA SE INICIA EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DONDE SE VAN A ESTABLECER LAS PLANTAS

+ INFO

genially