El empleo es de todos

Mintrabajo

GC-F-004v03

PREPARACIÓN DEL SUELO PARA EL CULTIVO DE ÑAME ESPINO (*Dioscorea Rotundata)*

LEONARDO FAVIO FUENTES RHÉNALS

Ingeniero Agrónomo

Instructor SENA

EL SUELO PARA ESTE CULTIVO DEBE CONTAR CON UNAS CONDICIONES IDEALES, DEBE ESTAR BASTANTE SUELTO O MULLIDO Y CON UNA PROFUNDIDAD IDEAL ENTRE 30 A 40 CMS QUE PERMITA EL CRECIMIENTO DEL ÑAME.

EXISTEN DOS TIPOS DE SISTEMAS DE PREPARACIÓN DE SUELO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE ÑAME:

1. **SISTEMA DE MONTÍCULO INDIVIDUAL.**

2. **SISTEMA DE SURCOS O CABALLONES.**

SIEMBRA Y DISTANCIA DE SIEMBRA.

PARA LA SIEMBRA DE ÑAME HAY QUE TENER EN CUENTA:

- QUE EL SUELO SE ENCUENTRE REMOVIDO Y CON EL MONTÍCULO ELABORADO.
- QUE EL SUELO ESTÉ LIBRE DE MALEZAS Y QUE CUENTE CON HUMEDAD (2 O 3 AGUACEROS E INICIANDO LAS LLUVIAS).
- LAS DISTANCIAS MÁS COMUNES SON 10.000, 15.000 Y 20.000 PLANTAS POR HECTÁREA.

SIEMBRA Y DISTANCIA DE SIEMBRA.

LOS ARREGLOS POBLACIONALES PARA LAS DENSIDADES DE 15000 PLANTAS / Has ES DE 1 METRO ENTRE CALLES Y 0,66 METROS Y PARA LAS DE 20000 PLANTAS / Ha ES DE 1 METRO POR 0,50 METROS, ESTAS POBLACIONES ES CON MIRAS A LA EXPORTACIÓN Y EL TAMAÑO ES MÁS ACEPTADO EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

- LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, SON LAS MÁS UTILIZADAS, EN LAS SIEMBRAS TEMPRANAS (MARZO-ABRIL) EL EFECTO DE ALGUNOS HONGOS Y DE ATAQUES DE INSECTOS ES MENOS INTENSO DEBIDO A QUE, CUANDO APARECE LA ANTRACNOSIS LAS PLANTAS ADULTAS PRESENTAN TUBÉRCULOS MAS DESARROLLADOS