Procedimiento Operativo Normalizado – P.O.N.

EMERGENCIA MICROBIOLOGICA

Active la **Brigada de Emergencias y de aviso al salvavidas y personal de mantenimiento por emergencias con Presencia de vómito, heces o sangre en piscinas potenciasl presencia de microorganismos (E. coli, Giardia, etc.).**

¿Esta capacitado para aplicar protocolo?

SI

Active el protocolo de acción

NO

Conserve la Calma - **PIDA AYUDA al personal Brigadista.**

Evacuar Inmediatamente la Piscina
Ordenar la salida de todos los bañistas.
Cerrar temporalmente el acceso al área de la piscina.

Usar kit de biosegruidad : guantes, redes o herramientas específicas para retirar heces, vómito u otros sólidos.
No permitir que el personal entre en contacto directo con el agua.

Aplicar Cloración de Choque Aumentar el nivel de cloro libre residual en el agua para inactivar patógenos.Fecal sólida o vómito: Subir el cloro a 20 ppm (partes por millón) durante al menos 13 horas.Fecal líquida o diarrea: Subir el cloro a 20 ppm durante al menos 13–14 horas (más severo por riesgo de Giardia o Cryptosporidium).Asegurarse que el pH esté entre 7.2 y 7.5, para mayor eficacia del cloro.

Mantener Cerrada la Piscina La piscina debe permanecer fuera de servicio hasta que los niveles de desinfectante sean seguros.
Documentar el incidente y el tratamiento aplicado.

Recomendaciones Preventivas y proactivas
Mantener al personal sobre cómo actuar ante este tipo de emergencias.
Supervisar que los niños pequeños usen pañales especiales para piscina.
Contar con protocolos de limpieza establecidos y señalización visible.
Mantener el kit de bioseguridad: guantes, mascarillas, bolsas para desechos biológicos, etc.
.