

FENDONA®

Insecticida residual de alto desempeño para uso en todo tipo de ambiente.

Contra TODAS LAS PLAGAS DE LOS AMBIENTES ofrece:

- Acción por contacto, ingestión e inhalación
- Notorio efecto de expulsión de la plaga
- Excelente poder de volteo
- Acción residual prolongada

PRÁCTICO

- Fácil de usar por su envase dosificador
- No mancha, no huele
- Dos formulaciones

USO EN

- Industria
- Hogar
- Salud Pública

BASF
The Chemical Company

FENDONA®

Qué es?

Insecticida piretroide en presentación de suspensión concentrada y polvo mojable que posee una rápida acción y efecto residual prolongado para el control de insectos rastreros y voladores de uso en los segmentos de salud pública, industria en general y veterinaria.

Formulación

Fendona 60 SC, suspensión concentrada que contiene 60 g de ingrediente activo (Alfacipermertrina) por litro de producto comercial.

Fendona 5 WP, polvo mojable que contiene 50 g de (Alfacipermertrina) por kilogramo de producto comercial.

Modo de acción

Actúa por contacto e ingestión sobre larvas y adultos de insectos rastreros y voladores tales como:


Moscas, Mosquitos, Cucarachas, Pulgas, Chinches, Pitos, Hormigas, Coquito, Arañas, Escorpiones, Gorgojos, Polillas, Jejenes, Insectos de los granos almacenados.

Ventajas

- ✓ Formulación en suspensión concentrada
  - • No tiene olor, no es corrosivo y no mancha
  - • Puede ser aplicado con equipos de Ultra Bajo Volumen
- ✓ Fendona contiene más del 90% de Isómeros con actividad insecticida
  - • Mayor actividad biológica comparado con otros insecticidas piretroides
- ✓ Rápida acción de choque y efecto repelente contra los insectos dañinos
- ✓ Posee un prolongado efecto residual aplicado sobre toda clase de superficies
- ✓ Puede ser utilizado en áreas domésticas, públicas e industriales

Precauciones de uso

- • Mantener el producto bien tapado en su envase original y en un lugar fresco
- • No aplicar sobre personas, animales o alimentos
- • No comer, beber o fumar durante el manejo del producto
- • Evitar el contacto con la piel, ojos, nariz o boca
- • No inhalar la neblina durante la aspersión



Recomendaciones de uso

Fendona se aplica por el sistema de aspersión previa dilución en agua, dirigida a los sitios donde viven o transitan los insectos con especial énfasis en paredes, techos, pisos, grietas y estibas donde se localizan las plagas.

Insecticida RESIDUAL de ALTO desempeño contra las plagas de los ambientes

Dosificación Fendona

Tratamiento		Dosis Fendona 60 SC	
Insectos voladores y rastreros	Dosis de Mantenimiento	5 mililitros por 1 Litro de Agua	1 Litro de dilución por 20 a 25 m²
	Dosis de Ataque Infestaciones Severas o Persistencia Prolongada	10 mililitros por 1 Litro de Agua	1 Litro de dilución por 20 a 25 m²

Tratamiento		Dosis Fendona 5 WP	
Insectos voladores y rastreros	Dosis de Mantenimiento	8 gramos por 1 Litro de Agua	1 Litro de dilución por 15 a 25 m²
	Dosis de Ataque Infestaciones Severas o Persistencia Prolongada	16 gramos por 1 Litro de Agua	1 Litro de dilución por 15 a 25 m²






estudiosup.com



"Insecticida residual de alto desempeño para uso en todo tipo de ambiente"

En caso de emergencia o intoxicación llamar a CISPROQUIM a los Teléfonos: 018000 916012 ó (1) 288 6012 en Bogotá D.C., Servicio las 24 horas. Servicio Integral al Cliente BASF Tels: 018000 522273 ó (1) 634 2020. Storm® es marca registrada de BASF.

- Entregue el envase vacío y con triple lavado en los sitios autorizados por el Programa "Campo Limpio" de recolección de envases de la Cámara de Procultivos de la ANDI.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Registro:
Fendona 60 SC: Registro ICA 7092 - MV
MinProtección RGSP - 292 - 2008

Fendona 5 WP: Registro ICA 7529 - MV
MinProtección RGSP - 151 - 2002

BASF Química Colombiana S.A.
Calle 99 No. 69C - 32 / PBX: (571) 632 2260
Fax: (571) 634 2047
A.A. 5751 A.A. 7072
www.basf.com.co
Bogotá, Colombia

LEA BIEN LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
Medianamente tóxico

